

Smithsonian Institution
Libraries



GIFT OF
Marcia Brady Tucker



vaernewyck



Dessiné et Gravé par F. N. Martinet, D'ordonneur de S^m le Duc de la Rochefoucauld, de L'abbé.

ORNITHOLOGIA

SIVE

SYNOPSIS METHODICA

SISTENS AVIUM DIVISIONEM IN ORDINES,
Sectiones, Genera, Species, ipsarumque Varietates.

*CUM ACCURATA CUJUSQUE SPECIEI
descriptione, Citationibus Auctorum de iis tractantium,
Nominibus eis ab ipsis & Nationibus impositis, Nomi-
nibusque vulgaribus.*

A D. BRISSON, Regiæ Scientiarum Academiæ Socio.

Opus Figuris æneis adornatum.

VOLUMEN IV.



PARISIIS,

AD RIPAM AUGUSTINORUM,

Apud CL. JOANNEM-BAPTISTAM BAUCHE, Bibliopolam,
ad Insigne S.^æ. Genovefæ, & S.^{ci}. Joannis in Deserto.

M. DCC. LX.

CUM APPROBATIONE, ET PRIVILEGIO REGIS.

ORNITHOLOGIE

O U

M É T H O D E

CONTENANT LA DIVISION DES OISEAUX
en Ordres, Sections, Genres, Espèces & leurs Variétés.

*A LAQUELLE ON A JOINT UNE DESCRIPTION
exacte de chaque Espèce, avec les Citations des Auteurs
qui en ont traité, les Noms qu'ils leur ont donnés, ceux
que leur ont donnés les différentes Nations, & les Noms
vulgaires.*

Par M. BRISSON, de l'Académie Royale des Sciences.

Ouvrage enrichi de Figures en taille-douce.

T O M E I V.




A P A R I S,

QUAY DES AUGUSTINS,

Chez CL. JEAN-BAPTISTE BAUCHE, Libraire, à l'Image Sainte
Geneviève & S. Jean dans le Désert.

M. DCC. LX.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.



REGNUM LE REGNE
ANIMALE. ANIMAL.
CLASSIS III. CLASSE III.
ORDO XIII. ORDRE XIII.
A V E S LES OISEAUX

Digitis quatuor, membranis destitutis, duobus scilicet anticis, totidem posticis: & cruribus ad calcaneum usque plumosis præditæ.

Qui ont quatre doigts, dénués de membranes, deux devant, deux derrière: & les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon.

HUJUS Ordinis Avium aliæ rostro donantur recto; inter quas aliæ linguâ longissimâ & lumbrici formi præditæ sunt; alteræ linguam habent rostrum longitudine non superantem: aliæ rostrum habent modicè deorsum inflexum, superne con-

Tome IV.

PARMI les Oiseaux de cet Ordre les uns ont le bec droit; & de ceux-ci les uns ont la langue très-longue & ressemblante à un ver de terre; & les autres n'ont pas la langue plus longue que le bec: d'autres ont le bec un peu courbé en-enbas, convexe en-dessus, & comprimé

A

par les côtés : d'autres ont le bec court & crochu : d'autres enfin ont le bec long, de la grosseur de la tête, dentelé comme une scie ; ayant le bout des deux mandibules courbé en-enbas ; & la langue ressemblante à une plume. Ils se divisent en cinq sections : dans la première sont ceux qui ont le bec droit, & la langue très-longue & ressemblante à un ver de terre, comme le *Torcol*, le *Pic* : dans la seconde ceux qui ont le bec droit, & la langue pas plus longue que le bec, comme le *Jacamar* : dans la troisième ceux qui ont le bec un peu courbé en-enbas, convexe en-dessus & comprimé par les côtés, comme le *Barbu*, le *Coucou* : dans la quatrième ceux qui ont le bec court & crochu, comme le *Couroucou*, le *Bout-de-Petun*, le *Perroquet* : & enfin dans la cinquième ceux qui ont le bec long, de la grosseur de la tête, dentelé comme une scie ; le bout des deux mandibules courbé en-enbas ; & la langue ressemblante à une plume, comme le *Toucan*.

vexum & lateraliter compressum : alia rostrum breve, aduncum : alia tandem rostrum longum, crassitie caput æquans, ferræ instar denticulatum ; utriusque mandibulæ apice deorsum incurvo ; & linguâ pennæ æmulâ. In quinque sectiones eas dividimus : prima continet illas quæ rostro donantur recto, & linguâ longissimâ & lumbriciformi, ut *Torquilla*, *Picus* : secunda eas quæ rostrum habent rectum, & linguam rostrum longitudine non superantem, ut *Galbula* : tertia illas quæ rostrum habent modicè deorsum inflexum, superne convexum, & lateraliter compressum, ut *Bucco*, *Cuculus* : quarta eas quæ rostro donantur brevi & adunco ; ut *Trogon*, *Crotophagus*, *Psittacus* : quinta denique illas quæ rostrum habent longum, crassitie caput æquans ; ferræ instar denticulatum ; utriusque mandibulæ apice deorsum incurvo ; & linguâ pennæ æmula, ut *Tucana*.



SECTIO I.

Eæ quæ rostro donantur recto, & lingua longissima & lumbriciformi.

HÆC sectio duobus constat generibus Avium. Aliæ enim rostro donantur acuto, & rectricibus flexilibus, ut *Torquilla*: aliæ verò rostro cuneiformi, & rectricibus rigidis, & cuneiformibus, ut *Picus*.

XLVI.

Genus Torquilla.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis destituti; duo scilicet antici, totidem postici; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Rostrum rectum, acutum:

Lingua longissima & lumbriciformis:

Rectrices flexibiles.

Hujus generis Avium cauda decem tantum rectricibus conflatur.

SECTION I.

Ceux qui ont le bec droit, & la langue très-longue & ressemblante à un ver de terre.

CETTE section contient deux genres d'Oiseaux. Les uns ont le bec pointu, & les plumes de la queue flexibles, comme le *Torcol*: & les autres ont le bec en forme de coin, & les plumes de la queue roides & en forme de coin, comme le *Pic*.

XLVI.

Le Genre du Torcol.

Son caractere est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de membranes; deux devant, & deux derriere; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Le bec droit & pointu:

La langue très-longue, & ressemblante à un ver de terre:

Les plumes de la queue flexibles.

Les Oiseaux de ce genre n'ont la queue composée que de dix plumes.

** I. LE TORCOL.

Voyez Pl. I. Fig. 1.

Torquilla superne griseo , fusco & nigricante transversim & undatim variegata , infernè rufescens , nigricante transversim striata ; ventre sordidè albo-rufescente , maculis nigricantibus vario ; rectricibus dilutè griseis , lineolis undatis , maculisque nigricantibus variegatis , tæniis transversis nigris insignitis TORQUILLA.

Torquilla. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 356.*

Frisch. hujus icon accurata Tab. 38.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 42. sp. 1.

Torquilla Gesneri & Gazæ ; Iynx Mortoni ; Verticilla ; Cinclida ; Turbo ; Collitorques. *Rzac. Aud. Hist. nat. Pol. pag. 422.*

Iynx. *Gesn. Avi. pag. 573 , in qua hujus icon non satis accurata.*

Moehr. Avi. Gen. 13.

Iynx ; Torquilla. *Charlet. Onomazt. pag. 87. N°. 7.*

Iynx , Torquilla , Turbo. *Gesn. icon. Avi. pag. 38 , in qua hujus icon non satis accurata.*

Iynx , seu Torquilla. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 863. maris & sæminæ, icones minimè accuratæ pag. 866.*

Jonst. Avi. pag. 80. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 42.

Willugh. Ornith. pag. 95. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXII.

Raj. Syn. Avi. pag. 44. N°. A. 8.

Iynx , Torquilla , Verticilla , Verticolla Scaligeri ; Collitorques. *Charlet, Exer. pag. 93. N°. 7.*

Verticilla , seu Turbo. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 296.*

Verticilla ; Verticollia , Scaligeri. *Schwenck.*

Torcol. *Gesn. Avi. pag. 795.*

Picus Torquilla. *Klein. Avi. pag. 28. N°. 14.*

Cuculus subgrisea maculata , rectricibus nigris fasciis undulatis. *Fauri, Succ. Linn. N°. 78. hujus icon satis accurata Tab. I. N°. 78.*

Torcol. *Alb. Tom. I. pag. 20 ; avec une figure mal coloriée Pl. 21.*

Tercou , Torcou , ou Turcot , Tercot. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 306 , dans laquelle il y a une figure peu exacte.*

Turcot , Tercot , Torcot. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 76 a , dans laquelle est la même figure.*

Les Grecs l'appellent ἰνύξ. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Charlet. 108, Schwenck.*

Les Espagnols , TORZICUELLO. *Gesn. TORXICUELLO. Aldrov.*

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XIII.*

- Les Italiens*, TORTOCOLLO. *Aldrov.* STORTOCOLLO ; COLLOTORTO ;
CAPOTORTO. Bel. Gesn. Aldrov.
Les Romains, VERTICELLA. *Aldrov.*
Les Napolitains, FORMICULA. *Bel. Gesn. Aldrov.*
Les Allemands, WIND-HALSZ ; TRAE-HALSS ; NATER-HALSZ ; NATER-
 ZWANG. *Gesn. Aldrov.* WIND-HALS ; TRAY-HALS. *Schwenck.* DREH-
 HALS. *Frisch.* NATER-WENDEL. *Gesn. Aldrov. Schwenck.*
Les Silésiens, WENDE-HALS. *Schwenck. Rzac.*
Les Russiens, KRUTIHOLWA. *Rzac.*
Les Polonois, KRETOGLOW. *Rzac.*
Les Suédois, GJOEK-TYTA ou GIOEK-TIDA. *Linn.*
Les Anglois, WRYNECK. *Willugh. Raj. Charlet. Alb.* EMMET-HUNTER;
Charlet.

Crassitie Alaudam æquat aut paululum ei cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & totidem lineas explet, & ad extremos unguis quinque pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est ; cauda duos pollices cum sex lineis ; pes septem cum semi lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue octo cum semi lineas, intimus quinque cum semi lineas ; posticorum extimus septem cum semi lineas, intimus quatuor lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum novem pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad tertiam longitudinis caudæ partem usque protrahuntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum &

Il est tout au plus de la longueur d'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long ; sa queue deux pouces six lignes ; son pied sept lignes & demie ; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, huit lignes & demie, l'intérieur cinq lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière sept lignes & demie, & l'intérieur quatre lignes. Il a neuf pouces six lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont très-joliment variés transversalement & en zigzags de gris, de brun & de noirâtre. Les cou-

vertures du dessus de la queue sont variées de même & des mêmes couleurs. Il y a plus de noirâtre sur le dos que par-tout ailleurs, & il y est semé par plus grandes taches. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont pareillement variées des mêmes couleurs que le dos, auxquelles est mêlé un peu de roussâtre; & elles sont de plus marquées d'assez grandes taches d'un blanc-roussâtre. Cet Oiseau relève quelquefois les plumes du sommet de sa tête en forme de hupe. Les côtés de la tête au-dessous des yeux, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine & les côtés sont d'un roussâtre rayé transversalement de noirâtre. Le ventre & les jambes sont d'un blanc sale, mêlé d'un peu de roussâtre, & varié de quelques petites taches noirâtres. Les couvertures du dessous de la queue sont roussâtres, & rayées transversalement de noirâtre. Celles du dessous des ailes sont d'un roussâtre rayé transversalement de gris. Les plumes de l'aile sont brunes, & marquées sur leur côté extérieur de taches quadrées d'un roux clair: les grandes sont aussi marquées sur le bord de leur côté intérieur de taches triangulaires d'un rouf-

uropygium griseo, fusco & nigricante transversim & undatim elegantissimè variegantur. Superiores caudæ tectrices iisdem coloribus, eodemque modo sunt variegatæ. Color nigricans majus in dorso spatium occupat quàm in reliquis prædictis partibus, & in eo majores maculas efformat. Pennæ scapulares & superiores alarum tectrices iisdem quoque ac dorsum coloribus variegantur, & aliquid rufescentis admixtum habent; majusculis insuper maculis alborufescentibus insigniuntur. Pennas capitis verticem obtegentes, cristæ in modum; interdum erigit hæc Avis. Caput ad latera, idque infra oculos, guttur, collum inferius, pectus & latera sunt rufescentia, nigricante transversim striata. Venter & crura sordidè albent, cum pauco rufescente admixto, & minutis quibusdam maculis nigricantibus variegantur. Pennæ caudam subtus cooperientes rufescunt, & tenuis transversis nigricantibus insigniuntur. Inferiores alarum tectrices sunt rufescentes, griseo transversim striatæ. Remiges fusce, in latere exteriori maculis qua-

dratis dilutè rufis insignitæ : fâtre très-clair ; & les moyennes font variées intérieurement de bandes transversales rouffes : de plus le côté extérieur de celles de ces dernières qui sont les plus proches du corps, est varié de même que les plumes scapulaires. La queue est composée de dix plumes d'un gris clair, varié de petites lignes en zigzags & de petites taches noîrâtres, & marqué d'assez larges bandes transversales noires. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette tirant sur le jaune. Le bec est d'une foible couleur de plomb. Les pieds sont d'un gris tirant sur le couleur de chair ; & les ongles gris.

dilatè rufis insignitæ : majores ad margines in latere interiore maculis triangularibus dilutissimè rufescentibus quoque notantur ; minores verò tæniis transversis rufis interiùs variegantur : latus insuper exterius minorum corpori viciniorum iisdem ac scapulares pennæ coloribus varium. Caudam componunt decem rectrices dilutè griseæ, lineolis undatis & minutis maculis nigricantibus variæ, & latiusculis tæniis transversis nigris insignitæ. Oculorum irides ex avellaneo ad flavum inclinant. Rostrum pallidè plumbeo colore tinctum. Pedes ex griseo ad incarnatum colorem vergentes ; ungues verò grisei.

Fœmina à mare discrepat coloribus pallidioribus.

Caput singulari modo contorquet hæc Avis ; ita ut rostrum secundùm mediî dorsi directionem sit positum : quod ei valde familiare ; unde *Torquillæ* nomen. *Formicis* viſtitat. *Ex museo Realmuriano.*

La femelle diffère du mâle en ce que ses couleurs sont plus pâles.

Cet Oiseau tourne singulièrement sa tête ; de façon que son bec se trouve dans la direction du milieu de son dos : cette attitude lui est très-familier ; c'est ce qui lui a fait donner le nom de *Torcol*. Il se nourrit de *Fourmis*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

A. LE TORCOL RAYÉ.

Torquilla striata.

Jynghi Congener. *Aldrov. Avi. Tom. 1. pag. 368. hujus icon non satis accurata pag. 369.*

Jonst. Avi. pag. 81. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 42.

Willugh. Ornith. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXII.

Il est à peu près de la même grandeur & de la même grosseur que le précédent. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un ferrugineuxjoliment varié de taches transversales jaunes. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc varié de lignes longitudinales jaunes. Les plumes de l'aile & celles de la queue sont des mêmes couleurs que le dos. Les pieds sont jaunes; & les ongles noirs, grands & crochus.

Præcedentem magnitudine & crassitie circiter æmulatur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superioresque caudæ rectrices sunt ferrugineæ, maculis luteis transversis eleganter distinctæ. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores albicant, lineisque longitudinalibus luteis exornantur. Remiges alarum, sicut & caudæ rectrices, dorso concolores. Pedes lutei; ungues adunci, magni, nigri.

XLVII.

Le genre du Pic:

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; deux devant, & deux derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon;

XLVII.

Genus Pici:

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; duo scilicet antici, totidem postici; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Crura ad calcaneum usque plumosa;

Rostrum

Rostrum rectum , cuneiforme :	Le bec droit & en forme de coin :
Lingua longissima & lumbriciformis :	La langue très-longue , & ressemblante à un ver de terre :
Rectrices rigidaë , cuneiformes.	Les plumes de la queue roides , & en forme de coin.

Omnes hujus generis Aves decem tantum rectricibus præditæ sunt. Sex sive octo intermediarum scapi ad ipsarum apices non protenduntur ; unde rectrices istæ nonnihil bifurcæ videntur. Avium istarum lingua in aciem durum , osseum & acutum desinit.

Tout les Oiseaux de ce genre n'ont que dix plumes à la queue. La tige des six ou huit du milieu ne s'étend pas jusqu'à leur bout ; ce qui fait paroître ces plumes un peu fourchues. Le bout de la langue de ces Oiseaux est dur , osseux & pointu.

Les Grecs appellent le Pic en général *Δενδροκολάπτης*. Aldrov. Jonst. Willugh.

Charlet. *Δρυοκολαπτις*. Aldrov. *Δρυοκολαψ* ; *Δρύκοπος* ; *Κελαφος*. Aldrov.

Jonst. *Δρυοκολάπτης* ; *Δρυοκόλαψ* ; *Δρυοκόπος* ; *Πελέκας*. Schwenck. *Δρυτοτομος*.

Jonst. *Ξυλοκόπος*. Aldrov. Jonst. Charlet.

Les Grecs modernes , *Κρυκνιστής*. Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst.

Les Turcs , *SÆGARIECK*. Gesn. *SÆGARIECK*. Aldrov.

Les Espagnols , *BEQUEBÓ*. Gesn. Aldrov.

Les Italiens , *PICO* ; *PICCHIO*. Gesn. Aldrov.

Les Allemands , *SPECHT*. Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac.

Les Carinthiens , *BAUM-HECKER*. Gesn. Aldrov. Schwenck.

Les Flamands , *SPICHT*. Gesn. Aldrov.

Les Polonois , *DZIEZIOL*. Gesn. Aldrov. *DZIECIOL*. Rzac.

Les Anglois , *WOOD-PECKER*. Gesn. Aldrov. Charlet.

** I. LE PIC VERD.

Picus superne viridi-olivaceus , infernè ex fordidè albo ad olivaceum inclinans ; uropygio olivaceo-flavicante ; capite superius & occipitio rubris ; rectricibus fuscis , binis intermediis in utroque latere , lateralibus exterius viridi-olivaceo dentatim variegatis , octo intermediis apice nigris....

PICUS VIRIDIS,

Tom. IV.

B

Picus viridis vertice coccineo. Faun. Suec. Linn. N^o. 80.

Picus viridis. Gesn. Avi. pag. 710, in qua hujus icon minùs accurata.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 338.

Jonst. Avi. pag. 79. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 41 : & insuper altera icon à Gesnero mutuata eâdem Tab. sub titulo, Picus viridis major.

Willugh. Ornith. pag. 93. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXI.

Raj. Syn. Avi. pag. 42. N^o. A. 2.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Frisch. hujus icon satis accurata (Nisi corpus inferius esset maculatum) Tab. 35.

Linn. Syllh. Nat. ed. 6. Gen. 41. sp. 2.

Klein. Avi. pag. 27. N^o. 5.

Picus viridis, Picus arborarius, vel Arborum Cavator. Picus Martius major Bellonio. Gesn. icon. Avi. pag. 36, in qua hujus icon minùs accurata.

Picus viridis, seu Picus Martius; Picus medius Eberi & Peuceri. Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 413.

Picus viridis, Virio. Charlet. Exer. pag. 93. N^o. 3.

Charlet. Onomazt. pag. 86. N^o. 3.

Picus viridis Jonstoni. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XIII. sp. 3.

Picus Arborarius Plinio; Picus Martius Festo. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 292.

Picus. Moehr. Avi. Gen. 14.

Κολιός, seu Picus viridis nostras. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 848. hujus icon minimè accurata pag. 849.

Galgulus. Jonst. Avi. hujus icon non satis accurata Tab. XXVII.

Green Wood-pecker, or Picus Martius. Borl. Nat. Hist. of Cornwall. pag. 246. hujus icon minùs accurata Tab. XXIV. fig. XV.

Piverd. Alb. Tom. I. pag. 17; avec une figure mal coloriée Pl. 18.

Pic verd jaulne. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 299, dans laquelle il y a une figure peu exacte.

Pic, Pic mart, Pic verd, Pic jaulne, Picumart. Bel. Portr. d'Ois. pag. 74 a, dans laquelle est la même figure.

Les Grecs l'appellent Δεδροκολάπις. Raj. Δεδροκολάπις. Bel. Κολιός. Aldrov. Schwenck. Jonst. Willugh. Charlet. Χλορις. Bel.

Les Espagnols, PICO VERDE. Gesn. Aldrov.

Les Catalans, PICOT VERT. Barr.

Les Italiens, PICO; PICHIO. Bel. PICCHIO; PICO VERDE. Aldrov. PIGOZO: Gesn. Aldrov.

Les Allemands, SPECHT. Rzac. GRUN-SPECHT. Frisch. GREUN-SPECHT. Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. GRASE-SPECHT. Schwenck.

Les Polonois, DZIECIOL; DZIECIOL ZIELONY. Rzac. ZOTNA. Gesn. Aldrov.

Les Suédois, WEDKNARR; GROEN-SPIK; GROEN-GJOELING. *Linn.*
Les Anglois, GREEN-WOOD-PECKER. *Willugh. Raj. Charlet. Alb. Bort.*
 GREEN-WOOD-SPIKE. *Willugh. Raj. Alb.* : & quelques-uns, RAIN
 FOWL; HIGH-HOO ou HEW-HOLE. *Willugh.*
Les Anglois Septentrionaux, HEYHOE. *Raj.*

Ad *Monedulæ* crassitiem accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues undecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & octo cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices; pes tredecim cum semi lineas; digitorum anticorum exterior cum ungue quindecim cum semi lineas, interior tredecim lineas; posticorum exterior tredecim cum semi lineas, interior sex cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis sex pollicum & septem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Partem capitis superiorem & occipitium vestiunt pennæ in exortu cineræ, eleganti rubro terminatæ; ita tamen ut, dum pennæ aliæ aliis incumbunt, sola appareat rubedo. Caput ad latera nigricat; pennæ au-

Il approche de la grosseur du *Choucas*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce huit lignes & demie de long; sa queue quatre pouces; son pied treize lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, quinze lignes & demie, l'intérieur treize lignes; l'extérieur de ceux de derrière treize lignes & demie, & l'intérieur six lignes & demie. Il a un pied six pouces sept lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête & l'occiput sont couverts de plumes cendrées à leur origine, & terminées d'un beau rouge; de façon qu'il n'y a que cette dernière couleur qui paroît, lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. Les côtés de la tête sont noirâtres; & les plumes qui couvrent la mâchoire inférieure sont terminées

de rouge; ce qui forme de chaque côté une bande longitudinale pointillée de cette couleur. La partie supérieure du col, le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd-d'olive. Le croupion est d'un olive-jaunâtre. La gorge est d'un blanc-jaunâtre. La partie inférieure du col, la poitrine & les côtés sont d'un blanc sale, tirant sur l'olive. Le ventre est de la même couleur, mais il tire un peu plus sur le jaune. Les jambes sont couvertes de plumes d'un blanc sale, tirant sur l'olive, & variées de taches olivâtres. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale & jaunâtre, & rayées de bandes transversales brunes. Celles du dessous des ailes sont d'un blanc mêlé d'une légère teinte de jaune, & varié de bandes brunes transversales & en zigzags. Les petites couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos: les grandes les plus proches du corps sont d'un verd-d'olive du côté extérieur & à leur bout; leur côté intérieur est brun, & varié de taches transversales blanches: enfin les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & variées des deux côtés de taches blanchâtres.

tem maxillam inferiorem obtegentes rubro terminantur; unde fit in utroque capitis latere tania longitudinalis rubro punctulata. Pars colli superior, dorsum, pennæ scapulares & superiores caudæ teñtrices sunt viridi-olivaceæ. Uropygium olivaceo-flavicans. Guttur ex albo-flavescit. Pars colli inferior, pectus & latera ex fordidè albo ad olivaceum inclinant. Venter eodem imbuatur colore; attamen paulò magis ad luteum vergit. Crura cooperiunt pennæ ex fordidè albo ad olivaceum inclinantes; maculis olivaceis variegatæ. Inferiores caudæ teñtrices sunt fordidè albo-flavican-tes, taniis transversis fuscis striatæ. Pennæ alas subtus obtegentes albet, & aliquid lutei admixtum habent, taniisque transversis & undatis fuscis variegantur. Superiores alarum teñtrices minores sunt dorso concolores: majores corpori finitimæ in latere exteriorè & apice viridi-olivaceæ, in latere interiorè fusca, maculis transversis albis variæ: majores tandem à corpore remotiores fusca, maculis candicantibus in utroque latere variegatæ. Remiges majores eodem fusco

tinctæ, ad latus exterius maculis albidis variæ, cum aliqua in quibusdam remigibus viridi-olivacei mixtura; latus verò interius ab ipsius exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque maculis transversis albis variegatur: minores in latere exteriori viridi-olivaceæ, in interiore fuscæ, maculis transversis albis variæ. Remix prima brevissima est: quarta & quinta reliquas omnes longitudine superant. Cauda decem constat rectricibus fuscis, quarum binæ intermediae in utroque latere, laterales in latere exteriori viridi-olivaceo, in fuscum dentatim incluso, variegantur: octo insuper intermediae apicibus nigris præditæ sunt. Binæ rectrices intermediae lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Oculorum pupilla est nigra, eamque ambit duplex circulus, quorum interior ex rufo fuscescit, exterior verò albet. Rostrum saturatè plumbeo sive nigricante colore tinctum, excepto tamen mandibulæ inferioris exortu olivaceo-flavicante. Pedes plumbeo-vi-

Les grandes plumes de l'aile sont du même brun; leur côté extérieur est varié de taches blanchâtres, & mêlé dans quelques-unes des plumes d'un peu de verd-d'olive; & leur côté intérieur depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur est varié de taches transversales blanches: les moyennes sont d'un verd-d'olive du côté extérieur; leur côté intérieur est brun, & varié de taches transversales blanches. La première des plumes de l'aile est extrêmement courte: la quatrième & la cinquième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de dix plumes brunes: les deux côtés des deux du milieu & le côté extérieur des latérales sont variés d'un verd-d'olive, qui s'engrenne dans le brun en forme de dents: de plus les huit du milieu sont terminées de noir. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. La prunelle de l'œil est noire, & entourée d'un double cercle, dont l'intérieur est d'un roux-brun, & l'extérieur blanc. Le bec est de couleur de plomb foncé ou noirâtre, excepté l'o-

rigine du demi-bec inférieur, qui est d'un olive-jaunâtre. Les pieds sont de couleur de plomb-verdâtre ; & les ongles sont cendrés. Il se nourrit d'*Insectes*. Il se pose plus souvent par terre que les autres especes de ce genre ; & y cherche de la nourriture. Il fait son nid dans des trous d'arbres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ridescentes ; ungues verò cinerei. *Insectis* victitat. Sæpius quàm reliquæ hujus generis species terræ insidet ; & in ea victum quærit. In cavis arboribus nidificat. *Ex museo Realmuriano.*

2. LE PIC VERD DE BENGALE.

Picus cristatus, superne viridi-flavicans, infernè albus, marginibus pennarum fuscis ; cristâ rubrâ ; capite anteriùs & collo inferiore albo & nigro variis ; collo superiore nigro ; taniâ utrinque candidâ ab oculis secundùm colli latera protensâ ; rectricibus nigricantibus , obscuro viridi adumbratis . . . *PICUS VIRIDIS BENGALENSIS.*

Picus varius Benghalensis. *Klein. Avi. pag. 28. No. 13.*

Pic-vert tacheté des Indes. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXXXII ; avec une figure exacte Pl. 182.*

Grimpereau de Bengale. *Alb. Tom. III. pag. 9 ; avec une figure passable Pl. 22.*

Les Anglois l'appellent *WOOD-PECKER FROM BENGALL. Alb. SPOTTED INDIAN WOOD-PECKER. Edwards.*

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce six lignes de long ; sa queue deux pouces

Præcedenti paululùm craf-
sitie cedit. Ipfius longitudo à
rostri apice ad caudæ extre-
mitatem oëto pollices & sex
circiter lineas aquat , & ad
extremos ungues septem
pollices cum sex lineis. Ros-
trum ab ipfius apice ad oris
angulos ufque unum polli-
cem & sex lineas longum

est; cauda duos pollices & octo lineas; pes septem lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue decem lineas, intimus septem cum semi lineas; posticorum exterior novem lineas, interior quinque cum semi lineas. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Capitis superior pars nigra est, minutisque maculis albis variegatur. Occipitium vestiunt pennæ longæ, rubræ, cristam efficientes. Collum superius nigrum. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices ex viridi flavicant. Guttur & partem colli inferiorem variegant maculæ nigræ & candidæ; quos colores à colore nigro, collum superius tingente, separat tania candida, ab oculi cantho orta, & secundum colli latera protensa. Pectus, ventrem supremum & latera cooperiunt pennæ albæ, marginibus fuscis præditæ. Quæ imum ventrem & crura obtegunt, sicut & tectrices caudæ inferiores, penitus albescent. Tectrices alarum inferiores & minores superiores sunt saturatè fuscae, maculis candidis variæ: ma-

huit lignes; son pied sept lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, dix lignes, l'intérieur sept lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes, & l'intérieur cinq lignes & demie. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est noire, & variée de petites taches blanches. L'occiput est couvert de longues plumes rouges, qui forment une hupe. La partie supérieure du col est noire. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd-jaunâtre. La gorge & la partie inférieure du col sont variées de taches noires & blanches; ce qui est séparé du noir de la partie supérieure du col par une bande blanche, qui part de l'angle de l'œil, & s'étend tout le long des côtés du col. La poitrine, le haut du ventre & les côtés sont couverts de plumes blanches, bordées de brun. Celles qui couvrent le bas-ventre, les jambes & le dessous de la queue, sont blanches & sans bordure. Les couvertures du dessous des aîles & les petites du dessus sont d'un brun foncé, varié de taches blanches: les grandes couver-

tures du dessus des ailes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & marquées sur leur côté extérieur d'une tache transversale blanche: les grandes les plus proches du corps sont d'un verd-jaunâtre, varié de quelque taches blanchâtres. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres, & variées des deux côtés de taches transversales blanches: les moyennes sont d'un verd-jaunâtre. La queue est composée de dix plumes d'un noirâtre mêlé d'une légère teinte de verd obscur. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec, les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*.

jores superiores à corpore remotiores nigricantes, ad latus exterius maculâ transversâ albâ insignitæ: majores corpori finitimæ viridiflavicantes, maculis quibusdam candicantibus variegatæ. Remiges majores nigricant, & in utroque latere maculis transversis albis variegantur: minores ex viridi flavicant. Cauda decem confatur rectricibus nigricantibus, obscuro viridi adumbratis. Binæ intermediae lateralium longitudinem paululum excedunt: laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum, pedes, unguesque nigricantes. Habitat in *Bengalensi* Regno.

3. LE PIC VERD DU MEXIQUE.

Picus superne saturatè viridis, infernè dilutè viridi & luteo mixtus; uropygio dilutè flavo; capite superius & maculis infra aures saturatè rubris; rectricibus viridibus, nigro maculatis PICUS VIRIDIS MEXICANUS.

Ardea Mexicana, altera. *Seb. Vol. I. pag. 100. hujus icon satis accurata; (exceptis pedibus)*, *Tab. LXIV. fig. 3.*

Jaculator micellâ rubrâ. Klein. Avi. pag. 127. N°. 3.

Cornix. Moehr. Avi. Gen. 100.

Il est un peu plus gros que notre *Pic verd*. Sa longueur de-

Crassitie *Picum viridem nostratam* paululum antecellit,

lit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices & sex circiter lineas aëquat, & ad extremos ungues tredecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices longum est; cauda tres pollices & novem lineas; pes sexdecim lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & sex lineas, intimus quatuordecim lineas; posticorum extimus unum pollicem & quatuor lineas, intimus septem cum semi lineas. Alæ complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem pertingunt. Caput superius tingit saturata rubedo. In utroque capitis latere macula extat concolor, infra aures posita. Reliquum caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores luteo & dilutè viridi, confusè mixtis, variegantur. Dorsum & pennæ scapulares viridi saturato tinguntur. Uropygium & superiores caudæ tectrices dilutè flavent. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur viridi ac dorsum ipsum tingitur: ma-

puis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ treize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces de long; sa queue trois pouces neuf lignes; son pied seize lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce six lignes; l'intérieur quatorze lignes; l'intérieur de ceux de derrière un pouce quatre lignes, & l'intérieur sept lignes & demie. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un rouge foncé. De chaque côté de la tête est une tache de la même couleur, placée au-dessous des oreilles. Le reste de la tête, la gorge, la col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont variés de jaune & de verd clair, mêlés confusément ensemble. Le dos & les plumes scapulaires sont d'un verd foncé. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un jaune clair. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même verd que le dos: les

grandes les plus éloignées du corps sont d'un rouge-bai, varié de taches blanches sur leur côté extérieur. Les grandes plumes de l'aile sont pareillement d'un rouge-bai, & variées des deux côtés de taches transversales blanches : les moyennes sont d'un verd foncé. La queue est composée de dix plumes vertes, tachées de noir. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec, les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve au *Mexique*.

jores à corpore remotiores sunt spadiceæ, maculis candidis in latere exteriori variegatæ. Remiges majores similiter spadiceæ, maculis transversis albis in utroque latere variæ : minores saturatè virides. Cauda decem conflatur rectricibus viridibus, nigro maculatis. Binæ intermediæ lateralium longitudo paululum superant, laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum, pedes, unguesque nigricantes. Habitat in *Mexico*.

4. LE PIC VERD DE NORVEGE.

Picus superne cœruleo-viridis, infernè cinereus, viridi mixtus; capite & collo superiore cinereis; uropygio luteo; taniis utrinque, aliâ à rostro ad oculum, alterâ ab oris angulis ad collum, nigris; rectricibus obscurè fuscis, taniis obscurioribus transversim striatis, oris exterioribus viridescentibus PICUS VIRIDIS NORVEGICUS.

Picus viridis, supra uropygium lutescens; ad radicem rostri & ab inferiori mandibula ad latera capitis nigrâ lineâ curvâ, remigibus alarum nigro-fuscis, albis punctis transversalibus, rectricibus flavicantibus. *Klein. Avi. pag. 28. N°. 17.*

Pic-vert tête grise. *Edwards. Tom. II. pag. LXV; avec une figure très-exacte Pl. 65.*

Il est à peu près de la grosseur du nôtre. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent

Cum *Pico viridi nostrate* crassitie circiter convenit. Alæ complicatæ ad tertiam

circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput & pars colli superior eleganti cinereo tinguntur. Synciput variegant minutæ quædam maculæ rubræ. Nares cooperiunt pennæ nigræ, rigidæ, antrorsum versæ. In utroque capitis latere binæ extant tæniæ nigræ, alia ab exortu rostri ad oculum usque, altera ab oris angulis ad collum protensa. Dorsum & pennæ scapulares ex cœruleo ad viride vergunt. Uropygium luteum. Tectrices caudæ superiores & inferiores obscurè virides. Guttur candicans. Pars colli inferior, pectus, venter, latera & crura eleganti imbuuntur cinereo, viridi mixto. Superiores alarum tectrices, sicut & majores corpori viciniores, viridi-flavicantes : majores à corpore remotiores obscurè fuscæ, maculis dilutè luteis in latere exteriori varix. Remiges majores sunt quoque obscurè fuscæ, maculis transversis dilutè luteis in utroque latere variegatæ : minores viridi-flavicantes, in latere interiore fusco transversim striatæ. Caudam componunt decem rectrices obscurè fuscæ, tæniis obscurioribus transversim striatæ, oris

environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont d'un joli cendré. Le synciput est varié de quelques petites taches rouges. Les narines sont couvertes de plumes noires, roides & tournées en avant. De chaque côté de la tête sont deux bandes noires, qui s'étendent l'une depuis le bout du bec jusqu'à l'œil, & l'autre depuis les coins de la bouche jusqu'au col. Le dos & les plumes scapulaires sont d'un bleu tirant sur le verd. Le croupion est jaune. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un verd terni. La gorge est blanchâtre. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont d'un joli cendré mêlé de verd. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps sont d'un verd-jaunâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun obscur, varié sur leur côté extérieur de taches de jaune clair. Les grandes plumes de l'aîle sont aussi d'un brun obscur, & variées des deux côtés de taches transversales de jaune clair : les moyennes sont d'un verd-jaunâtre, & leur côté intérieur est rayé transversalement de brun. La queue est

composée de dix plumes d'un brun obscur, rayées transversalement d'une couleur plus sombre, & bordées extérieurement de verdâtre: le bord intérieur des deux du milieu est aussi de cette dernière couleur. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un cendré obscur, excepté la base du demi-bec inférieur & les coins de la bouche, qui sont d'un orangé clair. Les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve en *Norvege*.

exterioribus viridescentibus præditæ : duarum intermediarum oræ interiores quoque viridescunt. Binæ rectrices intermediæ lateraliū longitudinem paululū excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Rostrum obscurè cinereum, exceptis tamen basi mandibulæ inferioris & oris angulis dilutè aurantiis. Pedes, unguesque nigri. Habitat in *Norvegia*.

5. LE PIC JAUNE DE PERSE.

Picus luteus, superne ferrugineo adumbratus ; oculorum ambitu & remigibus majoribus ferrugineis ; rectricibus luteis ; ferrugineo adumbratis *PICUS LUTEUS PERSICUS*.

Picus luteus cyanopus Persicus. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 850. hujus icon minùs accurata pag. 851.

Picus luteus cyanopus. Jonst. Avi. pag. 79. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 41.

Charlet Exer. pag. 93. N^o. 5.

Charlet. Onomast. pag. 86. N^o. 5.

Picus luteus cyanopus Persicus Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 97. Raj. Syn. Avi. pag. 44. N^o. 9.

Les Anglois l'appellent PERSIAN WOOD-PECKER. Charlet.

Il est de la grandeur du précédent ; il a cependant la tête & le col plus épais, & le bec plus allongé. Les parties supé-

Magnitudine à præcedente nihil propemodum differt ; caput tamen & collum crassiora , rostrumque

prolixius obtinet. Partes capitæ & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ rectrices sunt luteæ, ferrugineo adumbratæ. Synciput, guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus cooperientes lutei sunt coloris. Oculorum ambitus ferrugineus est. Rectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, dorso concolores : majores à corpore remotiores ferrugineæ. Remiges majores eodem imbutæ colore : minores luteæ, ferrugineo adumbratæ. Caudam componunt decem rectrices remigibus minoribus concolores. Rostrum ferrugineum est. Pedes ex cinereo cœrulescentes; ungues verò nigri. Secundum *Aldrovandum*, habitat in *Persia*.

rieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un jaune mêlé d'une légère teinte de ferrugineux. Le synciput, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont jaunes. Le tour des yeux est d'une couleur ferrugineuse. Les petites couvertures du dessous des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont ferrugineuses. Les grandes plumes de l'aile sont de la même couleur : les moyennes sont d'un jaune mêlé d'une légère nuance de ferrugineux. La queue est composée de dix plumes de la même couleur que les moyennes de l'aile. Le bec est ferrugineux. Les pieds sont d'un cendré-bleuâtre ; & les ongles noirs. *Aldrovande* dit qu'on le trouve en *Perse*.

** 6. LE PIC NOIR.

Picus niger; capite superiore & occipitio rubris; rectricibus nigris. (*Mas*).

Picus nigricans ; occipitio rubro ; rectricibus nigricantibus ; (*Fœmina*) *PICUS NIGER*.

Picus niger, vertice coccineo. *Faun. Suec. Linn. N°.* 79.

Picus niger. Frisch. hujus icon accurata Tab. 34.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 41. sp. 1.

Picus niger, seu formicarius. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 338.

Picus niger maximus. Willugh. Ornith. pag. 92. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXI.*

Raj. Syn. Avi. pag. 42. *N°.* 1.

Picus niger, maximus nostras. *Klein. Avi. pag.* 26. *N°.* 1.

Picus totus niger. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XIII. sp. 2.

Picus maximus, vel *niger. Gefn. Avi. pag.* 707. *hujus icon satis accurata pag.* 708.

Gefn. icon. Avi. pag. 35, *in qua eadem icon.*

Picus maximus. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 843. *hujus icon satis accurata pag.* 844.

Jonst. Avi. pag. 79. *hujus icon à Gefnero mutuata Tab. 41, sub titulo, Picus maximus niger.*

Picus maximus Gefneri; *Picus maximus niger Aldrovandi*; *Picus niger*, seu formicarius *Schwenckfeldii. Rzac. Auth. Hist. nat. Pol. pag.* 413.

Tertia species Dryocolaptæ, Aristoteli. Gefn.

Pyrhocorax Agricolaë. Schwenck. Klein.

Grimpereau noir. Alb. Tom. II. pag. 20; *avec une figure mal coloriée Pl. 27.*

Les Espagnols l'appellent BEQUEBÓ. Gefn. Aldrov.

Les Italiens, PICO; PICCHIO. Gefn. SGIAIA. Aldrov.

Les Allemands, HOLTZ-KRAEE; KRAE-SPECHT. Gefn. Aldrov. HOLTZ-KRAHE; KRAH-SPECHT. Schwenck. GROSSER SPECHT; SCHWARTZER SPECHT. Gefn. Schwenck. Rzac. SCHWARTZ SPECHT. Frisch. HOLTZ-HUN, Aldrov. Schwenck.

Les Silésiens, HOL-KRAHE. Schwenck. HOL-KRAEE. Gefn. Aldrov.

Les Polonois, DZIECIOL NAYWIEKSZY. Rzac.

Les Suédois, SPILL-KRAOKA; TILL-KRAOKA. Linn.

Les Anglois, GREAT BLACK WOOD-PECKER. Willugh. Raj. Alb.

Il est un peu plus gros que le *Choucas*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces cinq lignes de long; sa

Monedulam crassitie paululum superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem & quinque pollices explet, & ad extremos ungues tredecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos duos pollices

& quinque lineas longum est; cauda sex pollices & totidem lineas; pes sexdecim lineas; digitorum anticorum exterior cum ungue quindecim cum semi lineas, interior unum pollicem; posteriorum extimus quatuordecim cum semi lineas; intimus sex cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & trium pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Per universum corpus pennis vestitur nigris, exceptis tamen capite superiore & occipitio eleganter rubris. Remiges alarum, sicut & decem caudæ rectrices, eodem imbuuntur nigro ac corpus ipsum tingitur. Remix prima brevissima est. Binæ rectrices intermedia lateralium longitudinem paululum antecellunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Rostrum superne & inferne ex cinereo nigricat, ad latera candicat. Pedes in parte anteriore ad mediam circiter longitudinem usque pennis obteguntur: reliquum pedum, digiti, ungueſque sunt cinerei.

queue six pouces six lignes; son pied seize lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, quinze lignes & demie, l'intérieur un pouce; l'extérieur de ceux de derrière quatorze lignes & demie, & l'intérieur six lignes & demie. Il a deux pieds trois pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes noires, si l'on en excepte cependant la partie supérieure de la tête & l'occiput, qui sont d'un beau rouge. Les plumes de l'aîle, ainsi que les dix qui composent la queue, sont du même noir que le corps. La première des plumes de l'aîle est extrêmement courte. Les deux du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un cendré noirâtre dessus & dessous, & blanchâtre sur ses côtés. Les pieds sont couverts de plumes dans leur partie antérieure environ jusqu'à la moitié de leur longueur: le reste des pieds, les doigts & les ongles sont cendrés.

La femelle diffère du mâle par sa couleur. Elle est noirâtre par tout le corps, & n'a de rouge que l'occiput.

On le trouve sur les montagnes. Il a été envoyé de Suisse à M. de Reaumur par M. Gannebin.

Fœmina à mare colore discrepat. In toto corpore nigricat; & in ea nil nisi occipitium rubet.

Habitat in montibus. Ab Helvetia in museum Reaumurianum missus à D. Gannebin.

7. LE PIC NOIR DE LA NOUVELLE ANGLETERRE:

Picus niger; occipitio rubro; marginibus alarum & imo ventre candidis; rectricibus nigris . . . PICUS NIGER NOVÆ ANGLIÆ.

Picus niger minimus. Klein. Avi. pag. 27. N°. 4.

Petit Grimpereau noir. Alb. Tom. III. pag. 9; avec une figure mal coloriée Pl. 23.

Les Anglois l'appellent LESSER BLACK WOOD-PECKER. Alb.

Il n'est guères plus gros que le *petit Pic varié*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue un pouce onze lignes; son pied quatre lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, sept lignes; l'intérieur six lignes; l'extérieur de ceux de derrière six lignes & demie, & l'intérieur trois lignes. Il a environ dix pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont

Picum varium minorem crassitie non multum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & sex circiter lineas aequat, & ad extremos ungues quatuor pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda unum pollicem & undecim lineas; pes quatuor cum semi lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue septem lineas; intimus sex lineas; posticorum extimus sex cum semi lineas; intimus tres lineas. Alis expansis, extremitates

mitates majorum remigum decem circiter pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem extenduntur. In toto corpore pennis vestitur nigris, exceptis tamen occipitio rubro, & marginibus alarum, imoque ventre candidis. Alarum remiges, sicut & caudæ rectrices, eodem imbuuntur nigro, ac corpus ipsum tingitur. Binæ rectrices intermedia lateralium longitudinem paululum superant; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Oculorum irides candicantes. Rostrum fuscum. Pedes flavescentes; ungues verò nigri. Habitat in *Nova Anglia*.

pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes noires, si l'on en excepte l'occiput, qui est rouge, & le bord des ailes & le bas-ventre qui sont blancs. Les plumes de l'aile & celles de la queue sont du même noir que le corps. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est blanchâtre. Le bec est brun. Les pieds sont jaunâtres; & les ongles noirs. On le trouve à la *Nouvelle Angleterre*.

8. LE PIC NOIR DU MEXIQUE.

Picus niger, infernè dilutè griseo transversim & undatim striatus; alis dilutè griseo variegatis; rectricibus nigris . . .
PICUS NIGER MEXICANUS.

Ardeæ Mexicanæ species singularis. Seb. Vol. I. pag. 101. hujus icon satis accurata (exceptis pedibus) Tab. LXV. fig. 2.

Jaculator; *Ardeæ Mexicanæ species singularis. Klein. Avi. pag. 127. N°. 1.*

Diomedæa. Moehr. Avi. Gen. 104.

Cum Cornice crassitie circiter convenit. Ipsius longi-
Tom IV.

Il est à peu près de la grosseur d'une Corneille. Sa longueur
D

depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quinze pouces , & jusqu'à celui des ongles de pareille mesure. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces sept lignes de long ; sa queue quatre pouces ; son pied quinze lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , deux pouces trois lignes , l'intérieur un pouce neuf lignes ; l'extérieur de ceux de derrière deux pouces , & l'intérieur dix lignes. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes noires : cette couleur est variée sur la poitrine , le ventre & les jambes de bandes transversales & en zigzags d'un gris clair. Les aîles sont aussi variées de ce même gris. Les plumes de la queue sont tout-à-fait noires. *Seba* ne dit rien de la couleur du bec , non plus que de celle des pieds. On le trouve au *Mexique*.

tudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim circiter pollices aequat , & ad extremos ungues eandem mensuram obtinet. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & septem lineas longum est ; cauda quatuor pollices ; pes quindecim lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue duos pollices cum tribus lineis , intimus unum pollicem & novem lineas ; posticorum extimus duos pollices , intimus decem lineas. Alæ complicatae mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Totum corpus vestiunt pennæ nigrae ; nigredinem autem in pectore , ventre & cruribus variegant tæniæ transversæ & undatæ dilutè griseæ. Eodem quoque griseo variegantur alæ. Caudæ rectrices sunt penitus nigrae. De rostri , pedumque colore apud *Sebam* nulla fit mentio. Habitat in *Mexico*.

9. LE PIC NOIR HUPÉ DE LA CAROLINE.

Picus cristatus, niger ; cristâ coccineâ ; tæniâ utrinque candidâ ab oculis secundum colli latera protensâ ; dorso infimo , uropygio & remigibus minoribus albis ; rectricibus nigris . . . *PICUS NIGER CAROLINENSIS CRISTATUS*;

Picus niger, rostro albo, priori major. *Klein. Avi. pag. 26. N°. 2.*

Picus varius Brasiliensis Ipecu dictus *Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 95. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XXII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 43. N°. 7.

Picus Imbrifoetus. Euf. Nieremb. pag. 223.

Jonst. Avi. pag. 157.

Willugh. Ornith. pag. 301.

Quatotomomi. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 50. Cap. CLXXXVI.

Quatotomomi, *Picus Imbrifoetus Nierembergii. Raj. Syn. Avi. pag. 162.*

Ipecu Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 207, in qua hujus icon minimè accurata.

Jonst. Avi. pag. 142. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 59.

Pic de la premiere grandeur au bec blanc. Catesb. Tom. I. pag. 16; avec une figure exacte Pl. 16.

Les Anglois l'appellent LARGEST WHITE-BILL WOOD-PECKER. Catesb.

Les Espagnols, CARPENTEROS. Catesb.

Les Portugais du Brésil, CORTA PAO. Marcgr. Jonst.

Les Brasiliens, IPECU. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Les Mexiquains, QUATOTOMOMI. Fern. Raj.

Craffitie præcedentem æmulatur. Ipsiꝯ longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sexdecim circiter pollices explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices longum est; cauda quatuor pollices & novem lineas; pes quindecim lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & octo lineas, intimus quindecim lineas; posticorum exterior duos pollices cum totidem lineis, interior tredecim lineas. Alæ complicatæ caudam extre-

Il est de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ seize pouces, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces de long; sa queue quatre pouces neuf lignes; son pied quinze lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes; l'intérieur quinze lignes; l'extérieur de ceux de derriere deux pouces deux lignes, & l'intérieur treize lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Il porte sur l'occiput

une belle hupe composée de plumes rouges, dont quelques-unes ont près de deux pouces de long. Le reste de la tête, le col, la partie supérieure du dos, la poitrine, le ventre, les jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, celles du dessous de la queue & les côtés sont noirs. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un beau blanc. De chaque côté de la tête est une bande de la même couleur, qui part de l'angle de l'œil, & s'étend, en se courbant, tout le long des côtés du col. Les trois ou quatre premières plumes de l'aîle sont noires : toutes les autres sont blanches. La queue est composée de dix plumes noires. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est jaune. Le bec est blanc. Les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *la Caroline*, en *Virginie*, dans la *Nouvelle Espagne* & au *Brésil*.

nam fermè pertingunt. In occipitio elegantem gerit cristam rubris conflata pen- nis, quarum quædam ad duorum pollicum longitudinem accedunt. Reliquum caput, collum, dorsi suprema pars, pectus, venter, latera, crura, pennæ scapulares, quæ alas superne & infernè obtinent, inferioresque caudæ rectrices nigri sunt coloris. Dorsum infimum, uropygium & superiores caudæ rectrices albore nitent. In utroque capitis latere tænia extat candida, ab oculi cantho orta, quæ deinde reflexa, secundum colli latera protenditur. Tres, quatuorve primores remiges sunt nigra : reliquæ omnes albe. Decem rectricibus nigris cauda conflatur. Binæ inter, media lateralium longitudinem paululum excedunt : laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Oculorum irides luteæ. Rostrum candidum. Pedes, unguesque nigri. Habitat in *Carolina*, *Virginia*, *Nova Hispania* & *Brasilia*.

10. LE PIC NOIR HUPÉ DE VIRGINIE.

Picus cristatus, superne niger, infernè nigricans; maculâ in medio dorso candidâ; (capite superiùs & cristâ coccineis *mas*); (capite superiùs fusco; cristâ coccineâ *fœmina*); genis & collo inferiùs & ad latera pallidè luteis; fasciâ per oculos nigrâ; (taniâ utrinque secundùm maxillam inferiorem rubrâ *mas*); rectricibus nigris . . . PICUS NIGER VIRGINIANUS CRISTATUS.

Picus niger cristâ coccineâ. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 41. sp. 11.

Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 143.

Picus niger, toto capite rubro, rostro plumbeo. *Klein. Avi. pag. 26. N^o. 3.*

Picus Americanus niger, cristâ coccineâ. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XIII. sp. 10.*

Grand Piverd à tête rouge. *Catesb. Tom. I. pag. 17; avec une figure pas assez exacte Pl. 17.*

Les Anglois l'appellent LARGER RED-CRESTED WOOD-PECKER. Catesb.

Les François de la Guiane, CHARPENTIER. Barr.

Les Indiens de la Guiane, VENTOU. Barr.

Præcedenti crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim circiter pollices æquat, & ad extremos ungues unum pedem. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices longum est; cauda sex pollices; pes tredecim lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & quatuor lineas, intimus decem cum semi lineas; posticorum extimus quindecim lineas, intimus sex lineas. Alæ complicatæ ad

Il n'est pas si gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quinze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces de long; sa queue six pouces; son pied treize lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes, l'intérieur dix lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière quinze lignes, & l'intérieur six lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent

presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Tout le dessus de la tête est couvert de longues plumes rouges, qui forment une belle hupe; & de chaque côté de la tête est une bande pareillement rouge, qui s'étend tout le long de la mâchoire inférieure. Au-dessous de la hupe est de chaque côté une étroite bande blanche, qui part de l'angle de l'œil, & s'étend jusque vers l'occiput. Une large bande noire part de l'origine du bec, & s'étend aussi jusque vers l'occiput, en passant par les yeux. Les joues, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col sont d'un jaune pâle. Au milieu de cette couleur est une bande noire, qui part des coins de la bouche, & s'étend tout le long des côtés du col. La partie supérieure du col, le dos & le croupion sont noirs. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont de la même couleur: il y a cependant au milieu du dos une grande tache blanche, & une ou deux petites taches de la même couleur sur les grandes couvertures du dessus des ailes les plus éloignées du corps. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue

duas ferè tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Totum caput superius longis vestitur pennis rubris, elegantem cristam efficientibus; & in utroque capitis latere tænia extat concolor, secundum maxillam inferiorem protensa. Infra cristam utrinque adest stricta tænia candida, ab oculi cantho orta, & versùs occipitium usque producta. Lata ab exortu rostri oritur tænia nigra, quæ, per oculos ducta, versùs occipitium usque similiter protenditur. Genæ, guttur, collumque inferiùs & ad latera sunt pallidè luteæ. In medio lutei coloris nigra extenditur tænia, ab oris angulis orta, & secundum colli latera protensa. Collum superius, dorsum & uropygium nigra sunt. Pennæ scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudæ rectrices concolores: medium tamen dorsum variegat majuscula macula candida, & rectrices alarum superiores majores à corpore remotiores unâ aut binis insigniuntur minutis maculis similiter candidis. Pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices nigricant. Remiges

maiores sunt nigrae, attamen pauco donantur albo in exortu, idque ad latus exterius tantum: minores penitus nigrae. Caudam componunt decem rectrices concolores. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum antecellunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Oculorum irides aureæ. Palpebræ plumbeo colore tinctæ. Rostrum quoque plumbeum. Pedes, unguesque nigri.

Fœmina à mare discrepat in eo quod nil habeat rubri in maxilla inferiore, & caput anteriùs sit fuscum.

Insectis visitant Aves istæ. Habitat in Virginia, Carolina & Guiana.

sont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle sont noires, excepté qu'elles ont un peu de blanc à leur origine du côté extérieur seulement: les moyennes sont tout-à-fait noires. La queue est composée de dix plumes de la même couleur. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est de couleur d'or. Les paupières sont de couleur de plomb. Le bec est de cette dernière couleur. Les pieds & les ongles sont noirs.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle n'a point de rouge sur la mâchoire inférieure, & que le devant de sa tête est brun.

Ces Oiseaux se nourrissent d'*Insectes*. On les trouve en *Virginie*, à la *Caroline*, & dans la *Guiane*.

** II. LE PIC NOIR HUPÉ DE CAYENNE.

Voyez Pl. I. Fig. 2.

Picus cristatus, superne niger, infernè albo-rufescens, nigro transversim striatus; capite superiùs & cristâ coccineis; tæniâ utrinque candidâ ab oris angulis infra oculos & secundum colli latera ad medium dorsum protensâ; rectricibus nigris . . . PICUS NIGER CAYANENSIS CRISTATUS.

Il est à peu près de la longueur de notre *Pic verd.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes & demie de long; sa queue cinq pouces trois lignes; son pied un pouce; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, seize lignes & demie, l'intérieur un pouce; l'extérieur de ceux de derrière treize lignes, & l'intérieur sept lignes & demie. Il a un pied huit pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête & l'occiput sont couverts de plumes d'un très-beau rouge. Celles de l'occiput sont plus longues que les autres, & forment une huppe de la même couleur. De chaque côté de la tête est une bande du même rouge, qui s'étend tout le long de la mâchoire inférieure depuis l'origine du bec jusque vers le col. Les joues sont d'un cendré-noirâtre. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les ouvertures du dessus des aîles &

Cum *Pico viridi nostrate* crassitie circiter convenit. Iplius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices cum lineis binis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem cum semi lineas longum est; cauda quinque pollices & tres lineas; pes unum pollicem; digitorum anticorum extimus cum ungue sexdecim cum semi lineas, intimus pollicem unum; posteriorum extimus tredecim lineas, intimus septem cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis octo pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad tres ferè quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput superius & occipitium vestiunt pennæ elegantissimè coccineæ. Quæ occipitium obtinent, reliquarum longitudinem excedunt, & cristam coccineam efficiunt. In utroque capitis latere tania extat similiter coccinea, secundum maxillam inferiorem ab exortu rostri versùs collum usque protensa. Genæ ex cinereo

Nereio nigricant. Partem colli superiorem, dorsum, uropygium, pennas scapulares, alas superne vestientes & superiores caudæ tectrices niger tingit color. Utrunque adest tænia candida, ab oris angulis orta, infra oculos & secundum colli latera ducta, dein, majorem latitudinem obtinens, medium versum dorsum usque protensa. Guttur obtegunt pennæ albo-rufescentes, lineâ nigrâ, secundum scapi longitudinem ductâ, insignitæ. Quæ partem colli inferiorem & pectus vestiunt, sunt nigræ, in apice albo-rufescente fimbriatæ. Venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores ex albo rufescunt, & nigro transversim striantur. Tectrices alarum inferiores, sicut & alarum margines, albescent. Remiges sunt nigræ, attamen in latere interiore ab ipsarum exortu ad tertiam circiter longitudinis partem usque candidæ. Decem rectricibus nigris cauda constat. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum superant; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum corneo co-

celles du dessus de la queue sont d'un beau noir. De chaque côté est une bande blanche, qui part des coins de la bouche, passe par-dessous les yeux, s'étend tout le long des côtés du col, & va, en s'élargissant, jusque vers le milieu du dos. La gorge est d'un blanc-roussâtre, chaque plume étant marquée d'une ligne noire, qui s'étend selon la longueur de sa tige. La partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes noires, bordées par leur bout de blanc-roussâtre. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-roussâtre rayé transversalement de noir. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Le bord de l'aile est de la même couleur. Les plumes de l'aile sont noires, excepté leur côté intérieur, qui est blanc depuis son origine jusque vers le tiers de sa longueur. La queue est composée de dix plumes noires. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est de couleur de corne. Les pieds & les ongles sont gris. On le trouve à *Cayenne*;

d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

lore imbutum. Pedes, unguisque grisei. Habitat in *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. des Essars*.

12. LE PIC VARIÉ HUPE D'AMÉRIQUE.

Picus cristatus, fulvo & nigro varius; cristâ fulvo-aureâ; genis rubicundis; maculâ rostrum inter & oculos purpureâ; rectricibus nigris *PICUS VARIUS AMERICANUS CRISTATUS*.

Avis quædam Americæ. *Gesn. Avi. pag. 802*, in qua hujus icon notæ satis accurata.

Il est à peu près de la grandeur du *Pic verd*. Il porte sur la tête une très-longue hupe d'un fauve-doré. Ses joues sont rouges. Entre le bec & les yeux est une tache pourpre. Tout le reste de son corps est couvert de plumes fauves & noires. Celles de sa queue sont cependant entièrement noires. Il se nourrit de vers. On le trouve en *Amérique*.

Picum viridem magnitudine circiter æmulatur. Longissimam in capite gerit cristam fulvo-auream. Genæ sunt rubicundæ. Rostrum inter & oculos macula extat purpurea. In toto reliquo corpore pennis vestitur fulvis & nigris. Caudæ tamen rectrices sunt penitus nigre. Vermibus victitat. Habitat in *America*.

** 13. LE GRAND PIC VARIÉ.

Picus superne niger, infernè griseo-rufescens; (fasciâ transversâ in occipitio rubrâ mas); imo ventre rubro; taniâ utrinque nigrâ ab oris angulis infra genas & secundum collâ latera ad pectus usque protensâ; rectricibus nigris, tribus utrinque extimis apice sordide albo-rufescentibus, nigro transversim striatis *PICUS VARIUS MAJOR*.

Picus albo nigroque variegatus, vertice nigro, rectricibus tribus lateralibus utrinque albescentibus. *Faun. Suec. Linn. N°. 81*.

Picus niger, occipite & uropygio coccineis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XIII. sp. 1.*

Picus varius major. *Willugh. Ornith. pag. 94.*

Raj. Syn. Avi. pag. 43. N°. A. 4.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 41. sp. 3.

Picus discolor. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 36.*

Klein. Avi. pag. 27. N°. 6.

Πίπρξ Aristotelis. *Willugh.*

Grand Grimpereau, ou Piverd bigarré. *Alb. Tom. I. pag. 18; avec une figure mal coloriée Pl. 19.*

Les Catalans l'appellent PICOT VERMELL; PIGOT. Barr.

Les Italiens, CUL ROSSO. Willugh.

Les Allemands, BUNT-SPECHT. Frisch.

Les Suédois, GYLLENRENNÄ. Linn.

Les Anglois, GREAT SPOTTED WOOD-PECKER. Alb. GREATER SPOTTED WOOD-PECKER; WITWAL. Willugh. Raj.

Craffitie Merulam adæquat aut etiam nonnihil superat. Ipsi longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos unguis septem pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda tres pollices cum septem lineis; pes undecim lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue decem cum semi lineas, intimus octo lineas; posticorum exterior undecim lineas, interior sex lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum quindecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ lon-

Il est de la grosseur d'un *Merle*, ou même un peu plus gros. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue trois pouces sept lignes; son pied onze lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, dix lignes & demie, l'intérieur huit lignes; l'extérieur de ceux de derrière onze lignes, & l'intérieur six lignes. Il a quinze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les cou-

vertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un noir brillant. Les plumes scapulaires sont blanches. Sur l'occiput est une large bande transversale rouge. Le synciput est roussâtre. Les narines sont couvertes de plumes noires, roides & tournées en-devant. Les côtés de la tête sont d'un blanc mêlé d'une très-légère teinte de roussâtre. Il y a sur chaque côté du col une grande tache de la même couleur. Des coins de la bouche part une bande noire, qui passe au-dessous des joues, s'étend tout le long des côtés du col, & delà jusque vers la poitrine. De cette bande noire en partent deux autres de la même couleur, dont l'une passe par-dessus & l'autre par-dessous la tache blanche des côtés du col, dont nous avons parlé ci-dessus, & vont ainsi joindre le noir du dessus du col. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre, les côtés & les jambes sont d'un gris - roussâtre. Le bas - ventre & les couvertures du dessous de la queue sont rouges. Celles du dessous des ailes sont blanches, & variées de quelques taches noirâtres. Les plumes de l'aile sont noires, & marquées des deux côtés de taches transversales blanches; il

gitudinem extenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, superiores alarum tectrices & pennæ caudam superne cooperientes sunt splendide nigrae. Pennæ scapulares albae. Latæ fasciæ transversæ rubræ occipitium insignitur. Synciput rufescit. Nares obtegunt pennæ nigrae, rigidae, antrorsum versæ. Caput ad latera albet, & aliquid rufescentis admixtum habet. In utroque colli latere majuscula extat macula concolora. Ab oris angulis nigra oritur tania infra genas & secundum colli latera ducta, indeque versùs pectus usque protensa. Ab ista tania nigra binæ oriuntur aliæ taniæ concolores, quarum una supra, altera infra maculam albam, ad colli latera positam, de qua suprâ mentio facta est, protenduntur, & sic nigrum colorem, collum superius tingentem, pertingunt. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter supremus, latera & crura ex griseo rufescunt. Venter imus & tectrices caudæ inferiores rubent. Pennæ alas subtus obtegentes albae, & maculis quibusdam nigricantibus variegantur. Alarum remiges

sunt nigræ, in utroque latere maculis transversis albis insignitæ; remix tamen prima maculis albis in latere tantum interiore donatur. Hæc est brevissima: quarta & quinta sunt omnium longissimæ. Decem rectricibus cauda conflatur: quatuor intermedix nigræ: tres utrinque extimæ eodem imbuuntur colore, sed apicibus donantur sordidè albo-rufescentibus, nigro transversim striatis. Qui color albo-rufescens eò magis versùs cunjuslibet rectricis exortum protenditur, quò rectrix sit exterior: ita ut in rectrice extima supra duas tertias longitudinis partes extendatur, in proximè sequenti supra tertiam partem, in tertia verò apicem tantum occupet. Binæ rectrices intermedix lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Oculorum irides rubescentes. Rostrum corneo-nigricante colore tinctum. Pedes plumbeo colore imbuti; ungues verò fuscī.

Fœmina à mare discrepat in eo quod in occipitio nil rubri habeat.

faut cependant excepter la première, qui n'a des taches blanches que du côté intérieur. Celle-ci est extrêmement courte: la quatrième & la cinquième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de dix plumes: les quatre du milieu sont noires: les trois plus extérieures de chaque côté sont de la même couleur, mais elles sont terminées d'un blanc sale & rouffâtre, rayé transversalement de noir. Ce blanc s'étend d'autant plus loin vers l'origine de chaque plume, qu'elle est plus extérieure: de sorte qu'il occupe les deux tiers de la longueur de la plus extérieure, le tiers de celle qui la suit immédiatement, & seulement le bout de la troisième. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est rougeâtre. Le bec est de couleur de corne-noirâtre. Les pieds sont de couleur de plomb; & les ongles bruns.

La femelle diffère du *mâle* en ce qu'elle n'a point de rouge à l'occiput.

Ils se nourrissent d'*Insectes*, *Insectis* victitant, & in arborum foraminibus nidificant. *Du cabinet de M. de Reaumur.* *Ex museo Realmuriano.*

** 14. LE PIC VARIÉ.

Voyez Pl. II. Fig. 1.

Picus superne niger, infernè albo-flavicans, pennis laterum ad scapum nigris; vertice & occipitio rubris; imo ventre roseo; taniâ utrinque in pectore nigrâ; rectricibus nigris, duabus utrinque extimis ultimâ medietate sordidè albis, nigro transversim striatis, proximè sequenti apice exterius sordidè albâ PICUS VARIUS.

Picus albo nigroque varius; rectricibus tribus lateralibus apice albo variegatis. *Faun. Suec. Linn. N°. 82.*

Picus varius ex albo & nigro. *Gesn. Avi. pag. 709, in qua hujus icon minùs accurata.*

Picus varius, albo nigroque distinctus. *Gesn. icon. Avi. pag. 36, in qua eadem icon.*

Picus major. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 845. hujus icon minimè accurata pag. 846.*

Jonst. Avi. pag. 79. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 41: & insuper altera icon à Gesnero mutuata eâdem Tab. sub titulo, Picus varius.

Picus varius major. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 339.*

Willugh. Orniuh. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXI.

Charlet. Exer. pag. 93. N°. 2.

Charlet. Onomazt. pag. 86. N°. 2.

Picus varius major *Schwenckfeldii. Rzac. Auc. Hist. nat. Pol. pag. 414.*

Pic verd rouge, nommé en françois Epeiche. *Bel. Hist. nat. des Oisf. pag. 300; avec une mauvaise figure pag. 301.*

Epeiche, Cul rouge; Pic rouge. *Bel. Portr. d'Oisf. pag. 74b, dans laquelle est la même figure.*

Les Manccaux l'appellent CUL ROUGE. Bel.

Les Grecs, ΠΙΡΡΑ. Bel. Schwenck. Jonst. Charlet.

Les Italiens, PIGOZO. Bel. PIPRA; PIPO; CUL ROSSO. Aldrov.

Les Allemands, ELSTER-SPECHT. *Gefn. Aldrov. Schwenck. Rzac.* BUNTER-SPECHT. *Gefn. Aldrov.* BUNTER-SPECHT. *Schwenck. Rzac.* GESPREGLETER-SPECHT; WEIS-SPECHT. *Schwenck.* WYSS-SPECHT. *Gefn.*
Les Suisses, AGERST-SPECHT ou AGERSTEN-SPECHT. *Gefn. Aldrov.*
Les Polonois, DZIECIOL PSTRY WIEKSZY. *Rzac.*
Les Anglois, FRENCH-PIE. *Charlet.*

Præcedenti nonnihil craf-
 titie cedit. Ipsiꝯ longitudo
 ab apice rostri ad caudam
 extremam octo pollices &
 sex lineas æquat, & ad ex-
 tremos ungues septem polli-
 ces. Rostrum ab ipsius apice
 ad oris angulos usque tredecim
 lineas longum est; cauda
 tres pollices & totidem li-
 neas; pes novem lineas; digi-
 torum anticorum extimus
 cum ungue decem lineas,
 intimus octo cum semi lineas;
 posticorum extimus decem
 lineas, intimus quinque li-
 neas. Ab extremo ad extre-
 mum alarum extensarum dis-
 tantia est tredecim pollicum
 & sex linearum; alæ verò
 complicatæ paulò ultra me-
 diam caudæ longitudinem
 extenduntur. Synciput est
 fordidè griseum. Nares coo-
 periunt pennæ concolores,
 rigidæ, antrorsum versæ. Ca-
 pitis vertex & occipitium ru-
 bro imbuuntur. Pars colli su-
 perior, dorsum, uropygium,
 pennæ caudam superne ves-
 tientes & superiores alarum
 tectrices minores eleganti

Il est un peu moins gros que
 le précédent. Sa longueur de-
 puis le bout du bec jusqu'à ce-
 lui de la queue est de huit pou-
 ces six lignes, & jusqu'à celui
 des ongles de sept pouces. Son
 bec depuis son bout jusqu'aux
 coins de la bouche a treize li-
 gnes de long; sa queue trois pou-
 ces trois lignes; son pied neuf
 lignes; le doigt extérieur de de-
 vant, joint avec l'ongle, dix li-
 gnes, l'intérieur huit lignes &
 demie; l'extérieur de ceux de
 derriere dix lignes, & l'intérieur
 cinq lignes. Il a treize pouces six
 lignes de vol; & ses aîles, lors-
 qu'elles sont pliées, s'étendent
 un peu au-delà de la moitié de
 la longueur de la queue. Le
 synciput est d'un gris sale. Les
 narines sont couvertes de plu-
 mes de la même couleur, roides
 & tournées en-devant. Le som-
 met de la tête & l'occiput sont
 rouges. Le dessus du col, le
 dos, le croupion, les couver-
 tures du dessus de la queue &
 les petites du dessus des aîles
 sont d'un beau noir. Les plumes
 scapulaires sont blanches. Les
 côtés de la tête sont d'un gris-

blanc; & sur chacun est une bande longitudinale d'un gris-brun, qui part de l'origine du demi-bec inférieur, & s'étend jusque vers le col. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine & le haut du ventre sont d'un blanc-jaunâtre. Sur chaque côté de la poitrine est une large bande noire, qui borde cette couleur. Les côtés sont d'un blanc-jaunâtre, mêlé d'une légère teinte de couleur de rose, & chaque plume est marquée d'une ligne noire, qui s'étend selon la longueur de la tige. Le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue sont de couleur de rose. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Les grandes du dessus les plus éloignées du corps sont noires, & marquées d'une tache blanche sur chacun de leurs côtés vers le bout; & les plus proches du corps sont blanches, & variées de taches noires du côté intérieur seulement. Les plumes de l'aile sont noires, & marquées des deux côtés de taches blanches. La queue est composée de dix plumes : les quatre du milieu sont noires : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est de la même couleur, mais son côté extérieur est d'un blanc sale vers le bout : les deux plus

nigro tinguntur. Pennæ scapulares albescent. Caput ad latera ex griseo albescit; & in utroque latere tænia extat longitudinalis griseo-fusca, ab exortu mandibulæ inferioris orta, & versùs collum usque protensa. Guttur, pars colli inferior, pectus & venter supremus ex albo flaviscant. In utroque pectoris latere lata adest tænia nigra, ad oras albo-flaviscantis coloris posita. Latera ex albo flaviscant, cum aliqua rosei coloris mixtura, & qualibet penna lineâ insignitur nigrâ; secundùm scapi longitudinem ducta. Venter imus, inferioresque caudæ rectrices roseo imbuuntur colore. Pennæ alas subtus obtegentes albescent. Superiores alarum rectrices majores à corpore remotiores sunt nigrae, & versùs apicem in utroque latere maculæ albæ notatæ : corpori viciniore candidæ; maculis nigris in latere tantùm interiore variegatæ. Remiges nigrae, maculis albis in utroque latere insignitæ. Caudam componunt decem rectrices, quarum quatuor intermediae nigrae : utrinque proximè sequens concolor; attamen apice exterius sordidè allicans : binæ utrinque
extimæ

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XIII.* 41

extimæ ab ipsarum exortu ad
mediam circiter longitudi-
nem usque nigræ, in reliqua
longitudine fordidè albæ,
quæ albedo in utrinque exti-
ma exterius & interius, in al-
tera interius tantùm nigro est
transversim striata. Binæ rec-
trices intermediæ lateralium
longitudinem paululùm ex-
cedunt; laterales autem sen-
sim atque sensim longitudine
minuuntur ad utrinque exti-
mam usque breviorē. Ros-
trum nigricans. Pedes, un-
guesque cinereo-nigricantes.
Insectis victitat, & in arbo-
rum foraminibus nidificat.
Ex museo Realmuriano.

extérieures de chaque côté sont
noires depuis leur origine jus-
que vers la moitié de leur lon-
gueur, le reste est d'un blanc
sale, rayé transversalement de
noir sur les deux côtés de la plus
extérieure & seulement sur le
côté intérieur de l'autre. Les
deux plumes du milieu de la
queue sont un peu plus longues
que les latérales, qui vont tou-
tes en diminuant de longueur
par degrés jusqu'à la plus exté-
rieure de chaque côté, qui est
la plus courte. Le bec est noi-
râtre. Les pieds & les ongles
sont d'un cendré-noirâtre. Il
se nourrit d'*Insectes*, & fait
son nid dans des trous d'ar-
bres. *Du cabinet de M. de Reau-
mur.*

** 15. LE PETIT PIC VARIÉ.

Picus superne niger; albo transversim striatus, infernè rufes-
cens, pennis laterum ad scapum nigricantibus; (vertice
rubro *mas*); taniâ utrinque nigrâ ab oris angulis infra ocu-
los & secundum colli latera protensâ; rectricibus nigris;
duabus utrinque extimis ultimâ medietate albis, nigro trans-
versim striatis, proximè sequenti apice albâ PICUS
VARIUS MINOR.

Picus albo nigroque varius; rectricibus tribus lateralibus semî nigris.
Faun. Suec. Linn. N°. 83.

Picus varius minor. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 847, in qua maris icon
minimè accurata.*

Schwenck. Avi. Sil. pag. 340.

Jonst. Avi. pag. 79. maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. 41.

Willugh. Ornith. pag. 94. maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXI.

Tome IV,

F

- Raj. Syn. Avi. pag. 43. N°. A. 5.*
Charlet. Exer. pag. 93. N°. 1.
Charlet. Onomazt. pag. 86. N°. 1.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.
Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 41. sp. 4.
Picus varius minor Schwenckfeldii. Razac. Aucl. Hist. nat. Pol. pag. 414.
Picus varius minimus. Gefn. icon. Avi. pag. 36.
Picus varius tertius. Raj. Syn. Avi. pag. 43. N°. 6.
Picus alius minor, Grafs-Specht Germanicè, id est, Picus graminis dictus. Gefn. Avi. pag. 709.
Picus discolor minor. Frisch. maris & fæminæ icones accuratæ Tab. 37.
Klein. Avi. pag. 27. N°. 7.
Petit Grimpereau, ou Piverd bigarré. Alb. Tom. I. pag. 19; avec une figure passable Pl. 20.
Les Italiens l'appellent PIPRA; PIPO. Aldrov.
Les Allemands, SPECHTLE, GRASS-SPECHT. Gefn. KLEIN BUNDTTER-SPECHT. Schwenck. KLEINER BUNDTTER-SPECHT. Razac. KLEINERE BUNT-SPECHT. Frisch.
Les Polonois, DZIECIOL PSTRY MNIEYSZY. Razac.
Les Anglois, LESSER SPOTTED WOOD-SPITE. Raj. LESSER SPOTTED WOOD-PECKER. Willugh. Alb. LESSER WOOD-PECKER; PIANNET. Charlet. HICKWALL. Willugh. Raj.

Il n'est pas tout-à-fait si gros qu'une *alcuette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces sept lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes & demie de long; sa queue deux pouces; son pied six lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, sept lignes, l'intérieur cinq lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière sept lignes, & l'intérieur trois lignes. Il a neuf pouces deux lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles

Alaudæ paululùm crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & septem lineas æquat, & ad extremos ungues quatuor pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem cum semi lineas longum est; cauda duos pollices; pes sex lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue septem lineas, intimus quinque cum semi lineas; posticorum extimus septem lineas, intimus tres lineas. Ab extremo ad extremum alarum

extensarum distantia est novem pollicum & duarum linearum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra median caudæ longitudinem extenduntur. Synciput rufescit. Nares obtegunt pennæ rufescentes, rigidæ, antrorsum versæ. Vertex capitis rubro imbuatur. Occipitium & collum superius sunt nigra : nigredo autem supra oculos utrinque protenditur. Dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigrae, latis tæniis transversis albis striatæ. Scapulares similiter nigrae, albo transversim striatæ. Superiores caudæ tectrices penitus nigrae. Genæ ex griseo rufescunt. Ponè utrumque oculum minuta extat macula candida, ad colli latera, similiter candida, producta. In utroque capitis latere tænia adest nigra, ad oris angulis orta, infra oculos ducta, & secundum colli latera protensa. Guttur & pars colli inferior rufescunt. Pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ tectrices dilutius rufescunt; pectus autem maculis quibusdam nigricantibus variegatur; & ex pennis latera cooperientibus quælibet lineâ donatur similiter nigricante, secundum

sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Le synciput est roussâtre. Les narines sont couvertes de plumes de la même couleur, roides & tournées en-devant. Le sommet de la tête est rouge. L'occiput & le dessus du col sont noirs; cette couleur s'étend de chaque côté par-dessus l'œil. Le dos, les plumes scapulaires & le croupion sont noirs, & rayés de larges bandes transversales blanches. Les couvertures du dessus de la queue sont tout-à-fait noires. Les joues sont d'un gris-roussâtre. Derrière chaque œil est une petite tache blanche, qui va joindre les côtés du col, qui sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une bande noire, qui part des coins de la bouche, passe par-dessous les yeux, & s'étend tout le long des côtés du col. La gorge & la partie inférieure du col sont roussâtres. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un roussâtre plus clair, varié de quelques taches noirâtres sur la poitrine seulement; & chacune des plumes des côtés est marquée d'une ligne de la même couleur, qui s'étend selon la longueur de sa tige. Les couvertures du dessous des ailes

font blanches. Les petites du dessus sont noires : les grandes sont de la même couleur , mais la plupart sont marquées d'une large bande transversale blanche & d'une tache ronde de la même couleur , placée sur chacun de leurs côtés vers le bout. Les plumes de l'aile sont noires , & variées des deux côtés de taches blanches : ces taches tirent un peu sur le roussâtre sur le côté extérieur , & elles y sont plus petites que sur le côté intérieur. La première des plumes de l'aile n'a cependant de blanc que sur le côté intérieur vers son origine. Elle est extrêmement courte : la quatrième est la plus longue de toutes. La queue est composée de dix plumes : les quatre du milieu sont noires : celle qui les suit immédiatement de chaque côté est de la même couleur , & terminée de blanc : les deux plus extérieures de chaque côté sont noires depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur ; le reste est blanc & marqué dans la plus extérieure de deux bandes transversales noires , & d'une bande seulement dans l'autre : dans cette dernière le blanc s'étend plus loin vers l'origine de la plume sur le côté extérieur que sur l'intérieur. Les deux plumes du milieu de

scapi longitudinem ducta : Quæ alas subtus obtegunt , sunt candidæ. Rectrices alarum superiores minores nigrae : majores concolores ; sed ex istis pleræque latâ insigniuntur taniâ transversâ albâ , & maculâ insuper concolore rotundâ , versûs apicem in utroque latere positâ , notantur. Remiges nigrae , maculis albis in utroque latere variegatae : quæ maculae in latere remigis exteriori nonnihil ad rufescentem colorem inclinant , & in eo minores sunt quàm in interiori. Attamen remix prima interiùs tantùm versûs exortum albo notatur. Remix ista brevissima : quarta omnium longissima. Caudam componunt decem rectrices , quarum quatuor intermediae nigrae : utrinque proximè sequens concolor , apice alba : binæ utrinque extremae ab ipsarum exortu ad mediam circiter longitudinem usque nigrae , in reliqua longitudine albæ ; quæ albedo in extrema binis taniis transversis nigris , in altera unicâ tantùm taniâ insignitur : in hac ultima rectrice albor versûs ipsius exortum magis in latere exteriori quàm in interiori protendi-

tur. Binæ rectrices intermedia lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum saturatè plumbeum sive nigricans. Pedum partem supremam cooperiunt pennæ eodem imbutæ colore ac crura ipsa tinguntur: pedum infima pars, digiti, unguisque plumbei sunt coloris. *Insectis* viçtitat, & in cavis arboribus nidificat. *Ex museo Realmuriano.*

la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est de couleur de plomb foncé ou noirâtre. Le haut des pieds est couvert de plumes de la même couleur que celles des jambes: le bas des pieds, les doigts & les ongles sont de couleur de plomb. Il se nourrit d'*Insectes*, & fait son nid dans des trous d'arbres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 16. LE PIC VARIÉ DE CANADA.

Voyez Pl. II. Fig. 2.

Picus superne niger, dorso superiore albo mixto, infernè albus; occipitio fasciâ pallidè aurantiâ insignito; tæniâ utrinque candidâ ab oris angulis infra oculos & secundum collæ latera protensâ; rectricibus nigris, tribus utrinque extimis ultimâ medietate albis, proximè sequenti sordidè albo versus apicem utrinque notatâ PICUS VARIUS CANADENSIS.

Craffitie *Picum varium* majorem nostratem circiter æmulatur. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices æquat, & ad extremos ungues septem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque

Il est à peu près de la grosseur de notre grand Pic varié. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue

trois pouces cinq lignes; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, a aussi dix lignes de longueur, l'intérieur neuf lignes; l'extérieur de ceux de derrière onze lignes, & l'intérieur cinq lignes & demie. Il a quatorze pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête est noire, & marquée de chaque côté d'une large bande longitudinale blanche, qui passe par-dessus l'œil, & va joindre une large bande transversale d'un orangé pâle, placée sur l'occiput. De chaque côté de la tête est encore une autre bande blanche, qui part des coins de la bouche, passe par-dessous l'œil, & s'étend, en s'élargissant, tout le long des côtés du col. Les narines sont couvertes de plumes d'un blanc sale. Celles qui couvrent la partie supérieure du col, le dos & le croupion, ainsi que les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue & les plus petites du dessus des aîles, sont noires. Il y a cependant un peu de blanc mêlé à la partie supérieure du dos. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la

quindecim lineas longum est; cauda tres pollices cum quinque lineis; pes decem lineas; digitorum anteorum exterior cum ungue eandem longitudinem obtinet, interior novem lineas; posticorum extimus undecim lineas, intimus quinque cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput nigrum est, & utrinque notatur latâ tæniâ longitudinali albâ supra oculum ductâ, latamque tæniam transversam pallidè aurantiam, in occipitio positam, pertinente. In utroque capitis latere altera adhuc adest tænia candida, ab oris angulis orta, infra oculum ducta, quæ deinde fit latior, & secundùm colli latera protenditur. Nares obtegunt penæ sordidè albæ. Quæ partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt, sicut & scapulares, caudam superne cooperientes & superiores alarum tectrices minimæ, sunt nigrae. Attamen pars dorsi suprema aliquid

albi admixtum habet. Gut-tur, collum inferius, pec-tus, venter, latera, crura, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes albicant. Superiores alarum rectrices majores sunt nigræ, maculis albis variæ. Remiges simili nigro imbutæ, in utroque latere taniis transversis albis notatæ. Decem rectricibus cauda conflatur : binæ intermediae nigræ : utrinque proximè sequens concolor, sed exiguâ maculâ sordidè albâ versùs apicem utrinque notata : tertia ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque nigra, in reliqua longitudine alba, albore & nigredine rectricem obliquè dividენტibus : duæ tandem utrinque extimæ in exortu nigræ, in reliqua longitudine albæ. Binæ rectrices intermediae lateraliū longitudinem paululū excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Rostrum corneo colore imbutum. Pedes, unguesque griseo-fusci. Habitat in *Canada*, unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. Comite de la Galiffonniere*.

queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Les grandes couvertures du dessus des ailes sont noires, & variées de taches blanches. Les plumes de l'aile sont pareillement noires, & marquées de chaque côté de bandes transversales blanches. La queue est composée de dix plumes : les deux du milieu sont noires : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est de la même couleur, & marquée de chaque côté vers le bout d'une petite tache d'un blanc sale : la troisième est noire depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur ; le reste est blanc, ces deux couleurs coupant obliquement la plume : enfin les deux plus extérieures de chaque côté sont noires à leur origine, & blanches dans le reste de leur longueur. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est de couleur de corne. Les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. On le trouve en *Canada*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. le Comte de la Galiffonniere*.

** 17. LE PIC VARIÉ DE VIRGINIE.

Picus superne niger, taniâ longitudinali in medio dorso candidâ, infernè albus; (fasciâ transversâ in occipitio rubrâ mas); duplici utrinque in capite taniâ longitudinali candidâ, aliâ supra oculos, alterâ secundum maxillam inferiorem protensâ; rectricibus quatuor intermediis nigris, proximè sequenti nigrâ, apice obliquè albâ, nigro terminatâ, quartâ in exortu nigrâ, in reliqua longitudine albâ, extimâ per totam longitudinem candidâ . . . PICUS VARIUS VIRGINIANUS.

Picus villosus medius. Klein. Avi. pag. 27. N°. 9:

Piverd velu. Catesb. Tom. I. pag. 19; avec une figure exacte Pl. 19.

Les Anglois l'appellent HAIRY WOOD-PECKER. Catesb.

Il est à peu près de la grosseur du nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue trois pouces; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie, l'intérieur huit lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes & demie, & l'intérieur cinq lignes. Il a quatorze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête est noire, & marquée de chaque

Picum varium nostratense
crassitie circiter æquat. Ipsi-
us longitudo ab apice rostri
ad caudam extremam
octo pollices & decem li-
neas explet, & ad extremos
ungues septem pollices &
totidem lineas. Rostrum ab
ipsius apice ad oris angulos
quindecim lineas longum
est; cauda tres pollices; pes
decem lineas; digitorum an-
ticorum extimus cum ungue
novem cum semi lineas, in-
timus octo cum semi lineas;
posticorum exterior decem
cum semi lineas; interior
quinque lineas. Ab extremo
ad extremum alarum exten-
sarum distantia est quatuor-
decim pollicum; alæ verò
complicatæ nonnihil ultra
medianam

mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput nigrum est, & duabus utrinque latis insignitum taniis longitudinalibus candidis, ab exortu rostri ortis, aliâ scilicet supra oculum, alterâ secundum maxillam inferiorem protensâ. In occipiti lata extat fascia transversa rubra. Nares obtegunt pennæ sordidæ albæ, rigidæ, antrorsum versæ. Collum superius, dorsum & uropygium nigra sunt : nigredinem autem in duas partes dividit tania candida, per totam dorsi, uropygiique longitudinem extensa. Pennæ scapulares, quæ caudam superne cooperiunt, superioresque alarum teatrices minores eodem imbuuntur nigro ac dorsum ipsum tingitur. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ teatrices & pennæ alas subtus obtegentes alben. Teatrices alarum superiores majores sunt nigra, maculis albis variegatæ. Remiges similiter nigra, in utroque latere maculis transversis albis notatæ. Caudam componunt decem rectrices : quatuor intermedia nigra : utrinque proximè sequens con-

Tom. IV.

côté de deux larges bandes longitudinales blanches, qui partent de l'origine du bec, & dont l'une passe par-dessus l'œil, & l'autre s'étend tout le long de la mâchoire inférieure. Sur l'occiput est une large bande transversale rouge. Les narines sont couvertes de plumes d'un blanc sale, roides & tournées en-devant. La partie supérieure du col, le dos & le croupion sont noirs : cette couleur est divisée en deux parties par une bande blanche, qui s'étend dans toute la longueur du dos & du croupion. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue & les petites du dessus des aîles sont du même noir que le dos. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les grandes couvertures du dessus des aîles sont noires, & variées de taches blanches. Les plumes de l'aîle sont pareillement noires, & marquées des deux côtés de taches transversales blanches. La queue est composée de dix plumes : les quatre du milieu sont noires : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est de la même couleur, mais son bout

G

est marqué obliquement de blanc, & terminé par une petite pointe noire : la quatrième est noire à son origine, & blanché dans le reste de sa longueur : enfin la plus extérieure de chaque côté est tout-à-fait blanche. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est de couleur de corne. Les pieds & les ongles sont gris-bruns.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle n'a point de rouge à l'occiput.

On les trouve à la Caroline, en Virginie, & en Canada, d'où ils ont été envoyés à M. de Reaumur par M. Gautier.

color, sed apice obliquè alba, in aciem nigrum exeuns : quarta in exortu nigra, in reliqua longitudine alba : utrinque tandem extima per totam longitudinem candida. Binæ intermediæ lateraliū longitudinem paululū excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Rostrum corneo colore imbutum. Pedes, unguēsque griseo-fusci.

Fœmina à mare discrepat occipitio fasciâ rubrâ destituito.

Habitant in Carolina, Virginia & Canada, unde in museum Realmurianum missi sunt à D. Gautier.

18. LE PETIT PIC VARIÉ DE VIRGINIE.

Picus superne niger, taniâ longitudinali in medio dorso candidâ ; infernè dilutè griseus ; (occipitio rubro mas) ; taniâ utrinque supra oculos candidâ ; rectricibus quatuor intermediis nigris, tribus utrinque extimis albo & nigro transversim striatis PICUS VARIUS VIRGINIANUS MINOR.

Picus varius minimus. Klein. Avi. pag. 27. N°. 8.

Petit Piverd tacheté. Catesb. Tom. I. pag. 21 ; avec une figure exacte Pl. 21. Les Anglois l'appellent SMALLEST SPOTTED WOOD-PECKER. Catesb.

Il n'est guères plus gros que notre petit Pic varié. Sa lon-

Crassitie Picum varium minorem nostratem non mul-

tum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues quinque pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octo lineas longum est; cauda unum pollicem cum novem lineis; pes sex lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue septem lineas, intimus quinque cum semi lineas; posticorum extimus sex cum semi lineas, intimus tres lineas. Alæ complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Capitis superior pars nigra est, & utrinque insignita tæniâ longitudinali candidâ, supra oculos protensâ. Occipitium rubrum. Collum superius, dorsum & uropygium nigra: nigredinem autem in duas partes dividit tænia candida, per totam dorsum, uropygiique longitudinem extensa. Pennæ scapulares, caudam superne vestientes & superiores alarum tectrices minores eodem imbuuntur nigro ac dorsum ipsum tingitur. Gutture, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ tectrices &

gueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long; sa queue un pouce neuf lignes; son pied six lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, sept lignes, l'intérieur cinq lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière six lignes & demie, & l'intérieur trois lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est noire, & marquée de chaque côté d'une bande longitudinale blanche, qui passe par-dessus les yeux. L'occiput est rouge. La partie supérieure du col, le dos & le croupion sont noirs: cette couleur est divisée en deux parties par une bande blanche, qui s'étend dans toute la longueur du dos & du croupion. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue & les petites du dessus des aîles sont du même noir que le dos. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un gris

clair. Les grandes couvertures du dessus des ailes sont noires, & marquées de taches blanches. Les plumes de l'aile sont pareillement noires, & variées des deux côtés de taches transversales blanches. La queue est composée de dix plumes : les quatre du milieu sont noires : les trois plus extérieures de chaque côté sont rayées transversalement de noir & de blanc. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'une couleur de corne. Les pieds & les ongles sont noirs.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle n'a point de rouge sur l'occiput.

On les trouve en *Virginie* & à la *Caroline*.

pennæ alas subtus obtegentes dilutè grisei sunt coloris. Superiores alarum rectrices majores sunt nigrae, maculis albis notatae. Remiges eodem nigro imbutæ, in utroque latere maculis transversis albis variegatae. Decem rectricibus cauda conflatur : quatuor intermediæ nigrae : tres utrinque extremæ albo & nigro transversim striatae. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Rostrum corneo colore imbutum. Pedes, unguesque nigri.

Fœmina à mare differt occipitio nequaquam rubro.

Habitant in *Virginia* & *Carolina*.

** 19. LE PIC A TESTE ROUGE DE VIRGINIE.

Voyez Pl. III. Fig. 1.

Picus superne niger, infernè albus ; capite & collo coccineis ; uropygio candido ; taniâ transversâ in summo pectore nigra ; remigibus minoribus albis, scapis nigris ; rectricibus nigris, binis utrinque extremis apice albis PICUS VIRGINIANUS ERYTHROCEPHALOS.

Picus capite, colloque rubris. Klein. Avi. pag. 28. N^o. 12.

Piverd à tête rouge. Catesb. Tom. I. pag. 20 ; avec une figure exacte Pl. 20.

Les Anglois l'appellent RED-HEADED WOOD-PECKER. Catesb.

Picum varium nostratem
crassitie circiter æmulator.
 Ipsius longitudo ab apice
 rostri ad caudam extremam
 octo pollices & decem li-
 neas explet, & ad extremos
 unguis septem pollices &
 octo lineas. Rostrum ab ip-
 sius apice ad oris angulos
 quindecim lineas longum
 est; cauda tres pollices cum
 lineis binis; pes novem li-
 neas; digitorum anticorum
 extimus cum ungue unde-
 cim lineas, intimus octo
 cum semi lineas; postico-
 rum extimus decem lineas,
 intimus quatuor cum semi
 lineas. Alis expansis, extre-
 mitates majorum remigum
 quindecim pollicum inter-
 vallo distant; alæ verò com-
 plicatæ ad tres circiter quar-
 tas longitudinis caudæ par-
 tes extenduntur. Caput, gut-
 tur & collum (exceptâ ta-
 men colli superioris parte
 infimâ) vestiunt pennæ satu-
 ratè coccineæ. Colli supe-
 rioris infima pars, dorsum,
 pennæ scapulares & superio-
 res alarum tectrices sunt
 splendide nigræ. In summo
 pectore tænia extat transver-

Il est à peu près de la gros-
 seur de notre *Pic varié*. Sa lon-
 gueur depuis le bout du bec jus-
 qu'à celui de la queue est de
 huit pouces dix lignes, & jus-
 qu'à celui des ongles de sept
 pouces huit lignes. Son bec de-
 puis son bout jusqu'aux coins de
 la bouche a quinze lignes de
 long; sa queue trois pouces
 deux lignes; son pied neuf lig-
 nes; le doigt extérieur de de-
 vant, joint avec l'ongle, onze
 lignes, l'intérieur huit lignes &
 demie; l'extérieur de ceux de
 derrière dix lignes, & l'inté-
 rieur quatre lignes & demie. Il a
 quinze pouces de vol; & ses aî-
 les, lorsqu'elles sont pliées,
 s'étendent environ jusqu'aux
 trois quarts de la longueur de
 la queue. La tête, la gorge &
 le col (si l'on en excepte le bas
 de sa partie supérieure) sont
 d'un rouge vif, mais foncé. Le
 bas de la partie supérieure du
 col, le dos, les plumes scapu-
 laires & les couvertures du des-
 sus des aîles sont d'un beau noir.
 Au haut de la poitrine est une
 bande transversale de la même
 couleur, qui sépare celle de
 la poitrine de la couleur rouge
 du col. La poitrine, le ventre,

les côtés, les jambes, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des ailes sont d'un beau blanc. Les dix premières plumes de l'aile sont noires : la onzième est de la même couleur du côté extérieur, & blanche du côté intérieur : toutes les autres sont blanches, & ont leur tige noire. La queue est composée de dix plumes noires : les deux plus extérieures de chaque côté sont cependant terminées de blanc. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est de couleur de plomb, excepté son bout, qui est noirâtre. Les pieds & les ongles sont aussi de couleur de plomb. Il fréquente assez volontiers les villages ; & mange beaucoup de fruits & de grains. On le trouve à *la Caroline*, en *Virginie* & en *Canada*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Gautier*.

sa simili nigro imbuta, pectoris colorem à colore colli coccineo separans. Pectus, venter, latera, crura, uropygium, rectrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ alas subtus obtegentes albore nitent. Decem primores remiges sunt nigrae : undecima in latere exteriori concolor, in interiori alba : reliquæ omnes albæ, scapis nigris præditæ. Decem rectricibus nigris cauda conflatur : binæ tamen utrinque extimæ apice albescent. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Rostrum plumbeo colore imbutum, excepto tamen apice nigricante. Pedes, unguesque similiter plumbei. Pagos libenter frequentat ; & fructibus, granisque delectatur. Habitat in *Carolina*, *Virginia* & *Canada*, unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. Gautier*.

** 20. LE PIC VARIÉ DE CAYENNE.

Picus superne niger, (maculis transversis albis variegatus *mas*)
inferne albus ; lateribus albo & nigro transversim striatis ;
(vertex rubro *mas*) cæniâ utrinque infra oculos candidâ ;

rectricibus nigris, binis utrinque extimis ultimâ medietate albis, interiùs nigro maculatis, proximè sequenti interiùs ultimâ medietate albo-rufescente, interiùs versùs apicem duabus maculis albo-rufescentibus insignitâ PICUS VARIUS CAYANENSIS.

An Picus pedibus tridactylis? *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 41. sp. 5.*

Faun. Suec. Linn. N°. 84. (An fœmina) ?

Piverd à trois ongles. *Edwards. Tom. III. pag. CXIV; avec une figure exacte du mâle Pl. 114.*

Les Anglois l'appellent THREE TOED WOOD-PECKER. *Edwards.*

Crassitie præcedentem circiter adæquat. Ipsiùs longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem octo pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda tres pollices cum quatuor lineis; pes decem lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue octo cum semi lineas, intimus octo lineas; posticorum exterior novem lineas: interiore autem digito posticè caret, quod maximè singulare. Qui defectus, cujus sit? an speciei? an individui? prorsus ignoro; unicum tantùm individuum observavi; & ideo non est quod judicem. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & quatuor linearum; alæ verò

Il est à peu près de la longueur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue trois pouces quatre lignes; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, huit lignes & demie, l'intérieur huit lignes: l'extérieur de ceux de derriere neuf lignes: l'intérieur manque totalement; ce qui est très-singulier. Je ne sçais si c'est défaut de l'espece ou de l'individu; comme je n'en ai jamais vu qu'un, je n'en puis pas décider. Il a quatorze pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est rouge. Le reste de la tête, la partie supé-

rieure du col, le dos & le croupion sont noirs. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. Le dos & le croupion sont variés de quelques taches transversales blanches. De chaque côté de la tête est une bande blanche, qui part de l'origine du bec, & passe par-dessous les yeux. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau blanc. Les jambes, les couvertures du dessous des ailes & les côtés sont rayés transversalement de blanc & de noir. Les plumes de l'aile sont noires, & variées des deux côtés de taches blanches. La queue est composée de dix plumes : les quatre du milieu sont noires : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est de la même couleur, excepté son côté extérieur, qui est d'un blanc-roussâtre depuis la moitié de sa longueur jusque vers son bout, qui est noir ; son côté intérieur est aussi marqué vers le bout de deux taches d'un blanc-roussâtre : les deux plus extérieures de chaque côté sont noires à leur origine, blanches dans le reste de leur longueur, marquées de quelques

complicata ad tres quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Vertex capitis rubro tingitur. Reliquum caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigrae. Scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ rectrices concolores. Dorsum & uropygium variegant maculae quaedam transversæ albæ. In utroque capitis latere tania extat candida, ab exortu rostri orta, & infra oculos protensa. Guttur, collum inferius, pectus, venter & rectrices caudæ inferiores albescent. Crura, latera & rectrices alarum inferiores albo & nigro sunt transversim striata. Remiges nigrae, maculis albis in utroque latere variegatae. Caudam componunt decem rectrices, quarum quatuor intermediae nigrae : utrinque proximè sequens concolor, attamen in latere exteriori ab ipsius media longitudine versum apicem usque albo-rufescens ; in apice autem nigra ; & in latere interiori binis maculis albo-rufescentibus versum apicem insignita : binæ utrinque extremae sunt in exortu nigrae, in reliqua longitudine albæ,

albæ, maculis quibusdam nigris interiùs notatæ, & paucò nigro terminatæ. Albedo autem in duabus istis rectricibus versùs apicem nonnihil ad rufescentem colorem inclinat. Binæ rectrices intermedix lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Rostrum, pedesque cinerei; ungues verò fusci.

Fœmina à *mare* discrepat capitis vertice nequaquam rubro, & dorso, uropygioque maculis albis destitutis.

Habitant in *Americæ* & forsan *Europæ* Septentrionali regione, & *Cayana*, unde in *musæum Realmurianum* missi sunt à *D. Artur*.

taches noires placées du côté intérieur, & terminées par un point noir. Le blanc de ces deux dernières plumes tire un peu sur le roussâtre vers leur bout. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus inférieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec & les pieds sont cendrés; & les ongles sont bruns.

La *femelle* diffère du *mâle* en ce qu'elle n'a point de rouge sur la tête, ni de taches blanches sur le dos & le croupion.

On les trouve dans la partie Septentrionale de l'*Amérique* & peut-être de l'*Europe*, & à *Cayenne*, d'où ils ont été envoyés à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

21. LE GRAND PIC VARIÉ DU MEXIQUE.

Picus superne niger, infernè albus, rubro adumbratus; taniâ utrinque ponè oculos candidâ, pennis scapularibus albis; rectricibus ex nigro & albo variegatis *PICUS VARIUS MEXICANUS MAJOR*.

Pica Mexicana. *Seb. Vol. I. pag. 101. hujus icon minimè accurata Tab. LXIV. fig. 6.*

Pica Mexicana alia. *Klein. Avi. pag. 62. N°. 6.*

Jaculator cinereus. *Klein. Avi. pag. 127. N°. 2.*

Cornix. *Moehr. Avi. Gen. 100.*

Picum viridem nostratē crassitie circiter æmulatur. *Ipsius* longitudo ab apice
Tom. IV,

Il est à peu près de la grosseur de notre *Pic verd*. Sa longueur depuis le bout du bec
H

jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce six lignes de long; sa queue trois pouces neuf lignes; son pied un pouce; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, seize lignes, l'intérieur un pouce; l'extérieur de ceux de derriere quinze lignes, & l'intérieur sept lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusque vers la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & celles du dessus des aîles sont d'un très-beau noir. De chaque côté de la tête est une large bande blanche, placée derriere l'œil. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc mêlé d'une légère teinte de rouge. Les plumes scapulaires sont blanches. Les plumes de l'aîle sont noires, & variées de taches blanches. Celles de la queue sont variées de noir & de blanc. Le bec est de cette dernière couleur. *Seba* ne dit point quelle est la couleur des pieds. On le trouve au *Mexique*.

rostri ad caudam extremam unum circiter pedem æquat, & ad extremos ungues undecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & sex lineas longum est; cauda tres pollices & novem lineas; pes unum pollicem; digitorum anticorum extimus cum ungue sexdecim lineas, intimus unum pollicem; posteriorum extimus quindecim lineas, intimus septem lineas. Alæ complicatæ mediam circiter longitudinem caudæ pertingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, superiores caudæ rectrices & pennæ alas superne vestientes sunt elegantissimè nigrae. In utroque capitis latere tania extat ponè oculum candida. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices albescent, & rubro adumbrantur. Pennæ scapulares sunt candidæ. Remiges nigrae, maculis albis variae. Caudæ rectrices albo & nigro variegatae. Rostrum album. De colore pedum nulla fit apud *Sebam* mentio. Habitat in *Mexico*.

22 LE PETIT PIC VARIÉ DU MEXIQUE.

Picus superne niger, albo transversim striatus, infernè ruber ;
 rectricibus nigris, albo transversim striatis . . . PICUS
 VARIUS MEXICANUS MINOR.

Quauhchochopitli, seu Avicula ligna excavans. *Fern. Hist. Nov. Hisp.*
pag. 33. cap. XCIV.

Raj. Syn. Avi. pag. 163.

Les Mexiquains l'appellent QUAUHCHOCHOPITLI. Fern.

Magnitudine *Picum va-*
rium nostratem circiter æmu-
 latur. In toto corpore pen-
 nis vestitur nigris, albo trans-
 versim striatis ; pectus tamen
 & venter rubri sunt coloris.
 Remiges & rectrices sunt
 nigræ, albo transversim stria-
 tæ. Habitat in *Mexico*, cu-
 jus frigida loca frequentat.

Il est à peu près de la gran-
 deur de *notre Pic varié*. Tout
 son corps est couvert de plu-
 mes noires, rayées transver-
 salement de blanc ; cependant la
 poitrine & le ventre sont rou-
 ges. Les plumes de l'aîle &
 celles de la queue sont noires,
 & rayées de bandes transver-
 sales blanches. On le trouve dans
 les endroits les plus froids du
Mexique.

23. LE PIC VARIÉ DE LA JAMAÏQUE.

Picus superne niger, griseo transversim striatus, uropygio albo
 transversim striato, infernè sordidè ruber, imo ventre fusco
 transversim striato ; capite & collo superius coccineis ; collo
 inferiore & pectore olivaceo-rufescentibus ; rectricibus sub-
 tus saturatè cinereis, superne nigris, extimâ exteriùs albis
 maculis variâ PICUS VARIUS JAMAICENSIS.

Picus pullus albo variegatus, vertice coccineo, linguâ ad apicem
 barbatâ. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 474.*

Picus ventre rubro. *Klein. Avi. pag. 28. N°. 11.*

Picus varius medius. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 299. N°. XV. hujus
 icon pessima Tab. 255. fig. 2.*

Picus varius medius Jamaicensis. *Raj. Syn. Avi. pag. 181. N°. 11.*

Pivert de la Jamaïque. *Edwards. Glanur. pag. 71. Chap. XXXIV; avec une figure exacte de la femelle. Pl. 244.*

Pivert à ventre rouge. *Catesb. Tom. 1. pag. 19; avec une figure passable du mâle Pl. 19.*

Les Anglois l'appellent RED-BELLIED WOOD-PECKER. Catesb. MIDDLE-SIZED PARTI-COLOURED WOOD-PECKER. Raj. WOOD-PECKER OF JAMAICA. Edwards.

Les Anglois de la Jamaïque, WOOD-PECKER. Sloane. Browne.

Il est un peu plus gros que notre grand *Pic varié*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ dix pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce six lignes de long; & sa queue environ deux pouces six lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le dessous de la tête, en commençant dès l'origine du demi-bec supérieur, l'occiput & la partie supérieure du col sont d'un rouge vif. Les joues sont d'un blanc-jaunâtre. Le dos & les plumes scapulaires sont d'un noir rayé d'étroites bandes transversales grises. Le croupion & les couvertures du dessous de la queue sont pareillement d'un noir rayé de bandes transversales blanches & plus larges que celles du dos. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un olive-roussâtre, qui devient graduellement d'un

Picum varium majorem nostratam crassitie paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & sex circiter lineas æquat. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & sex lineas longum est; cauda duos pollices cum sex circiter lineis. Alæ complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Capitis superior pars, ab exortu scilicet mandibulæ superioris, occipitium & collum superius colore tinguntur coccineo. Genæ ex albo flavicant. Dorsum & pennæ scapulares sunt nigrae, strictis tæniis transversis griseis striatæ. Uropygium & superiores caudæ tectrices eodem nigro imbutæ, & tæniis striatæ transversis albis, sed quàm in dorso latoribus. Guttur, pars colli inferior & pectus ex olivaceo rufescunt; qui color sensim atque sensim obscurè rubescit. Ven-

trēm vestiunt pennæ obscurè rubræ. Venter imus & crura lineis transversis fuscis striantur. Inferiores caudæ tectrices taniis variegantur transversis fuscis & candicantibus. Pennæ alas subtus obtegentes exiguis taniis transversis alternatim fuscis & candidis sunt variæ. Superiores alarum tectrices nigræ, & , dorsi instar, taniis striatæ transversis griseis, sed quàm in dorso dilutioribus. Remiges subtus saturatissimè cineræ, taniis transversis albis in latere interiore tantum variegatæ; superne verò in latere exteriori ipsarum tectricibus concolores, in interiore penitus nigræ. Caudam componunt decem rectrices subtus saturatissimè cineræ, superne nigræ: utrinque tamen extrema maculis albis, sed in latere exteriori tantum, variegatur. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum, pedes, unguesque nigri.

Fœmina iisdem ac in mare coloribus variegatur; ab illo tantum discrepat syncipite albo - rufescente, quod in

rouge terni, qui est la couleur des plumes qui couvrent le ventre. Le bas-ventre & les jambes sont rayés de lignes transversales brunes. Les couvertures du dessous de la queue sont marquées de rayes transversales brunes & blanchâtres. Celles du dessous des ailes sont variées de petites rayes transversales alternativement brunes & blanches. Les couvertures du dessus des ailes sont noires, & rayées, comme le dos, de bandes transversales grises, mais d'un gris plus clair. Les plumes des ailes sont en - dessous d'un cendré très-foncé, & variées du côté intérieur seulement de bandes transversales blanches; & en-dessus elles sont des mêmes couleurs que leurs couvertures du côté extérieur, & tout-à-fait noires du côté intérieur. La queue est composée de dix plumes d'un cendré très-foncé en-dessous, & noires en-dessus: la plus extérieure de chaque côté est cependant variée de taches blanches, mais du côté extérieur seulement. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs.

La femelle est variée des mêmes couleurs que le mâle; elle en diffère seulement en ce qu'elle a le synciput d'un blanc-

mare rubet.

roussâtre, au lieu qu'il est rouge dans le mâle.

Habitant in *Jamaica* & *Carolina*.

On les trouve à la *Jamaïque* & à la *Caroline*.

** 24. LE PIC VARIÉ DE LA CAROLINE.

Picus superne albo & nigro varius, infernè sulphureus; (vertice & gutture rubris; occipitio pallidè luteo mas); (vertice rubro; gutture & occipitio albis fœmina); capite ad latera pallidè luteo & nigro (mas) albo & nigro (fœmina) longitudinaliter vario; rectricibus nigris, duabus intermediis utrinque, binis utrinque extimis exterius & apice albo transversim maculatis PICUS VARIUS CAROLINENSIS.

Picus varius minor, ventre luteo. Klein. Avi. pag. 27. N°. 10.

Piverd au ventre jaune. *Catesb. Tom. I. pag. 21; avec une figure exacte Pl. 21.*

Les Anglois l'appellent YELLOW BELLY'-D WOOD-PECKER. Catesb.

Il n'est pas si gros que notre *Pic varié*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue deux pouces dix lignes; son pied huit lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, neuf lignes, l'intérieur sept lignes; l'extérieur de ceux de derrière huit lignes & demie, & l'intérieur quatre lignes. Il a treize pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées,

Pico vario nostrati crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda duos pollices & decem lineas; pes octo lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue novem lineas, intimus septem lineas; posteriorum exterior octo cum semi lineas, interior quatuor lineas. Ab extremo ad extremum ala-

rum extensarum distantia est tredecim pollicum; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Vertex capitis rubro tingitur : quem rube-
dinem in utroque latere am-
bit nigredo. Occipitium est
pallidè luteum ; qui color
utrinque protenditur , exi-
guamque efficit tæniam su-
pra oculos ductam. Infra tæ-
niam istam alia adest tænia
nigra , ab exortu rostri orta ,
per oculos ducta , & versùs
occipitium usque protensa.
Quam tæniam nigram sequi-
tur altera tania pallidè lu-
tea , à naribus orta , & ad
collum usque producta. In-
fra istam ultimam altera ad-
huc extat tænia nigra , ab
exortu mandibulæ inferioris
orta , quæ secundùm maxillæ
inferioris longitudinem pro-
tenditur , & sic , reflexa ,
colli inferioris nigredinem
attingit. Pars colli superior,
dorsum , uropygium , pennæ
scapulares & superiores cau-
dæ tectrices albo & nigro
variegantur. Guttur rubrum
est. Collum inferius & pec-
tus sunt nigra : quam nigre-
dinem utrinque ambit tænia
sulphurea. Venter sulphu-
reus. Latera , crura & tectri-
ces caudæ inferiores albæ ,
s'étendent jusqu'aux trois quarts
de la longueur de la queue. Le
sommets de la tête est rouge :
cette couleur est bordée de noir
des deux côtés. L'occiput est
d'un jaune pâle , qui s'étend de
chaque côté & forme une pe-
tite bande , qui passe par-des-
sus les yeux. Au-dessous de cel-
le-là en est une noire , qui part
de l'origine du bec , & s'étend
jusque vers l'occiput , en pas-
sant par les yeux. Cette bande
noire est suivie d'une autre d'un
jaune pâle , qui part des nari-
nes , & s'étend jusqu'au col.
Au-dessous de cette dernière
est encore une autre bande
noire , qui part de l'origine du
demi - bec inférieur , s'étend
tout le long de la mâchoire in-
férieure , & va , en se courbant ,
joindre le noir de la partie in-
férieure du col. La partie supé-
rieure du col , le dos & le crou-
pion , ainsi que les plumes sca-
pulaires & les couvertures du
dessus de la queue , sont variés
de noir & de blanc. La gorge
est rouge. La partie inférieure
du col & la poitrine sont noires :
cette couleur est bordée de
chaque côté d'une bande de
couleur soufre. Le ventre est de
cette dernière couleur. Les
jambes , les couvertures du des-
sous de la queue & les côtés
sont blancs , & variés de rayes

transversales brunes. Les couvertures du dessous des ailes sont tout-à-fait blanches. Les petites du dessus sont noires : les grandes sont variées de noir & de blanc. Les plumes de l'aile sont noirâtres, & marquées des deux côtés de taches transversales blanches. La queue est composée de dix plumes : les deux du milieu sont noires, & variées des deux côtés de taches transversales blanches : les deux qui les suivent de chaque côté, sont noires & sans taches : & les deux plus extérieures de chaque côté sont noires, & marquées de taches transversales blanches dans toute leur longueur du côté extérieur & sur le bout seulement du côté intérieur. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est de couleur de plomb. Les pieds & les ongles sont noirâtres.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a la gorge & l'occiput blancs, ainsi que les bandes placées aux côtés de la tête, & qui sont dans le mâle d'un jaune pâle.

On les trouve à la Caroline, en Virginie & à Cayenne, d'où ils

taniis transversis fuscis variegata. Pennæ alas subtus obtegentes penitus candidæ. Superiores alarum rectrices minores nigræ : majores albo & nigro variæ. Remiges nigricant, & maculis transversis albis in utroque latere insigniuntur. Decem rectricibus cauda constat : binæ intermedia nigræ, maculis transversis albis utrinque variegatæ : duæ utrinque sequentes nigræ & immaculatæ : binæ tandem utrinque extremæ nigræ, exterius per totam longitudinem, interiorius in apice tantum albo transversim maculatæ. Binæ rectrices intermediae lateraliū longitudinem paululum excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Rostrum plumbeo colore tinctum. Pedes, unguesque nigricantes.

Fœmina à mare discrepat gutture & occipitio albis ; taniæ quoque caput ad latera variegantes, quæque sunt in mare pallidè luteæ, in illa albicant.

Habitant in Carolina, Virginia & Cayana, unde in museum

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XIII.* 65
musæum Realmurianum missi ont été envoyés à *M. de Reau-*
sunt à *D. Artur.* mur par *M. Artur.*

** 25. LE PIC RAYÉ DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. IV. Fig. 1.

Picus superne nigro & olivaceo transversim striatus, infernè olivaceus; vertice, occipitio & uropygio rubris; collo inferiore & pectore griseo-fuscis; rectricibus nigris, binis utrinque extimis subtus ad olivaceum inclinantibus, oris exterioribus griseis . . . PICUS DOMINICENSIS STRIATUS.

Præcedentem paululùm crassitie superat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda tres pollices cum linea una; pes decem lineas; digitorum anteriorum exterior cum ungue undecim lineas, interior octo cum semi lineas; posticorum extimus decem cum semi lineas, intimus quinque cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam circiter longitudinem caudæ pertingunt. Synciput, genas & guttur ves-

Tom. IV.

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue trois pouces une ligne; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes, l'intérieur huit lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes & demie, & l'intérieur cinq lignes & demie. Il a treize pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le synciput, les joues & la gorge sont d'un joli gris. Les narines sont couvertes de

I

plumes de la même couleur ,
roides & tournées en-devant.
Le sommet de la tête & l'occiput
sont rouges. Le dessus du
col & le dos , ainsi que les plu-
mes scapulaires & les couvertu-
res du dessus des aîles sont rayés
transversalement de noir & de
couleur d'olive. Le croupion &
les couvertures du dessus de la
queue sont rouges. La partie
inférieure du col, la poitrine &
les couvertures du dessous des
aîles sont d'un gris-brun. Le
ventre , les côtés , les jambes ,
& les couvertures du dessous de
la queue sont olivâtres. Les
grandes couvertures du dessus
des aîles les plus proches du
corps sont noires , & rayées
transversalement de jaunâtre :
les plus éloignées du corps sont
pareillement noires , & bordées
seulement de jaunâtre du côté
extérieur. Les plumes de l'aîle
sont noirâtres , & marquées de
taches jaunâtres sur le bord ex-
térieur & de taches blanchâtres
sur le bord intérieur. La queue
est composée de dix plumes :
les six du milieu sont noires : les
deux plus extérieures de chaque
côté sont en-dessus de la mê-
me couleur , & bordées exté-
rieurement de gris, mais en-des-
sous elles sont olivâtres. Les
deux du milieu sont un peu plus
longues que les latérales , qui

tiunt pennæ eleganter gri-
seæ. Nares obtegunt pennæ
concolores , rigida , antror-
sum versa. Vertex capitis &
occipitium rubent. Pars colli
superior , dorsum , pennæ
scapulares & superiores ala-
rum rectrices minores nigro
& olivaceo sunt transversim
striata. Uropygium & supe-
riores caudæ rectrices rubræ.
Collum inferius , pectus , in-
ferioresque alarum rectrices
griseo-fusca. Venter , latera ;
crura & pennæ caudam sub-
tus obtegentes olivaceo im-
buuntur colore. Superiores
alarum rectrices majores
corpori finitimæ sunt nigra ,
flavicante transversim striata :
à corpore remotiores eodem
nigro imbutæ , exterius fla-
vicante tantum fimbriata.
Remiges nigricantes , & ma-
culis ad marginem exte-
riorem flavicantibus , ad inte-
riorem albidis insignita. De-
cem rectricibus cauda con-
flatur : sex intermedia nigra :
binæ utrinque extrema su-
perne concolores , oris exte-
rioribus griseis prædita , sub-
tus verò ad olivaceum in-
clinantes. Binæ rectrices in-
termedia lateralium longi-
tudinem paululum exce-
dunt ; laterales autem gra-
datim longitudine minuun-

tur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum corneo colore tinctum. Pedes, unguisque nigricantes. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *museum Reaumurianum* missus à *D. Chervain*.

vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est de couleur de corne. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

** 26. LE PETIT PIC RAYÉ DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. III. Fig. 2.

Picus superne nigro & griseo-flavicante transversim striatus, inferne griseus, nonnihil ad fulvum inclinans; vertice nigro; occipitio & uropygiò rubris; rectricibus nigris, binis utrinque extimis subtus ad olivaceum inclinantibus, oris exterioribus griseis . . . PICUS DOMINICENSIS STRIATUS MINOR.

Præcedenti nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda tres pollices & quinque lineas; pes novem cum semi lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem, intimus novem lineas; posticorum extimus undecim lineas; intimus

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue trois pouces cinq lignes; son pied neuf lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce; l'intérieur neuf lignes; l'extérieur de ceux de derrière onze lignes, & l'intérieur cinq lignes & demie. Il a treize pouces de

vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Le synciput, les joues & la gorge sont d'un joli gris. Les narines sont couvertes de plumes de la même couleur, roides & tournées en-devant. Le sommet de la tête est noir. L'occiput est rouge. Le dessus du col & le dos sont rayés transversalement de noir & de gris-jaunâtre. Les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des ailes sont pareillement rayées transversalement des mêmes couleurs. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont rouges. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris tirant un peu sur le fauve. Les petites couvertures du dessous des ailes sont de la même couleur : les grandes sont rayées transversalement de noirâtre & de blanchâtre. Les grandes couvertures du dessus des ailes les plus proches du corps sont noires, & rayées transversalement de gris-jaunâtre : les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé, & bordées seulement de gris-jaunâtre du côté extérieur. Les plumes de l'aile sont noirâ-

quinque cum semi lineas: Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est tredecim pollicum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Synciput, genæ & guttur sunt eleganter griseæ. Nares cooperiunt pennæ concolores; rigidæ, antrorsum versæ. Vertex capitis niger. Occipitium rubrum. Collum superius & dorsum nigro & griseo-flavicante sunt transversim striatæ. Pennæ scapulares & superiores alarum tectrices minores iisdem coloribus transversim variegatæ. Uropygium & tectrices caudæ superiores rubræ. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores ex griseo nonnihil ad fulvum inclinant. Inferiores alarum tectrices minores concolores: majores albedo & nigricante transversim striatæ. Tectrices alarum superiores majores corpori finitimæ nigæ, griseo-flavicante transversim striatæ: à corpore remotiores saturatè fusæ, in latere exteriori griseo-flavicante tantùm simbricatæ. Remiges nigricant; maculisque in margine exteriori flavi-

cantibus, in interiore albidis insigniuntur. Caudam componunt decem rectrices; quarum sex intermediæ nigrae : binæ utrinque extimæ superne concolores, oris exterioribus griseis præditæ, subtus verò ad olivaceum inclinantes. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Rostrum corneo colore imbutum. Pedes, unguesque nigricantes. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Chervain*.

tres, & marquées de taches jaunâtres sur le bord extérieur & de taches blanchâtres sur le bord intérieur. La queue est composée de dix plumes : les six du milieu sont noires : les deux plus extérieures de chaque côté sont en-dessus de la même couleur, & bordées extérieurement de gris, mais en-dessous elles sont olivâtres. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est de couleur de corne. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve à *S. Dominique*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

An præcedentis fœmina?

C'est peut-être la femelle du précédent.

** 27. LE PIC RAYÉ DE CAYENNE.

Picus superne nigro & olivaceo-flavicante transversim striatus, infernè flavicans; vertice nigro; occipitio rubro; uropygio & pectore olivaceo-flavicantibus, maculis nigris variegatis; rectricibus sex intermediis nigris, binis intermediis in utroque latere, duabus utrinque sequentibus in latere exteriorē obscurè olivaceo transversim maculatis, binis utrinque extimis nigricante & rufescente transversim striatis *PICUS CAYANENSIS STRIATUS.*

Pico vario crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices &

Il n'est pas si gros que le *Pic varié*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces cinq lig.

nes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue deux pouces neuf lignes; son pied huit lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, neuf lignes, l'intérieur sept lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes, & l'intérieur quatre lignes & demie. Il a onze pouces dix lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est noir. L'occiput est rouge. Les côtés de la tête sont blanchâtres. Les parties supérieures du col & du dos sont rayées transversalement de noir & d'olive-jaunâtre. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un olive-jaunâtre, chaque plume étant marquée vers son bout d'une tache noire. La gorge est noire, & variée de petites taches blanches. La partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes d'un olive-jaunâtre, mais rembruni, marquées chacune vers leur bout d'une tache noire, quelques-unes étant de plus terminées d'un peu de rouge. Le ventre, les côtés, les jam-

quinque lineas æquat, & ad extremos unguis sex pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & novem lineas; pes octo cum semi lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue novem lineas, intimus septem cum semi lineas; posteriorum extimus decem lineas, intimus quatuor cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pollicum & decem linearum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Vertex capitis niger. Occipitium rubrum. Caput ad latera candidat. Pars colli superior & dorsi suprema nigro & olivaceo-flavicante sunt transversim striatæ. Dorsum inferum, uropygium & rectrices caudæ superiores olivaceo-flavicantes, sed quælibet penna versùs apicem maculâ insignitur nigrâ. Guttur nigrum, minutis maculis albis varium. Partem colli inferiorem & pectus vestiunt pennæ olivaceo-flavicantes; sed obscurè, versùs apicem maculâ nigrâ notatæ, qui-

busdam insuper pauco rubro terminatis. Venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices flavicant: quem colorem ad latera & in inferioribus caudæ tectricibus minutæ quædam maculæ nigrae variegant. Pennæ alas subtus obtegentes ex albo flavicant. Superiores alarum tectrices & scapulares pennæ sunt obscurè olivaceæ, nigricante transversim striatæ. Remiges nigricantes, scapis eleganter luteis præditæ, in latere exteriori obscurè olivaceo transversim striatæ, & ad margines interiores maculis transversis fordidè albis insignitæ. Decem rectricibus cauda constat: sex intermediæ nigrae, in latere exteriori taniis transversis obscurè olivaceis variegatæ, binis intermediis eodem colore etiam in latere interiori transversim maculatis: binæ utrinque extremæ nigricante & rufescente transversim striatæ, scapis eleganter luteis præditæ. Duæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum. Rostrum nigricans.

bes & les couvertures du dessous de la queue sont jaunâtres: cette couleur est variée sur les côtés & sur les couvertures du dessous de la queue de quelques petites taches noires. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un blanc-jaunâtre. Celles du dessus & les plumes scapulaires sont d'un olive rembruni, rayé transversalement de noirâtre. Les plumes de l'aile sont noirâtres, & ont leur tige d'un beau jaune; leur côté extérieur est rayé transversalement d'olive rembruni, & leur bord intérieur est marqué de taches transversales d'un blanc sale. La queue est composée de dix plumes: les six du milieu sont noires, & variées du côté extérieur de bandes transversales d'un olive rembruni; les deux du milieu sont rayées de la même couleur même du côté intérieur: les deux plus extérieures de chaque côté sont rayées transversalement de noirâtre & de roussâtre, & ont leur tige d'un beau jaune. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noirâtre. Les pieds sont gris; & les ongles gris-bruns.

On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Effars*.

Pedes grisei; ungues verò griseo-fusci. Habitat in Cayana, unde in museum Reaumurianum missus à D. des Effars.

** 28. LE PIC RAYÉ DE CANADA.

Picus superne griseo-fuscus, nigricante transversim striatus; infernè fulvo-albicans, maculis rotundis nigris varius; capite & collo superiùs cinereis (mas) griseo-fuscis (fœmina); occipitio rubro; uropygio candido; maculâ in medio pectore nigrâ; rectricibus infernè flavis, nigro terminatis, superne nigricantibus, oris exterioribus griseis, extimâ exteriùs candicante maculatâ PICUS CANADENSIS STRIATUS.

Cuculus alis deauratis. Klein. Avi. pag. 30. N°. 3.

Grand Piverd aux aîles d'or. *Catesb. Tom. I. pag. 18; avec une figure exacte de la femelle Pl. 18.*

Les Anglois l'appellent GOLD-WINGED WOOD-PECKER. Catesb.

Il est un peu moins gros que notre *Pic verd.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue quatre pouces quatre lignes; son pied douze lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'intérieur onze lignes; l'extérieur de ceux de derriere onze lignes & demie, & l'intérieur six lignes & demie. Il a un pied six

Pico viridi nostrati non-nihil crassitie cedit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices explet, & ad extremos ungues novem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est; cauda quatuor pollices & totidem lineas; pes duodecim cum semi lineas; digitorum anteriorum exterior cum ungue quatuordecim lineas, interior undecim lineas; posteriorum extimus undecim cum semi

femi lineas, intimus sex cum
femi lineas. Alis expansis,
extremities majorum remi-
gum unius pedis sex polli-
cum & totidem linearum
intervallo distant; alæ verò
complicatæ nonnihil ultra
mediam caudæ longitudi-
nem extenduntur. Partes ca-
pitis & colli superiores ves-
tiunt pennæ cinereæ. Occi-
pitium rubet. Caput ad la-
tera, guttur & collum in-
ferius sunt dilutè fulva. In
utroque capitis latere tania
extat nigra, ab exortu man-
dibulæ inferioris orta, se-
cundùm maxillæ inferioris
longitudinem ducta, & ver-
sus collum usque protensa.
Dorsum, pennæ scapulares
& superiores alarum tectri-
ces minores sunt griseo-fus-
cæ, nigricante transversim
striatæ. Uropygium albicat.
Pectus, ventrem & latera
vestiunt pennæ fulvo-albi-
cantes, maculâ rotundâ ni-
grâ ad apicem insignitæ. Me-
dium pectus majusculâ insu-
per maculâ similiter nigrâ
notatur. Crura & tectrices
caudæ superiores & inferio-
res ex albo & nigro varie-
gantur. Pennæ alas subtus
cooperientes ex albo flavi-
cant. Superiores alarum tec-
trices majores sunt fuscæ,

Tom. IV.

pouces six lignes de vol; & ses
aîles, lorsqu'elles sont pliées,
s'étendent un peu au-delà de la
moitié de la longueur de la
queue. Les parties supérieures
de la tête & du col sont cen-
drées. L'occiput est rouge. Les
côtés de la tête, la gorge & la
partie inférieure du col sont d'un
fauve clair. De chaque côté de
la tête est une bande noire, qui
part de l'origine du demi-bec
inférieur, passe tout le long de
la mâchoire inférieure, & s'é-
tend jusque vers le col. Le dos,
les plumes scapulaires & les pe-
tites couvertures du dessus des
aîles sont d'un gris-brun, rayé
transversalement de noirâtre.
Le croupion est blanc. La poi-
trine, le ventre & les côtés sont
couverts de plumes d'un fau-
ve-blanchâtre, marquées cha-
cune à leur bout d'une tache
ronde noire. Sur le milieu de la
poitrine est de plus une grande
tache de la même couleur. Les
jambes & les couvertures du
dessus & du dessous de la queue
sont variées de noir & de blanc.
Les couvertures du dessous des
aîles sont d'un blanc-jaunâtre.
Les grandes du dessus sont bru-
nes, & ont leur tige jaune. Les
plumes de l'aîle sont en-dessous
d'un jaune pâle, & en-dessus
elles sont brunes & ont leur tige
jaune; leur bord extérieur est

K

marqué de taches d'un cendré-brun, & leur côté intérieur est bordé de blanchâtre : cette couleur occupe d'autant plus d'espace, qu'elle approche plus de l'origine de la plume, & elle est rayée transversalement de brun dans les moyennes plumes de l'aile. La queue est composée de dix plumes, qui sont en-dessous jaunes & terminées de noir, & en-dessus noirâtres & bordées extérieurement de gris; les deux du milieu sont aussi bordées intérieurement de la même couleur : la plus extérieure de chaque côté est de plus variée de taches blanchâtres sur son bord extérieur, & son bout est bordé tout autour de cette couleur : la tige de toutes les latérales est jaune depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont d'un gris-brun.

La femelle diffère du *mâle* en ce qu'elle a le dessus de la tête & du col d'un gris-brun, qu'en

scapis luteis præditæ. Remiges subtus pallidè luteæ, superne fuscæ, scapis donatæ luteis, ad margines exteriores maculis cinereo-fuscis notatæ, & in latere interiore candicante fimbriatæ : qui color candicans eò majus spatium occupat, quò magis ad remigis exortum accedit, & in remigibus minoribus fusco transversim striatur. Caudam componunt decem rectrices infernè flavæ, nigro terminatæ, superne nigricantes oris exterioribus grileis; binæ intermediæ sunt quoque interiùs griseo fimbriatæ : utrinque extima maculis insuper candicantibus ad marginem exteriorum variegata, inque tota apicis circumferentia candicante fimbriata : omnium rectricum lateralium scapi ab ipsarum exortu versùs mediam longitudinem usque flavent. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululùm superant; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque griseo-fusci.

Fœmina à *mare* differt partibus capitis & colli superioribus griseo-fuscis, occi-

pitio multò minùs vivide rubro, & remigibus alarum majoribus maculis in latere exteriore destitutis.

Vermibus, aliisque *Insectis*, quos è terra extrahunt, victitant. Arborum truncos non scandunt, sicut reliquarum hujus generis specierum mos est; sed ipsarum ramis insident. Habitat in *Carolina*, *Virginia* & *Canada*, unde in *museum Real-murianum* missi sunt à *D. Comite de la Galissonniere*, & *D. Gautier*.

elle le rouge de l'occiput est beaucoup moins vif, & les grandes plumes de l'aile n'ont point de taches sur le côté extérieur.

Ils se nourrissent de *Vers* & autres *Insectes*, qu'ils tirent de terre. Ils ne grimpent point, comme les autres especes de ce genre, le long des troncs des arbres; mais ils se perchent sur leurs branches. On les trouve à la *Caroline*, en *Virginie* & en *Canada*, d'où ils ont été envoyés à *M. de Reaumur* par *M. le Comte de la Galissonniere* & par *M. Gautier*.

** 29. LE PETIT PIC DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. IV. Fig. 2.

Picus superne olivaceo-flavicans, infernè fusco & candicante transversim striatus; capite superiùs rubro; rectricibus binis intermediis fuscis, duplici maculâ transversâ griseâ utrinque notatis, binis utrinque sequentibus fusco-nigricantibus, duplici maculâ transversâ griseâ interiùs notatis, binis utrinque extimis fuscis, griseo variegatis, extimâ candicante terminatâ PICUS DOMINICENSIS MINOR.

Crassitie *Alaudam* circiter æmulatur. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices æquat, & ad extremos ungues quinque pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem lineas longum

Il est à peu près de la grosseur d'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue un pouce dix

lignes ; son pied sept lignes ; le doigt extérieur de devant joint avec l'ongle, huit lignes, l'intérieur sept lignes ; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes & demie, & l'intérieur quatre lignes. Il a huit pouces dix lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est rouge. Les côtés de la tête sont d'un gris-roussâtre. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de couleur d'olive - jaunâtre. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont rayés transversalement de brun & de blanchâtre. Les couvertures du dessous des ailes sont de cette dernière couleur, quelques-unes étant rayées transversalement de brun. Les petites plumes qui couvrent le bord de l'aile, sont brunes & bordées de blanchâtre. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de couleur d'olive - jaunâtre, & marquées chacune vers leur bout d'une petite tache d'un blanc-jaunâtre : les grandes les plus

est ; cauda unum pollicem & decem lineas ; pes septem lineas ; digitorum anteriorum extimus cum ungue octo lineas, intimus septem lineas ; pollicorum exterior novem cum semi lineas ; interior quatuor lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est octo pollicum & decem linearum ; alæ verò complicatæ mediam circiter longitudinem caudæ pertingunt. Capitis superior pars rubro tingitur. Caput ad latera ex griseo rufescit. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ teñtrices sunt olivaceo - flavicantes. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crura & teñtrices caudæ inferiores fusco & candicante transversim striantur. Pennæ alas subtus vestientes candicant, & quædam sunt fusco transversim striatæ. Plumulæ margines alarum obtegentes fuscæ, candicante simbriatæ. Superiores alarum teñtrices minores, sicut & majores corpori viciniore, olivaceo - flavicantes, versùs apicem minutâ maculâ albo - flavicante insignitæ : majores à corpore remotiores fuscæ,

oris exterioribus olivaceis præditæ. Remiges in latere exteriori dorso concolores, in latere interiore fuscæ, marginibus candicantibus : qui color candicans profundè satis fusco dentatim immiscetur : binæ tamen primores remiges olivaceo-flavicante nequaquam variegantur, sed exterius quoque fuscescunt. Remix prima brevissima est : quarta omnium longissima. Decem rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ fuscæ, duplici maculâ transversâ griseâ in utràque margine notatæ, & olivaceo insuper exterius fimbriatæ, sed versùs exortum tantùm : duæ utrinque proximè sequentes fusco-nigricantes, in latere exteriori versùs ipsarum exortum nonnihil ad olivaceum vergentes, & duplici maculâ transversâ griseâ ad marginem interiorem insignitæ : binæ utrinque extimæ fuscæ, griseo variegatæ ; extimâ insuper pauco candicante terminatâ. Rostrum, pedes, unguesque grisei. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *museum D. Aubry* missus est.

gue, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

éloignées du corps sont brunes, & bordées extérieurement d'olivâtre. Les plumes de l'aile sont de la même couleur que le dos du côté extérieur ; leur côté intérieur est brun, & bordé d'un blanchâtre comme dentelé, & qui s'engrenne assez profondément dans le brun : cependant les deux premières plumes n'ont rien d'olive-jaunâtre, & sont brunes aussi du côté extérieur. La première de toutes ces plumes est très-courte : la quatrième est la plus longue de toutes. La queue est composée de dix plumes : les deux du milieu sont brunes, & marquées sur chacun de leurs bords de deux taches transversales grises, & en outre bordées extérieurement d'olivâtre, mais vers leur origine seulement : les deux qui les suivent de chaque côté, sont d'un brun-noirâtre, leur bord extérieur tirant un peu sur l'olivâtre vers l'origine de la plume, & leur bord intérieur étant marqué de deux taches transversales grises : les deux plus extérieures de chaque côté sont d'un brun varié de gris, & la plus extérieure est terminée d'un peu de blanchâtre. Le bec, les pieds & les ongles sont gris. On le trouve à *S. Dominique*.

** 30. LE PIC DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Voyez Pl. VI. Fig. 1.

Picus superne aurantius, aureo refulgens colore, infernè sordidè albus, marginibus pennarum fuscis; capite superiore & occipitio rubris; collo superiore & uropygio nigricantibus; tæniâ utrinque candidâ à naribus infra oculos & secundum colli latera protensâ; rectricibus nigricantibus *PICUS CAPITIS BONÆ SPEI.*

Il est un peu plus gros que *notre Pic varié*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue trois pouces six lignes; son pied onze lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce, l'intérieur neuf lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière onze lignes, l'intérieur quatre lignes seulement; car son ongle est extrêmement court. Il a quinze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le dessus de la tête & l'occiput sont couverts de plumes longues & étroites, d'un beau rouge. De chaque côté de

Picum varium nostratem crassitie nonnihil antecellit. Ipsiùs longitudo à rostri apice ad caudam extremam decem pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos unguis novem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est; cauda tres pollices cum sex lineis; pes undecim lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue unum pollicem, intimus novem cum semi lineas; posteriorum exterior undecim lineas, interior quatuor tantum lineas; ungue enim brevissimo donatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum quindecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Partem capitis superiorem &

occipitium vestiunt pennæ longæ, strictæ, eleganter rubræ. In utroque capitis latere tænia extat candida, ab oculi cantho orta, & versùs occipitium usque producta. Infra quam tæniâ altera adest tænia concolor, prope nares orta, infra oculos ducta, & secundùm colli latera protensa. Collum superiùs & ad latera nigricat. Genas, guttur & partem colli inferioris cooperiunt pennæ sordidè griseæ, in tota circumferentia nigricante fimbriatæ. Dorsi suprema pars eleganter aurantia splendidissimo aureo colore refulget. Pennæ scapulares sunt olivaceo-aureæ, supremi dorsi coloribus adumbratæ. Dorsum infimum, uropygium & superiores caudæ tectrices nigricant. Pectus, venter, latera & crura pennis vestiuntur sordidè albis, in tota circumferentia fusco marginatis. Inferiores alarum tectrices concolores. Pennæ caudam subtus obtegentes sordidè albæ, nigricante fimbriatæ; & tæniâ transversâ concolore insignitæ. Superiores alarum tectrices minores fusco-nigricantes, quibusdam versùs apicem maculâ rotundâ sordidè gri-

la tête est une bande blanche, qui part de l'angle de l'œil, & s'étend jusque vers l'occiput. Au-dessous de celle-là en est une autre de la même couleur, qui part d'auprès des narines, passe par-dessous les yeux, & s'étend tout le long des côtés du col. La partie supérieure & les côtés du col sont noirâtres. Les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont couvertes de plumes d'un gris sale, bordées tout autour de noirâtre. La partie supérieure du dos est d'un bel orangé mêlé d'une très-belle couleur d'or. Les plumes scapulaires sont d'un olivâtre-doré, & nuancé des mêmes couleurs que celles de la partie supérieure du dos. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres. La poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont couverts de plumes d'un blanc sale, bordées de brun dans toute leur circonférence. Les couvertures du dessous des ailes sont de la même couleur. Celles du dessous de la queue sont d'un blanc sale, bordées de noirâtre, & marquées chacune d'une bande transversale de la même couleur. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un brun-noirâtre, quelques-unes étant

marquées vers leur bout d'une tache ronde d'un gris sale : les grandes les plus proches du corps sont d'un olivâtre-doré, quelques-unes ayant aussi vers le bout une tache d'un gris sale : les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre & sans taches. Les huit premières plumes de l'aile sont d'un brun-noirâtre, & marquées des deux côtés de taches d'un blanc sale ; il faut cependant en excepter la première, qui n'a de taches que du côté intérieur ; le côté extérieur des sept suivantes tire un peu sur l'olivâtre : toutes les autres plumes de l'aile sont d'un olivâtre-doré du côté extérieur, & d'un brun-noirâtre, marqué de taches d'un blanc sale du côté intérieur. Le dessous de toutes ces plumes est brun, & marqué des mêmes taches que dans leur partie supérieure. La première des plumes de l'aile est extrêmement courte : la quatrième est la plus longue de toutes. La queue est composée de dix plumes noirâtres. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est de couleur de plomb foncé. Les pieds & les ongles sont

seâ notatis : majores corpori finitimæ olivaceo - aureæ , quarum quædam versùs apicem maculâ sordidè griseâ similiter insigniuntur : à corpore remotiores fusco-nigricantes & immaculatæ. Octo primores remiges ex fusco nigricant , & in utroque latere maculis sordidè albis variegantur ; ex istis tamen excipienda est prima in latere tantùm interiore sordidè albo maculata ; septem sequentes remiges ad latus exterius nonnihil ad olivaceum vergunt : reliquæ omnes sunt in latere exteriori olivaceo-aureæ , in interiore fusco - nigricantes , maculis sordidè albis notatæ. Remiges omnes subtus fuscescunt , & iisdem maculis quàm in parte superiore variegantur. Remix prima brevissima : quarta reliquas omnes longitudine superat. Decem rectricibus nigricantibus cauda constat. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt , laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Rostrum saturatè plumbeo colore imbutum. Pedes , unguesque similiter plumbeo tincti colore , sed multò dilutiorē.

Iutiore. Habitat in Capite Bonæ Spei, unde in museum D. Aubry missus est. aussi de couleur de plomb, mais beaucoup plus clair. On le trouve au *Cap de Bonne Espérance*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

** 31. LE PIC BLANC DE CAYENNE.

Picus sordidè albus; taniâ utrinque in maxilla inferiore longitudinali rubrâ; rectricibus nigricantibus . . . PICUS CAYANENSIS ALBUS.

Præcedenti crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices æquat, & ad extremos ungues octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda tres pollices cum lineis binis; pes undecim lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem, intimus octo lineas; posticorum extimus novem cum semi lineas, intimus quinque lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est sexdecim pollicum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra duas tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. In universo corpore, capite scilicet, gutture, collo, dorso, uro-
Tom. IV.

Il n'est pas si gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long; sa queue trois pouces deux lignes; son pied onze lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce, l'intérieur huit lignes; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes & demie, & l'intérieur cinq lignes. Il a un pied quatre pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des deux tiers de la longueur de la queue. Tout son corps, sçavoir la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus

& du dessous de la queue , & celles du dessous des aîles , est d'un blanc sale. De chaque côté de la tête est une bande rouge , qui part de l'origine du demi-bec inférieur , s'étend tout le long de la mâchoire inférieure , & va jusqu'au-dessous des oreilles. Les couvertures du dessus des aîles sont brunes , & quelques-unes des grandes sont variées de roux du côté intérieur seulement. La première des plumes de l'aîle est extrêmement courte & brune : les deux suivantes sont de la même couleur , mais elles ont un peu de roux à leur origine du côté intérieur : les trois qui les suivent , sçavoir depuis la quatrième jusqu'à la sixième inclusivement , sont rousses depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur ; le reste est brun , mais de façon que cette dernière couleur s'étend en pointe dans la première le long de la tige de chaque plume : la septième & la huitième sont rousses dans toute leur longueur ; elles ont cependant un peu de brun dans leur milieu le long de leur tige , cette couleur occupant d'autant plus de largeur sur la plume , qu'elle approche plus de son bout ; & leur côté extérieur est aussi taché d'un peu de brun : tou-

pygio , pectore , ventre , lateribus , cruribus , rectricibus caudæ superioribus & inferioribus , & pennis alas subtus obtegentibus ; sordidè albicat. In utroque capitis latere tania extat rubra , ab exortu mandibulæ inferioris orta , secundùm maxillæ inferioris longitudinem ducta , & infra aures usque protensa. Superiores alarum rectrices sunt fuscæ , sed ex majoribus quædam rufo variegantur , idque in latere interiori tantùm. Remix prima brevissima , fusca : binæ sequentes concolores , attamen interiùs in exortu aliquid rufi admixtum habent : tres quæ sequuntur , à quarta scilicet ad sextam usque inclusivè , ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque ruscæ , in reliqua longitudine fuscæ , ita tamen ut fuscus color in rufo secundùm uniuscujusque remigis scapum in acumen extendatur : septima & octava in tota longitudine ruscæ ; attamen in medio secundùm scapi longitudinem aliquid fusci admixtum habent ; qui fuscus color eò majus in remige spatium occupat , quò magis versùs apicem proce-

dit ; in latere exteriori pauco insuper fusco maculantur : reliquæ omnes remiges sunt in latere exteriori & apice fuscæ, in apice verò paucorufco variegatæ, & in latere interiore penitus rufæ ; attamen excipiendum est remigis corpori finitimæ latus interius, quod sordide albicat. Caudam componunt decem rectrices nigricantes. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum ex albo flavicat. Pedes, unguesque sunt grisei. Habitat in Cayana, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. des Essars*.

tes les autres plumes sont brunes du côté extérieur & à leur bout, sur lequel elles sont variées d'un peu de roux ; leur côté intérieur est de cette dernière couleur, excepté celui de la plus proche du corps, qui est d'un blanc sale. La queue est composée de dix plumes noirâtres. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un blanc-jaunâtre. Les pieds & les ongles sont gris. On le trouve à Cayenne, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

** 32. LE PETIT PIC DE CAYENNE.

Picus superne griseo-rufescens, infernè albo-rufescens, marginibus pennarum fuscis ; vertice rubro ; occipitio nigro ; albo punctulato ; rectricibus fuscis, binis utrinque extimis ultimâ medietate obliquè albo-rufescentibus, fusco terminatis, proximè sequenti interiùs albo-rufescente, fusco fimbriatâ PICUS CAYANENSIS MINOR.

Hæc est hujus generis species minima. *Ficedulam* crassitie non superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pollices

C'est la plus petite espece de ce genre. Il n'est pas plus gros que le *Becfigue*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois

pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a cinq lignes de long ; sa queue douze lignes & demie ; son pied six lignes ; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, six lignes & demie, l'intérieur quatre lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière cinq lignes & demie, & l'intérieur trois lignes. Il a six pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est rouge. L'occiput est noir, & marqué de petits points blancs. Les côtés de la tête sont bruns, & marqués de même de petits points blancs. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un gris tirant sur le roux. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les côtés sont couverts de plumes d'un blanc-roussâtre, bordées de brun. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur. Les jambes sont d'un gris tirant sur le roux. Les plumes de l'aîle sont cendrées en-dessous, & en-dessus elles sont d'un gris tirant

& totidem lineas explet ; & ad extremos ungues tres pollices cum quinque lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque lineas longum est ; cauda duodecim cum semi lineas ; pes sex lineas ; digitorum anteriorum exterior cum ungue sex cum semi lineas, interior quatuor cum semi lineas ; posticorum extimus quinque cum semi lineas, intimus tres lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum sex pollicum intervallo distant ; alarum verò complicatarum ad tres quartas longitudinis caudae partes usque protenduntur. Vertex capitis rubro tingitur. Occipitium nigrum est, & albo punctulatum. Caput ad latera fuscescit, & punctulis albis similiter notatur. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennae scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudae rectrices ex griseo ad rufum vergunt. Guttur, partem colli inferioriorem, pectus, ventrem & latera vestiunt pennae alborufescentes, marginibus fuscis praeditae. Inferiores caudae rectrices concolores. Crura ex griseo ad rufum inclinant. Remiges alarum



Fig. 1.

2. *Pic noir hupé de Cayenne.*



Fig. 2.

Fig. 1.

Échelle de 6 Pouces pour la 2^e Figure.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Torcol.

2. Pic noir hupé de Cayenne.





Pic varié' de Canada.



Dessiné et Gravé par M. Martinet.

1. Pic varié

2. Pic varié de Canada





Fig. 1.

2. Petit Pic rayé de S.^t Domingue.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Pic à tête rouge de Virginie. 2. Petit Pic rayé de S.^t Domingue.






2. Petit Pic de S. Domingue.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Pic rayé de S. Domingue.

2. Petit Pic de S. Domingue.



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XIII.* 85

sunt subtus cinereæ, superne verò griseo-rufescentes; minorum oræ exteriores ex albo rufescunt. Decem rectricibus cauda constat: quatuor intermediæ fuscæ: utrinque proximè sequens in latere exteriorè concolor, in interiorè albo-rufescens, fusco marginata: binæ utrinque extremæ ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque fuscæ, alterâ medietate albo-rufescentes, fusco terminatæ, albo-rufescente colore quamlibet rectricem obliquè dividente. Rostrum, pedes, unguisque grisei. Habitat in *Cayana*, unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. Artur.*

sur le roux; le bord extérieur des moyennes est d'un blanc-roussâtre. La queue est composée de dix plumes: les quatre du milieu sont brunes: celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est de la même couleur du côté extérieur, & son côté intérieur est d'un blanc-roussâtre, & bordé de brun: les deux plus extérieures de chaque côté sont de cette dernière couleur depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, l'autre moitié est d'un blanc-roussâtre, & terminée de brun, le blanc-roussâtre coupant obliquement chaque plume. Le bec, les pieds & les ongles sont gris. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur.*

SECTION II.

Eæ quæ rostro donantur recto, & linguâ rostrum longitudine non superante.

UNICO genere, *Galbula* scilicet, constituitur hæc sectio. Hujus generis Aves rostrum habent longissimum, quadrangulare, acutum.

SECTION II.

Ceux qui ont le bec droit, & la langue pas plus longue que le bec.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui du *Jacamar*. Les Oiseaux de ce genre ont le bec très-long, quadrangulaire & pointu.

*Le genre du Jacamar (1).**Genus Galbulæ (1).*

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; deux devant, & deux derrière :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

Le bec droit, très-long, quadrangulaire & pointu :

La langue pas plus longue que le bec.

Parmi les especes de ce genre les unes n'ont que dix plumes à la queue, & les autres en ont douze.

(1) *Jacamar*, nom formé de *Jacamaciri*, qui est celui que les *Brasiliens* donnent à la première espece de ce genre.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti ; duo scilicet antici, totidem postici :

Crura ad calcaneum usque plumosa :

Rostrum rectum, longissimum, quadrangulare ; acutum :

Lingua rostrum longitudine non superans.

Hujus generis specierum aliæ decem tantum rectricibus, aliæ duodecim præditæ sunt.

(1) *Galbula*, nomen primæ hujus generis speciei à *Moehringio* inditum.

** 1. LE JACAMAR.

Voyez Pl. V. Fig. 1 :

Galbula superne viridi-aurea, cupri puri colore varians ; inferne rufa ; pectore dorso concolore ; remigibus majoribus nigricantibus, oris exterioribus viridi-aureis ; rectricibus viridi-aureis, cupri puri colore variantibus.... GALBULA.

Galbula. Moehr. Avi. Gen. 107.

Picus Brasiliensis, Jacamaciri Marcgravii, Willughbeji. Klein. Avi. pag. 28. N°. 15.

Jacamaciri. Pison. Hist. Nat. pag. 96, in qua hujus icon non satis accurata. Jacamaciri Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 202, in qua hujus icon non satis accurata.

Jonst. Avi. pag. 138. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 57.
Jacamaciri Brasiliensium, Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 96. hujus
icon à Marcgravio mutuata Tab. XXII.

Raj. Syn. Avi. pag. 44. N°. 3.

Les Brasiliens l'appellent JACAMACIRI. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Alaudam crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos, infra oculos usque productos, duos pollices longum est; cauda tres pollices cum quatuor lineis; pes quinque lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue octo lineas, intimus septem lineas; posticorum extimus quatuor cum semi lineas, intimus quatuor lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum novem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ tertiam longitudinis caudæ partem non attingunt. Caput, collum, pectus, dorsum & uropygium vestiunt pennæ splendidissimè viridi-aureæ, cupri puri colore variantes. Superiores caudæ tectrices, sicut & scapulares, concolores. Guttur in aliis rufum est, in alteris candidum. Venter, latera,

Il est à peu près de la grosseur d'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent jusque sous les yeux, a deux pouces de long; sa queue trois pouces quatre lignes; son pied cinq lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle; huit lignes, l'intérieur sept lignes; l'extérieur de ceux de derrière quatre lignes & demie, & l'intérieur quatre lignes. Il a neuf pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête, le col, la poitrine, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un verd-doré très-éclatant, & changeant en couleur de cuivre de rosette. Les uns ont la gorge rousse, d'autres l'ont blanche. Le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du

deffous des aîles & les côtés font roux. Les petites couvertures du deffus des aîles, ainfi que les grandes les plus proches du corps, font de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps font noirâtres, & bordées extérieurement de verd-doré. Les grandes plumes de l'aîle font de la même couleur que ces dernières couvertures : les moyennes font d'un verd-doré très-éclatant, & changeant en couleur de cuivre de rosette. La queue est composée de dix plumes de la même couleur que les moyennes des aîles. Les deux du milieu font un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. La bafe du demi-bec fupérieur est garnie de plumes noires, roides, en forme de poils, tournées en-devant, & qui forment une efpece de barbe. L'iris des yeux est d'un beau bleu. Le bec est noir. Les pieds font d'un jaune-verdâtre ; & les ongles noirâtres. On le trouve au *Bréfil* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Effars*.

crura, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes rufo tinguntur colore. Rectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ; eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores sunt nigricantes, exterius viridi-aureo marginatæ. Remiges majores similiter nigricantes, oris exterioribus viridi-aureis præditæ; minores splendidissimè viridi-aureæ, cupri puri colore variantes. Caudam componunt decem rectrices remigibus minoribus concolores. Binæ intermedia lateralium longitudinem nonnihil excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Mandibula superior ad basin pennis obfita est nigris, rigidis, piliformibus, antrorsum versis & barbam quodammodo constituentibus. Oculorum irides cyanæ. Rostrum nigrum. Pedes flavo-viridescentes; ungues verò nigricantes. Habitat in *Brasilia* & *Cayana*, unde in museum *Realmurianum* missa à *D. des Effars*.

** 2. LE JACAMAR A LONGUE QUEUE.

Voyez Pl. V. Fig. 2.

Galbula viridi-aurea ; capite fusco ; obscurè violaceo variante ; collo inferiore candido ; rectricibus superne obscurè viridibus , infernè nigricantibus , quatuor utrinque extimis apice rufescente marginatis , binis intermediis longissimis
GALBULA LONGICAUDA.

Ipida Surinamensis, caudâ longissimâ duabus pennis excurrentibus furcata. *Klein. Avi. pag. 36. N^o. 9.*

Martin-pêcheur à queue d'Hirondelle. *Edwards. Tom. I. pag. X ; avec une figure assez exacte (excepté les pieds) Pl. 10.*

Crassitie præcedentem paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos, infra oculos usque productos, duos pollices & quinque lineas longum est ; (quædam individua rostro multò breviora donantur) : cauda sex pollices ; pes quinque cum semi lineas ; digitorum anticorum exterior cum ungue septem lineas, interior quinque cum semi lineas ; posticorum extimus eadem mensurâ donatur, intimus tres lineas longus. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia

Tom. IV.

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent jusque sous les yeux, a deux pouces cinq lignes de long ; (il y en a qui ont le bec beaucoup plus court) : sa queue six pouces ; son pied cinq lignes & demie ; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, sept lignes, l'intérieur cinq lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière a aussi cinq lignes & demie, & l'intérieur trois lignes. Il a dix pouces six lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au quart de la longueur de la

M

queue. La tête est d'un brun changeant en violet sombre. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessus des ailes & les plumes scapulaires sont d'un verd-doré peu éclatant, excepté les couvertures du dessus des ailes, qui sont assez brillantes, & changent en couleur de cuivre de rosette. Quelques endroits du dos changent aussi en violet sombre. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Les plumes de l'aile sont d'un verd sombre en-dessus, noirâtres en-dessous, & bordées de blanc du côté intérieur seulement depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur. La queue est composée de douze plumes d'un verd sombre en-dessus, & noirâtres en-dessous : les quatre plus extérieures de chaque côté sont de plus bordées de roussâtre par le bout. Toutes ces plumes sont d'inégale longueur : les deux du milieu sont plus longues de deux pouces trois lignes que celle qui les suit immédiatement de chaque côté : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés


est decem pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ quartam longitudinis caudæ partem attingunt. Caput fuscum est, obscurè violaceo varians. Guttur & collum inferius albicant. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ superiores & inferiores, penæ alas superne vestientes, sicut & scapulares, colore tinguntur viridi-aureo non multum splendido, exceptis rectricibus alarum superioribus satis lucidis, & cupripuri colore variantibus. Quibusdam in locis dorsi color violaceo obscuro variat. Inferiores alarum rectrices albeant. Remiges sunt superne obscurè virides, infernè nigricantes, & in latere interiore ab ipsarum exortu versus tantum mediam longitudinem usque albo marginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices superne obscurè virides, subtus nigricantes : quatuor insuper utrinque extimæ sunt apice rufescente marginatæ. Omnes autem rectrices inæqualem obtinent longitudinem : binæ intermediæ utrinque proximè sequentem duorum pollicum & trium linearum lon-



Fig. 1.

2. Jacamar à longue queue.





LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XIII.* 91
 gitudine superant : laterales
 omnes gradatim longitudine
 minuuntur ad utrinque extimam usque unum tantum pollicem longam. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Surina* & *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Artur* & *D. des Essars*.
 jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui n'a qu'un pouce de long. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *Surinam* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur* & *M. des Essars*.

SECTIO III.

Eæ quæ rostrum habent modicè deorsum inflexum, superne convexum, lateralter compressum.

DUOBUS Avium generibus conflata est hæc sectio. Aliæ enim donantur basi rostri pennis rigidis, piliformibus, antrorsum versis obstitâ, ut *Bucco* : aliæ verò basi rostri pennis piliformibus destitutâ, ut *Cuculus*.

XLIX.

Genus Bucconis (1).

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis destituti; duo scilicet an-

(1) *Bucco*, nomen à me huic generi impositum à *buccarum* sive genarum & capitis crassitie.

SECTION III.

Ceux dont le bec est un peu courbé en-enbas, convexe en-dessus & comprimé par les côtés.

IL y a dans cette section deux genres d'Oiseaux. Les uns ont la bête du bec garnie de plumes roides & en forme de poils, tournées en-devant, comme le *Barbu* : & les autres ont la bête du bec denuée de ces plumes en forme de poils, comme le *Coucou*.

XLIX.

Le Genre du Barbu (1).

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de membranes; deux devant, & deux

(1) J'ai donné à ce genre le nom de *Barbu*, à cause des plumes roides & en forme de poils, dont la bête du bec des espèces de ce genre est garnie, & qui forment une espèce de barbe.

M ij

derrière; tous séparés environ
jusqu'à leur origine :

Les jambes couvertes de plu-
mes jusqu'au talon :

Le bec un peu courbé en en-
bas , convexe en - dessus &
comprimé par les côtés :

La bête du bec garnie de plu-
mes roides & en forme de
poils , tournées en-devant.

Presque toutes les especes
de ce genre n'ont que dix plu-
mes à la queue.

tici , totidem postici ; om-
nes circiter usque ad exor-
tum discreti :

Crura ad calcaneum usque
plumosa :

Rostrum modicè deorsum
inflexum , superne con-
vexum , lateraliter com-
pressum :

Basis rostri pennis rigidis ;
piliformibus , antrorsum
versis , obsita.

Hujus generis specierum
ferè omnium cauda decem
tantum rectricibus conflatur.

** 1. LE BARBU.

Voyez Pl. VI. Fig. 2.

Bucco superne rufus , nigro transversim striatus , infernè ru-
fescens ; gutture & collo inferiore sordide albis ; tæniâ trans-
versâ in summo dorso fulvâ ; summo corpore tæniâ nigrâ
circumdato ; rectricibus rufis , nigro transversim striatis
BUCCO.

Il est à peu près de la gros-
seur de la *Pie-grièche rousse*. Sa
longueur depuis le bout du bec
jusqu'à celui de la queue est de
sept pouces trois lignes , & jus-
qu'à celui des ongles de six pou-
ces neuf lignes. Le demi-bec
supérieur est un peu crochu par
le bout , & a depuis son crochet
jusqu'aux coins de la bouche ,
qui s'étendent jusque sous les
yeux , un pouce cinq lignes de

Lanium rufum crassitie
circiter æmuletur. Ipsius lon-
gitude à rostri apice ad cau-
dam extremam septem pol-
lices & tres lineas æquat ,
& ad extremos ungues sex
pollices & novem lineas.
Mandibula superior est pau-
lulum apice adunca , & ab
ipsius unco ad oris angu-
los , infra oculos usque pro-
ductos , unum pollicem &

quinque lineas longa est; cauda duos pollices cum tribus lineis; pes septem cum semi lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue decem lineas, intimus sex cum semi lineas; posteriorum extimus octo lineas, intimus quatuor lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ rufæ, strictis taniis transversis nigris striatæ. Quæ caudam superne cooperiunt, superiores alarum tectrices (exceptis majoribus à corpore remotioribus fuscis) & pennæ scapulares concolores. In parte dorsi suprema tania extat transversa fulva, utrinque ad pectus usque protensa, quam sequitur tania similiter transversa nigra, quæ quidem multò strictior est. Caput ad latera penitus rufum, & nequaquam nigro striatum. Guttur & pars colli inferior sordidè albicans. Pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes rufes-

long; sa queue deux pouces trois lignes; son pied sept lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, dix lignes, l'intérieur six lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière huit lignes, & l'intérieur quatre lignes. Il a dix pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes rousses, rayées de bandes étroites & transversales noires. Les couvertures du dessus de la queue, celles du dessus des ailes (excepté les grandes les plus éloignées du corps, qui sont brunes) & les plumes scapulaires sont de la même couleur. Sur la partie supérieure du dos est une bande transversale fauve, qui s'étend de chaque côté jusqu'à la poitrine, & qui est suivie d'une bande aussi transversale noire, mais beaucoup plus étroite qu'elle. Les côtés de la tête sont tout-à-fait roux & sans rayures. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc sale. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un roussâtre plus foncé

vers l'anus qu'ailleurs. Sur le haut de la poitrine est une bande transversale noire, beaucoup plus large que celle du dos, & dont les deux bouts répondent aux deux bouts de cette dernière, de façon qu'ensemble elles entourent le haut du corps. Toutes les plumes de l'aile sont brunes, excepté les deux ou trois plus proches du corps, qui sont variées de même & des mêmes couleurs que les plumes du dos : les moyennes sont aussi bordées extérieurement de roux. La première des plumes de l'aile est très-courte : la quatrième est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes rousses, rayées de bandes étroites & transversales noires. Les six du milieu sont d'égale longueur : les trois autres plus extérieures de chaque côté vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le demi-bec supérieur est noirâtre en-dessus, & d'une couleur de corne claire sur les côtés ; le demi-bec inférieur est entièrement de cette dernière couleur. Les pieds & les ongles sont cendrés. On le trouve dans *la Guiane. Du cabinet de Madame de Bandeville.*

cunt, sed anum versùs saturatius quàm in reliquis prædictis partibus. In summo pectore tænia adest transversa nigra, quàm tænia dorsi multò latior, cujus extremitates tæniæ dorsi extremitatibus respondent, ita ut summum corpus simul circumdant. Remiges omnes sunt fuscæ, si tamen excipias duas tresve corpori finitimas, iisdem coloribus, eodemque modo ac pennæ dorsum vestientes variegatæ : minorum insuper margines exteriores sunt ruscæ. Remix prima brevissima : quarta omnium longissima. Caudam componunt duodecim rectrices ruscæ, strictis tæniis transversis nigris striatæ. Sex intermedia æquali longitudine pollent : reliquæ tres utrinque extremæ gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum. Mandibula superior superne nigricans, ad latera verò dilutè corneo colore tincta ; inferior dilutè corneo colore penitus imbuta. Pedes unguisque cinerei. Habitat in *Guiana. Ex musæo D. de Bandeville.*

** 2. LE BARBU DE CAYENNE.

Voyez Pl. VII. Fig. 1.

Bucco superne niger, marginibus pennarum griseo-aureis, infernè albo-flavicans; syncipite & gutture rubris; taniâ supra oculos candicante; rectricibus superne fuscis, ad olivaceum inclinantibus, subtus cinereis BUCCO CAYANENSIS.

Craffitie *Alaudam cristatam* circiter æmulator. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem septem pollices æquat, & ad extremos ungues sex pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda duos pollices cum linea una; pes decem cum semi lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue decem lineas, intimus septem cum semi lineas; posteriorum extimus novem cum semi lineas, intimus quinque cum semi lineas. Digiti bini antiqui ad primum usque articulum inter se arctè cohærent. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum & duarum linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Synciput & guttur ru-

Il est à peu près de la grosseur de l'*Alouette hupée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue deux pouces une ligne; son pied dix lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, dix lignes, l'intérieur sept lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes & demie, & l'intérieur cinq lignes & demie. Les deux doigts antérieurs sont étroitement unis jusqu'à la première articulation. Il a dix pouces deux lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le synciput & la gorge sont rouges: cette couleur s'étend aussi sur la mâchoire inférieure. Le som-

met de la tête est varié de noir & de gris-doré, le noir occupant le milieu de chaque plume, & le gris-doré en occupant les bords. De chaque côté de la tête est une bande blanchâtre, qui passe par-dessus les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. Les côtés de la tête sont noirs. La partie supérieure du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noires, bordées de gris-doré. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La partie inférieure du col, la poitrine & le ventre sont d'un blanc-jaunâtre. Les côtés sont variés longitudinalement de blanc-jaunâtre & de cendré-olivâtre, & quelques-unes des plumes sont marquées vers leur bout d'une tache noire. Les jambes sont olivâtres. Les couvertures du dessous de la queue sont rayées transversalement de cendré & de blanc. Les petites du dessus des ailes sont noires : les grandes, ainsi que les plumes scapulaires, sont noirâtres, & marquées sur leur côté extérieur d'une tache d'un blanc-jaunâtre. Les plumes de l'aile sont noirâtres, bordées extérieurement d'olivâtre & intérieurement de blanchâtre. La queue est composée de dix plumes d'un brun tirant sur l'olivâtre en-des-

bra sunt : quæ rubedo supra maxillam inferiorem quoque protenditur. Summum caput nigro & griseo-aureo variegatur, nigro scilicet cujuslibet pennæ medium occupante, & griseo-aureo circa margines posito. In utroque capitatis latere tænia extat candicans, supra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Caput ad latera nigrum. Partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigræ, marginibus griseo-aureis præditæ. Superiores caudæ rectrices concolores. Collum inferius, pectus & venter ex albo flavicant. Latera albo-flavicante & cinereo-olivaceo longitudinaliter variegantur, quibusdam pennis versùs apicem maculæ nigræ notatis. Crura sunt olivacea. Pennæ caudam subtus cooperientes cinereo & albo transversim striatæ. Superiores alarum rectrices minores nigræ : majores, sicut & scapulares, nigricantes, in latere exteriori maculæ albo-flavicante insignitæ. Remiges nigricant, oris que donantur exterioribus olivaceis, interioribus candicantibus. Cauda decem constat rectricibus superne fuscis, ad olivaceum inclinantibus, subtus cinereis.

cinereis. Binæ intermedia lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Rostrum ex cinereo nigricat. Pedes, unguisque sunt cinerei. Habitat in *Cayana*, unde in *musæum Reaumurianum* missus à *D. des Essars*.

sus, & cendrées en-dessous. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un cendré-noirâtre. Les pieds & les ongles sont cendrés. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

** 3. LE BARBU TACHETÉ DE CAYENNE.

Voyez Pl. VII. Fig. 4.

Bucco superne nigricans, marginibus pennarum griseis, infernè albo-flavicans; syncipite & gutture rubris; collo inferiore, pectore & lateribus maculis nigris variegatis; rectricibus superne fuscis, ad olivaceum inclinantibus, subtus cinereis BUCCO CAYANENSIS NÆVIUS.

Cum præcedente crassitie convenit. Ipsiꝯ longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim cum semi lineas longum est; cauda duos pollices; pes decem lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue eandem obtinet longitudinem, intimus septem lineas longus; posti-

Tom. I.

Il est de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces sept lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; sa queue deux pouces; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, a aussi dix lignes, l'intérieur sept lignes; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes, & l'inté-

N

rieur cinq lignes. Les deux doigts antérieurs sont étroitement unis jusqu'à la première articulation. Il a neuf pouces huit lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le synciput & la gorge sont rouges : cette couleur s'étend aussi sur la mâchoire inférieure. Le sommet de la tête est varié de noir & de gris-doré, le noir occupant le milieu de chaque plume, & le gris-doré en occupant les bords. Les côtés de la tête & le dessus du col sont couverts de plumes noires, bordées de blanchâtre. Celles qui couvrent le dos & le croupion, sont noirâtres & bordées de gris. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La partie inférieure du col, la poitrine & les côtés sont d'un blanc-jaunâtre, varié de grandes taches noires. Le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-jaunâtre & sans taches. Les jambes sont olivâtres. Les petites couvertures du dessus des ailes sont noires, & bordées de gris-blanc : les grandes, ainsi que les plumes scapulaires, sont noirâtres, bordées de gris-blanc, & marquées sur chacun de leurs côtés d'une petite ta-

corum exterior novem lineas, interior quinque lineas. Digiti duo antici ad primum usque articulum inter se arcte coherent. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est novem pollicum & octo linearum ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Synciput & guttur rubro tinguntur : rubedo autem supra maxillam inferiorem quoque protenditur. Summum caput nigro & griseo - aureo variegatur ; pennis scilicet in medio nigris & circa margines griseo-aureis. Caput ad latera & collum superius pennis vestiuntur nigris, candicante marginatis. Quæ dorsum & uropygium obtegunt, nigricant, & marginibus donantur griseis. Superiores caudæ rectrices concolores. Collum inferius, pectus & latera sunt albo-flavicantia, majusculis maculis nigris variegata. Venter & rectrices caudæ inferiores ex albo quoque flavicant, sed maculis destituuntur. Crura sunt olivacea. Superiores alarum rectrices minores nigrae, griseo-albo marginatae : majores, sicut & scapulares pennæ, nigricantes, griseo-albo fimbria-

ta, & minutâ maculâ similiter griseo-albâ in utroque latere notatâ. Remiges fusca, oris exterioribus olivaceis, interioribus candidibus præditâ. Caudam componunt decem rectrices superne fusca, ad olivaceum inclinantes, subtus cinereæ. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululûm excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum cinereo-nigricans. Pedes, unguesque cinerei. Habitat in Cayana, unde in museum Realmurianum missus à D. des Effars.

che de la même couleur. Les plumes de l'aile sont brunes; leur bord extérieur est olivâtre, & l'intérieur blanchâtre. La queue est composée de dix plumes d'un brun tirant sur l'olivâtre en-dessus & cendrées en-dessous. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un cendré-noirâtre. Les pieds & les ongles sont cendrés. On le trouve à Cayenne, d'où il a été envoyé à M. de Reaumur par M. des Effars.

** 4. LE BARBU DES PHILIPPINES,

Voyez le mâle Pl. VII. Fig. 2.

Bucco superne obscurè viridis, infernè sordidè flavicans, maculis longitudinalibus obscurè viridibus variis; (syncipite & taniâ transversâ in summo pectore rubris mas); genis, gutture & collo inferiore luteis (mas) albo-flavicantibus (fœmina); rectricibus superne obscurè viridibus, subtus cinereo-cœruleis BUCCO PHILIPPENSIS.

Passerem domesticum crassitie non multum superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & tres li-

Il n'est guères plus gros qu'un Moineau franc. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces trois lignes, & jusqu'à

celui des ongles de cinq pouces cinq lignes. Son bec, qui est fort épais, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche onze lignes de long; sa queue quinze lignes; son pied huit lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, a aussi huit lignes, l'intérieur six lignes; l'extérieur de ceux de derrière sept lignes & demie, & l'intérieur quatre lignes. Il a neuf pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête ou le synciput depuis l'origine du demi-bec supérieur jusqu'au milieu du sommet de la tête est d'un beau rouge. Le reste du dessus de la tête, la partie supérieure & les côtés du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd obscur. De chaque côté de la tête est une grande tache jaune, dans laquelle l'œil est placé. La gorge & la partie inférieure du col sont jaunes. Sur le haut de la poitrine est une large bande transversale rouge. Le bas de la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un jaunâtre sale, varié de taches longitudinales d'un verd

neas explet, & ad extremos ungues quinque pollices & totidem lineas. Rostrum, quod quidem valdè crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda quindecim lineas; pes octo lineas; digitorum anticorum exterior cum ungue eâdem longitudine pollet, interior sex lineas longus est; posticorum extimus septem cum semi lineas, intimus quatuor lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est novem pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput superius sive synciput ab exortu mandibulæ superioris ad medium summi capitis usque eleganti rubro tingitur. Capitis superioris reliqua pars, collum superius & ad latera, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt obscurè virides. In utroque capitis latere majuscula extat macula lutea; in qua oculus situs est. Guttur & pars colli inferior lutei sunt coloris. Summum pectus latâ insignitur taniâ transversâ rubrâ. Pectus infimum, venter, latera, cru-

ra, inferioresque caudæ tectrices sordidè flavicant, maculisque variegantur longitudinalibus obscurè viridibus, cujuslibet pennæ medium occupantibus. Pennæ alas subtus obtegentes sunt sordidè flavicantes & immaculatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, dorso concolores : majores à corpore remotiores fuscæ, exterius viridi fimbriatæ. Remiges majores eodem fusco imbutæ, oris exterioribus viridibus, interioribus albidis præditæ : minores in latere exteriori virides, in interiori fuscæ. Caudam componunt decem rectrices superne obscurè virides, subtus cinereo-cœruleæ. Rostrum, unguisque fusci ; pedes verò flavicantes.

Fœmina nonnihil *mari* crassitie cedit. Ab illo quoque discrepat capite & pectore rubro destitutis. Majuscula macula, in qua oculi siti sunt, guttur & collum inferius ex albo flavicant. In reliquis cum *mare* perfectè convenit.

Habitant in *Philippensibus*

obscur, qui occupent le milieu de chaque plume. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un jaunâtre sale & sans taches. Les petites du dessus ; ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & bordées extérieurement de verd. Les grandes plumes de l'aile sont pareillement brunes ; leur bord extérieur est verd, & l'intérieur est blanchâtre : les moyennes sont vertes du côté extérieur, & brunes du côté intérieur. La queue est composée de dix plumes d'un verd obscur en-dessus & d'un cendré-bleu en-dessous. Le bec & les ongles sont bruns ; & les pieds sont jaunâtres.

La *femelle* est un peu moins grosse que le *mâle*. Elle en diffère encore en ce qu'elle n'a point de rouge sur la tête, non plus que sur la poitrine. La grande tache dans laquelle ses yeux sont placés, sa gorge & la partie inférieure de son col sont d'un blanc-jaunâtre. Du reste elle ressemble parfaitement au *mâle*.

On les trouve aux *Philippi-*

nes, d'où ils ont été apportés à M. de Reaumur par M. Poivre.

Insulis, unde in museum Realmurianum allati à D. Poivre.

** 5. LE BARBU DES MAYNAS.

Voyez Pl. VII. Fig. 3.

Bucco superne viridis, infernè albo-flavicans; maculis longitudinalibus viridibus variis; vertice & gutture rubris; taniis dilutè cœruleis circumdatis; collo inferiore & pectore luteis; maculâ in imo pectore rubrâ; rectricibus viridibus BUCCO MAYNANENSIS.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue un pouce onze lignes; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, huit lignes & demie, l'intérieur six lignes; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes, & l'intérieur quatre lignes & demie. Il a huit pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le sommet de la tête & la gorge sont d'un beau rouge: cette couleur est terminée sur le sommet de la tête &

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem quinque pollices & octo lineas æquat; & ad extremos ungues quinque pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem lineas longum est; cauda unum pollicem cum undecim lineis; pes decem lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue octo cum semi lineas, intimus sex lineas; posticorum exterior novem lineas, interior quatuor cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum octo pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam circiter longitudinem caudæ pertingunt. Vertex capitis &

guttur eleganti rubro tinguntur : ad cuius rubedinis margines in capitis vertice , sicut & sub gutture , tænia extat transversa dilutè cœrulea ; in utroque capitis latere altera adhuc adest lata tænia simili dilutè cœruleo tinctæ , ab exortu mandibulæ inferioris orta , secundum maxillæ inferioris longitudinem ducta , & sic supra dictas tænicas transversas attingit : ita ut color ruber , sive in capitis vertice , sive in gutture , in tota ipsius circumferentia , exceptò versùs basim rostri , cœruleo ambiatur. Occiput , pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , alas superne vestientes & superiores caudæ rectrices sunt splendide virides. Collum inferius & pectus lutea. Pectus infimum majusculâ insignitur maculâ rubrâ. Venter , latera , crura , inferioresque caudæ rectrices ex albo flavicant , maculisque longitudinalibus viridibus variegantur. Pennæ alas subtus obtegentes sunt albo-flavicantes & immaculatæ. Binæ primores remiges brevissimæ , fuscæ : reliquæ omnes subtus cinereo-fuscæ , superne verò in latere exteriori virides , in interiore fuscæ , albo-fla-

sous la gorge par une bande transversale d'un bleu clair ; il y a aussi de chaque côté de la tête une autre large bande de la même couleur , qui part de l'origine du demi-bec inférieur , s'étend tout le long de la mâchoire inférieure , & va joindre les bandes transversales dont nous avons parlé ci-dessus : de sorte que le rouge du dessus de la tête , ainsi que celui de la gorge , est tout entouré de bleu , excepté vers la base du bec. L'occiput , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un beau verd. La partie inférieure du col & la poitrine sont jaunes. Au bas de la poitrine est une grande tache rouge. Le ventre , les jambes , les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc-jaunâtre , varié de taches longitudinales vertes. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un blanc-jaunâtre & sans taches. Les deux premières plumes de l'aile sont très-courtes & brunes : toutes les autres sont en-dessous d'un cendré-brun , & en-dessus elles sont vertes du côté extérieur , brunes & bordées de blanc-jaunâtre du côté intérieur. La queue est composée de dix plumes vertes. Les

quatre du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est cendré, excepté les bords & le bout des deux mandibules, qui sont d'un blanc-jaunâtre. Les pieds & les ongles sont cendrés. On le trouve dans le pays des *Maynas*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Godin*.

vicante marginatæ. Decem reëtricibus viridibus cauda conflatur. Quatuor intermedia lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Rostrum cinereum, duarum tamen mandibularum marginibus & apice albo-flavicantibus. Pedes, unguesque cinerei. Habitat in *Maynanensi* regione, unde in *musæum Reaumurianum* allatus à *D. Godin*.

L:

L:

Le genre du Coucou.

Genus Cuculi.

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; deux devant & deux derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Le bec un peu courbé en enbas, convexe en-dessus, & comprimé par les côtés:

La base du bec dénuée de plumes en forme de poils.

Presque toutes les espèces de ce genre n'ont que dix plumes à la queue.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; duo scilicet antici, totidem postici; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Rostrum modicè deorsum inflexum, superne convexum, lateraliter compressum:

Basis rostri pennis piliformibus destituta.

Hujus generis specierum ferè omnium cauda decem tantum constat reëtricibus.

** I, LE




Fig. 2.

Esperance.

2. Barbu.

Fig. 1.

Fig. 2.



Desné et Gravé par Martinet.

1. Pic du Cap de Bonne Espérance.

2. Barbu.




Barbu des Maynas. 4. Barbu tacheté de Cayenne



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Barbu de Cayenne. 2. Barbu des Philippines, mâle. 3. Barbu des Maynas. 4. Barbu tacheté de Cayenne.



** I. LE COUCOU.

Cuculus superne cinereus , infernè fordidè albus , fusco transversim striatus ; collo inferiore dilutè cinereo ; rectricibus nigricantibus , apice albis , octo intermediis maculis albis circa scapum & ad margines interiores variegatis , utrinque extimâ albo transversim striatâ CUCULUS.

Cuculus rectricibus nigricantibus , punctis albis. Faun. Suec. Linn. N° 77.

Cuculus cinereus , lineis nigricantibus transversis , pedibus croceis. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIII. sp. 1.

Cuculus nigricans , maculis subrufris. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIII. sp. 3. (Junior).

Cuculus. Gefn. Avi. pag. 362. hujus icon pessima pag. 363.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 409. hujus icon non satis accurata pag. 414. (Junior).

Schwenck. Avi. Sil. pag. 249. (Junior).

Jonst. Avi. pag. 14. hujus icon ab Olina mutuata Tab. XI ; & insuper altera icon ab Aldrovando mutuata Tab. X , sub titulo , Cuculus alter.

Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. X. (Junior).

Willugh. Ornith. pag. 62. hujus icon ab Olina mutuata Tab. X.

Charlet. Exer. pag. 73. N° V.

Charlet. Onomast. pag. 66. N° V.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 376. (Junior).

Frisch. hujus icon non satis accurata Tab. 40.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 43. sp. 1.

Moehr. Avi. Gen. 12.

Cuculus , Coccix. Gefn. icon. Avi. pag. 34 , in qua hujus icon pessima.

Cuculus , sive Coccix. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 277.

Cuculus aut Coccix. Frisch. hujus icon non satis accurata Tab. 41. (Junior).

Cuculus prior. Willugh. Ornith. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXXVII. (Junior).

Cuculus alter. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 415. hujus icon non satis accurata pag. 416.

Cuculus prima Aldrovandi. Raj. Syn. Avi. pag. 23. (Junior).

Cuculus nostras , seu Aldrovandi secunda. Raj. Syn. Avi. pag. 23.

Cuculus vulgaris nostras. Klein. Avi. pag. 30. N° 1.

Cuculus junior. Schwenck. Avi. Sil. pag. 251. (Adultus).

Tom. IV.

O

Coccix. *Bell. Obs. pag. 16.*

Cuculo. *Olina. pag. 38, in qua hujus icon accurata.*

Coucou. *Alb. Tom. I. pag. 9; avec une figure peu exacte Pl. 8.*

Cocou ; Coqu. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 22 b, dans laquelle il y a une mauvaise figure.*

Coqu. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 132, dans laquelle est la même figure;*

Les Hébreux l'appellent KAATH. Gesn. Aldrov.

Les Grecs, Κόκκυξ. Bell. Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst. Charlet.

Les Candiois, Δεκοκτο. Bell. Aldrov.

Les Syriens, Coco. Aldrov.

Les Espagnols, CUCLILLO. Gesn. Aldrov.

Les Catalans, COCUT ; CUGUL. Barr.

Les Italiens, CUCCO. Bel. Gesn. Aldrov. Olina. CUCULO. Olina. CUCULO ; CUCO ; CUCHO. Bel. Gesn. Aldrov.

Les Allemands, GUCKER. Gesn. Aldrov. Schwenck. GUCKGUCK ; KUCK-KUCK. Rzac. KUCKUK. Frisch. KUKKUCK ; GUGCKUSER ; GUGGAUCH. Gesn. Aldrov. GUCKAUCH. Schwenck.

Les Silésiens, KUCKUCK. Ils appellent le jeune, JUNGER KUCKUCK. Schwenck.

Les Flamands, KOCKOCK ou KOCKEUEUT. Gesn. KOUCKOUK ou KOCKUUNT. Aldrov.

Les Illyriens, ZIEZGULE. Gesn. Aldrov.

Les Russiens, ZEZULA. Rzac.

Les Polonois, KUKULKA ; KUKAWKA ; GZEGZOIKA. Rzac.

Les Suédois, GJOEK. Linn.

Les Lapons, GEECKA. Linn.

Les Anglois, CUCKOW. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Bifet*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long ; sa queue sept pouces ; son pied dix lignes ; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, treize lignes, l'intérieur huit lignes ; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes &

Columbam Liviam crassitie circiter æmulatur. Ipsi longitudine ab apice rostri ad caudæ extremitatem tredecim pollices æquat, & ad extremos ungues octo pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est ; cauda septem pollices ; pes decem lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue tredecim lineas, intimus octo lineas ; posticorum exti-

mus decem cum semi lineas ,
 intimus quinque cum semi li-
 neas. Alis expansis, extremi-
 tates majorum remigum
 unius pedis decem pollicum
 & sex linearum intervallo
 distant ; alæ verò complica-
 tæ nonnihil ultra tres quar-
 tas longitudinis caudæ par-
 tes extenduntur. Caput,
 pars colli superior, dorsum,
 uropygium, superiores cau-
 dæ teñtrices & scapulares
 pennæ sunt splendide cine-
 reæ. Guttur & collum infe-
 rius tingit color cinereus
 quidem , sed dilutior. Pec-
 tus, venter, latera, crura,
 inferiores caudæ teñtrices &
 pennæ alas subtus obtegen-
 tes sordide albescent, & fusco
 transversim striantur. Teñtri-
 ces alarum superiores mino-
 res, sicut & majores corpori
 viciniores, eodem imbuun-
 tur cinereo ac dorsum ipsum
 tingitur : majores proximè
 sequentes sunt fuscæ, macu-
 lis rufis ad margines variega-
 tæ, & paucò albo termina-
 tæ : majores à corpore remo-
 tiores saturatissimè cinereæ.
 Decem primores remiges eo-
 dem cinereo saturato tinctæ,
 sed in latere interiore macu-
 lis transversis albis, in extre-
 mitate, remigis scapum spec-
 tante, paucò rufo mixtis, va-

demie, & l'intérieur cinq lignes
 & demie. Il a un pied dix pou-
 ces six lignes de vol ; & ses aî-
 les , lorsqu'elles sont pliées ,
 s'étendent un peu au-delà des
 trois quarts de la longueur de la
 queue. La tête, la partie supé-
 rieure du col, le dos, le crou-
 pion, les couvertures du dessus
 de la queue & les plumes sca-
 pulaires sont d'un cendré bril-
 lant. La gorge & la partie infé-
 rieure du col sont d'un cendré
 plus clair. La poitrine, le ven-
 tre, les côtés, les jambes, les
 couvertures du dessous de la
 queue & celles du dessous des
 aîles sont d'un blanc sale, rayé
 transversalement de brun. Les
 petites couvertures du dessus
 des aîles, ainsi que les grandes
 les plus proches du corps, sont
 du même cendré que le dos : les
 grandes qui suivent immédiate-
 ment ces dernières sont brunes,
 variées de taches rousses sur
 leurs bords, & terminées d'un
 peu de blanc : les grandes les
 plus éloignées du corps sont
 d'un cendré très-foncé. Les dix
 premières plumes de l'aîle sont
 de ce même cendré foncé, mais
 leur côté intérieur est varié de
 taches transversales blanches,
 mêlées d'un peu de roux sur le
 bout qui tend vers la tige de la
 plume : les six suivantes sont
 brunes variées des deux côtés,

de taches transversales rousses , & bordées de blanc par le bout : enfin les trois plus proches du corps sont du même cendré que le dos & sans taches. La première des plumes de l'aile est assez courte : la troisième est la plus longue de toutes. La queue est composée de dix plumes noirâtres : les huit du milieu sont variées de petites taches blanches auprès de leur tige & sur leur bord intérieur , & de plus elles sont terminées de blanc ; les deux du milieu ont aussi quelques petites taches blanches sur leur bord extérieur : la plus extérieure de chaque côté est rayée transversalement de blanc. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est noir. Les coins de la bouche sont de couleur de safran. Les pieds & les ongles sont jaunes.

Le *Jeune* de cette espèce diffère beaucoup de l'*Adulte* par sa couleur. Il a la tête & les parties supérieures du col & du dos couvertes de plumes brunes , bordées de blanc. Les plu-

riegatæ : sex sequentes fuscæ , in utroque latere maculis transversis rufis variæ , & apice albo fimbriatæ : tres tandem corpori finitimæ eodem ac in dorso cinereo tinctæ & immaculatæ. Remix prima breviuscula : tertia omnium longissima. Decem rectricibus nigricantibus cauda constat : octo intermediæ minutis maculis albis circa ipsarum scapum & ad margines interiores variegantur , & albis insuper apicibus præditæ sunt ; binæ intermediæ quibusdam quoque donantur in margine exteriori minutis maculis albis : utrinque extrema albo est transversim striata. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Oculorum irides avelanæ. Rostrum nigrum. Oris anguli colore croceo tincti. Pedes , unguesque lutei.

Hujus speciei *Junior* ab *Adulto* multum colore differt. Caput & partem colli superiorem , sicut & dorsi supremam , vestiunt pennæ fuscæ , albo marginatæ. Scapu-

lars & superiores alarum
 rectrices concolores, minutis
 insuper maculis rufescenti-
 bus ad ipsarum margines va-
 riegate. Quæ dorsum infu-
 mum & uropygium obte-
 gunt, nec non rectrices cau-
 dæ superiores cinereæ, in api-
 ce albo fimbriatæ. Guttur &
 pars colli inferior tæniis
 transversis alternatim albis
 & fuscis variegantur. Pec-
 tus, venter, latera, crura,
 inferiores caudæ rectrices,
 & pennæ alas subtus coope-
 rientes sordide albescent, &
 fusco transversim striantur.
 Decem primores remiges
 sunt fusce, ad apicem albo
 fimbriatæ, & in latere ex-
 teriore maculis quibusdam
 rufescentibus, in interiore
 maculis transversis albis, in
 extremitate, remigis scapum
 spectante, pauco rufo mixtis,
 variæ: reliquæ omnes remi-
 ges fusce, utrinque maculis
 transversis rufis variegatæ,
 & in apice albo marginatæ.
 Caudæ rectrices eodem ac in
Adulto colore tinguntur.
 Oculorum irides avellaneæ.
 Oris anguli croceo colore
 imbuti. Rostrum nigrum. Pe-
 des, unguesque lutei.

mes scapulaires & les couver-
 tures du dessus des ailes sont de
 la même couleur, & variées de
 plus sur leurs bords de petites
 taches roussâtres. Celles qui
 couvrent la partie inférieure du
 dos & le croupion, ainsi que les
 couvertures du dessus de la
 queue, sont cendrées, & bor-
 dées de blanc par le bout. La
 gorge & la partie inférieure du
 col sont variées de bandes tran-
 sversales alternativement blan-
 ches & brunes. La poitrine, le
 ventre, les côtés, les jambes,
 les couvertures du dessous de la
 queue & celles du dessous des
 ailes sont d'un blanc sale, rayé
 transversalement de brun. Les
 dix premières plumes de l'aile
 sont brunes, bordées de blanc
 par le bout, & variées du côté
 extérieur de quelques taches
 roussâtres & du côté intérieur de
 taches transversales blanches,
 mêlées d'un peu de roux sur le
 bout qui tend vers la tige de la
 plume: toutes les autres plumes
 de l'aile sont brunes, variées des
 deux côtés de taches transver-
 sales rousses, & bordées de
 blanc par le bout. Les plumes
 de la queue sont de la même
 couleur que celles de l'*Adulte*.
 L'iris des yeux est de couleur
 de noisette. Les coins de la

bouche sont de couleur de safran. Le bec est noir. Les pieds
 & les ongles sont jaunes.

Cet Oiseau est le seul connu qui abandonne sa postérité à des soins étrangers. Il ne fait point de nid ; mais il cherche celui de quelque espece de *Fauvette*, de laquelle il détruit les œufs, s'il s'en trouve dans le nid, y dépose un des siens, & l'abandonne aux soins de la nourrice qu'il a choisie, qui ne manque pas de le couvrir, & de nourrir exactement le Petit qui en éclore. On commence à l'entendre chanter vers le mois d'Avril ; & il cesse au mois d'Octobre.

Du cabinet de M. de Reaumur.

Inter Aves cognitæ solus est *Cuculus* qui prolem suam aliarum Avium curæ deferat. Ipse non nidificat ; verum reperto cujusdam speciei *Currucæ* nido, ova, si qua in eo sunt, destruit, eorumque loco suum ponit, & curæ nutricis deferit : nutrix autem electa illud incubat, exclusumque Pullum studiosè nutrit. Circa mensem Aprilem primùm cantat ; & ultra Octobrem vox ipsius non auditur. *Ex musæo Reaumuriano.*

** A. LE COUCOU ROUX ;

Cuculus rufus.

Cuculus. Frisch. hujus icon accurata Tab. 42.

Celui-ci est une variété du *Jeune*. Il diffère de celui que je viens de décrire en ce que le dessus de son corps est varié de roussâtre, au lieu que dans le précédent il est varié de blanc.

Du cabinet de M. de Reaumur.

Junioris varietas est iste. Ab illo nuper descripto differt corpore superiore rufescente vario, dum in præcedente albo variegatur. *Ex musæo Reaumuriano.*

** 2. LE COUCOU DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. IX. Fig. 2.

Cuculus superne griseo-fuscus, infernè cinereo-albus ; remigibus rufis, griseo-fusco exterius admixto, apice griseo-fuscis ; rectricibus tribus utrinque extimis nigricantibus, apice albis, extimâ exterius albâ. . . . CUCULUS DOMINICENSIS.

Cuculus Americanus totus cinereus. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIII. sp. 4.*

Turdum Iliacum crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda quinque pollices & quatuor lineas; pes unum pollicem; digitorum anticorum exterior cum ungue undecim lineas, interior septem lineas; posticorum extimus decem lineas, intimus quinque lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quindecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ griseofusæ. Scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ tectrices concolores. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes ex cinereo albescent. Remiges alarum sunt rufæ, attamen apice griseofusæ, & in latere exteriori pauco griseo-fusco mixtæ; ru-

Il est à peu près de la grosseur du *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue cinq pouces quatre lignes; son pied un pouce; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes, l'intérieur sept lignes; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes, & l'intérieur cinq lignes. Il a quinze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un gris-brun. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un gris-blanc. Les plumes de l'aîle sont rousses, excepté leur bout, qui est d'un gris-brun; il y a aussi un peu de cette couleur mêlée sur le côté extérieur; & le roux devient de plus en plus clair,

en approchant vers le bord intérieur. La queue est composée de dix plumes : les quatre du milieu sont d'un gris-brun : les trois plus extérieures de chaque côté sont noirâtres , & terminées de blanc ; de plus le côté extérieur de la plus extérieure de chaque côté est de cette dernière couleur dans toute sa longueur. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte. Le bec , les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. On le trouve dans la *Guiane* & à *S. Domingue* , d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain* ; ainsi qu'à la *Louisiane* , d'où il a été envoyé à *M. le Comte de la Galissonniere* , qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

fus autem color sensim atque sensim , versùs margines interiores procedendo , fit dilutior. Caudam componunt decem rectrices , quarum quatuor intermediae griseo-fuscae : tres utrinque extremae nigricantes apicibus albis praeditae ; utrinque insuper extrema ad latus exterius per totam longitudinem albicat. Binæ rectrices intermediae lateralium longitudinem paululum excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Rostrum , pedes , unguesque griseo-fusci. Habitat in *Guiana* & *Dominicensi Insula* , unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Chervain* : habitat quoque in *Ludoviciana* ; unde missus ad *D. Comitem de la Galissonniere* , qui *D. de Reaumur* dono dedit.

3. LE COUCOU DE LA CAROLINE.

Cuculus superne cinereo-olivaceus , infernè albus ; remigibus rufescentibus ; rectricibus lateralibus nigris , apice albis . . .
CUCULUS CAROLINENSIS.

Cuculus Caroliniensis. *Klein. Avi. pag. 30. N°. 2.*

Coucou de la Caroline. *Catesb. Tom. I. pag. 9 ; avec une figure pas assez exacte Pl. 9.*

Les Anglois l'appellent CUCKOW OF CAROLINA. *Catesb.*

Crassitie

Craſſitie Merulam circiter æmulatur. Ipfius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam tredecim circiter pollices æquat, & ad extremos ungues novem pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quatuordecim cum ſemi lineas longum eſt; cauda ſex pollices; pes tredecim lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem, intimus octo lineas; poſticorum extimus undecim lineas, intimus ſex lineas. Alæ complicatæ ad tertiam longitudinis caudæ partem uſque protenduntur. Superiores capitis & colli partes, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, quæ alas ſuperne veſtiunt, ſuperioresque caudæ teſtrices ex cinereo ad olivaceum vergunt. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera & crura veſtiunt pennæ albæ. Inferiores caudæ teſtrices & pennæ alas ſubtus obtegentes concolores. Remiges alarum ruſcunt. Decem reſtricibus cauda conſtat: binæ intermediæ eodem imbuuntur colore ac dorſum ipſum tingitur: laterales omnes ſunt nigrae, apice albæ. Binæ interme-

Tom. IV,

Il eſt à peu près de la longueur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ treize pouces, & juſqu'à celui des ongles de neuf pouces ſix lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes & demie de long; ſa queue ſix pouces; ſon pied treize lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce, l'intérieur huit lignes; l'extérieur de ceux de derriere onze lignes, & l'intérieur ſix lignes. Ses aîles, lorsqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au tiers de la longueur de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles & celles du deſſus de la queue ſont d'un cendré tirant ſur l'olivâtre. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du deſſous de la queue, celles du deſſous des aîles & les côtés ſont blancs. Les plumes de l'aîle ſont rouſſâtres. La queue eſt compoſée de dix plumes: les deux du milieu ſont de la même couleur que le dos: toutes les latérales ſont noires, & terminées de blanc. Les deux du milieu ſont un peu plus longues

P

que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le demi-bec supérieur est noir, & l'inférieur est jaunâtre. Les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. Cet Oiseau est solitaire, & se tient ordinairement dans les endroits des bois les plus épais & les plus sombres. On le trouve à la Caroline, d'où il se retire aux approches de l'hiver.

diæ lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Mandibula superior nigra, inferior flavicans. Pedes, unguisque griseo-fusci. Solitaria est hæc Avis, & sylvarum densissima & obscuriora loca frequentat. Habitat in Carolina, & inde, appropinquante hieme, exit.

4. LE COUCOU DE LA JAMAÏQUE.

Cuculus superne cinereo-olivaceus, infernè rufus; capite fusco; gutture & collo inferiore albis; rectricibus lateralibus nigris, apice albis CUCULUS JAMAÏCENSIS.

Cuculus major olivaceus, caudâ longiori, ciliis rubris. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 476.*

Cuculus major. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 312. N°. LII. hujus iconi minimè accurata Tab. 258. fig. 1.*

Cuculus Jamaicensis major. *Klein. Avi. pag. 31. N°. 8.*

Picus major leucophœus seu canescens; Pluviæ Avis & Senex dictus. *Raj. Syn. Avi. pag. 182. N°. 12.*

An Pie, ou Pica Antillana? *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 409. (ed. 1725).*

Les Anglois de la Jamaïque l'appellent OLD-MAN. *Sloane. Raj. Browne. RAIN-BIRD. Sloane. Raj.*

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quinze pouces, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces six lignes. Son bec depuis son bout jus-

Præcedentem crassitie paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim circiter pollices explet, & ad extremos ungues novem pollices & sex lineas. Ros-

trum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum circiter pollicem longum est; cauda septem pollices cum sex lineis; pes tredecim lineas; digitorum anticorum exteriorum cum ungue undecim lineas, interior octo lineas; posticorum extimus decem lineas, intimus sex lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum quindécim circiter pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ fuscæ, serici instar mollissimæ. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne obtegunt, superioresque caudæ tectrices ex cinereo ad olivaceum inclinant. Guttur & collum inferius albicant. Pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus cooperientes rufi sunt coloris. Alarum remiges dorso concolores. (Verisimiliter ad latus interiorius sunt rufæ). Caudam componunt decem rectrices, quarum binæ intermediæ sunt cinereo-olivaceæ: laterales omnes nigrae, apicibus albis præditæ. Binæ intermediæ

qu'aux coins de la bouche a environ un pouce de long; sa queue sept pouces six lignes; son pied treize lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes, l'intérieur huit lignes; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes, & l'intérieur six lignes. Il a environ quinze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes brunes, douces comme de la soye. Le dessous du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un cendré tirant sur l'olivâtre. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches. La poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont roux. Les plumes de l'aîle sont de la même couleur que le dos. (Il est probable que leur côté intérieur est roux). La queue est composée de dix plumes: les deux du milieu sont d'un cendré tirant sur l'olivâtre: toutes les latérales sont noires, & terminées de blanc. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en

diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le demi-bec supérieur est noir, & l'inférieur est blancâtre. Les pieds sont d'un bleuâtre foncé ou noirâtre. On le trouve à la Jamaïque. Il se tient ordinairement dans les forêts & les buissons.

lateralium longitudinem excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque brevior. Mandibula superior nigra, inferior candidans. Pedes saturatè cœrulescentes sive ex cœrulescente nigricantes. Habitat in Jamaica. Sylvas & sepes frequentat.

** 5. LE COUCOU A LONG BEC DE LA JAMAÏQUE.

Voyez Pl. XVII. Fig. 2.

Cuculus superne cinereo-olivaceus, infernè rufus; genis & gutture dilutè fulvis; collo inferiore & pectore dilutè cinereis; rectricibus lateralibus in exortu cinereo-olivaceis, in medio nigris, apice albis.... CUCULUS JAMAICENSIS LONGIROSTER.

Cuculus major rostro longiore & magis recto. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 313. N°. LIII. hujus icon minimè accurata Tab. 258. fig. 2.

Cuculus Jamaicensis major. Klein. Avi. pag. 31. N°. 3.

Coucou, ou Cuculus cinereus rostro longiori. Feuillee Journ. des Obs. phys. pag. 416. (ed. 1725).

Picus, seu Pluvie Avis alia canescens Senex dicta, rostro longiore & rectiore. Raj. Syn. Avi. pag. 182. N°. 13.

Les Anglois de la Jamaïque l'appellent OLD-MAN, ou RAIN-BIRD. Sloane;

Il est un peu moins gros que notre Coucou. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces une ligne de long; sa queue huit pouces neuf lig-

Cuculo nostrati paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices cum linea una longum; cau-

da octo pollices & novem lineas; pes quindecim lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue quatuordecim lineas, intimus novem lineas; posticorum extimus undecim cum semi lineas, intimus septem cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum; alæ verò complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudæ tectrices sunt splendide cinereæ, ad olivaceum vergentes. Caput ad latera, scilicet infra oculos, & guttur dilutè fulva. Collum inferius & pectus dilutè cinerea. Venter, latera, crura, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes rufo tinguntur colore. Alarum componunt novemdecim remiges: decem primores sunt eleganter castaneæ, cinereo-olivaceo terminatæ: octo sequentes concolores; à primoribus tamen discrepant in eo quod cinereo-olivaceus color eò majus spatium occupet, in latere præsertim

nes; son pied quinze lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'intérieur neuf lignes; l'extérieur de ceux de derriere onze lignes & demie, & l'intérieur sept lignes & demie. Il a quatorze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, le couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un cendré brillant & tirant sur l'olive. Les côtés de la tête, au-dessous des yeux, & la gorge sont d'un fauve clair. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un cendré clair. Le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont roux. L'aile est composée de dix-neuf plumes: les dix premières sont d'un beau marron; & terminées de cendré tirant sur l'olive: les huit suivantes sont de la même couleur, avec cette différence cependant que le cendré occupe d'autant plus d'espace, sur-tout du côté extérieur, que la plume est plus proche du corps, de sorte que plus la plume est proche du corps, moins elle

a de marron : enfin la dix-neuvième est tout-à-fait d'un cendré tirant sur l'olive. La première plume de l'aîle est assez courte : la cinquième & la sixième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de dix plumes : les deux du milieu sont d'un cendré-brillant tirant sur l'olive, & terminées de noir : toutes les latérales sont à leur origine du même cendré tirant sur l'olive, ensuite elles sont noires, & terminées de blanc. Dans chacune de ces plumes le cendré occupe d'autant moins d'espace, & le noir en occupe d'autant plus, que la plume est plus extérieure. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte que les deux du milieu de trois pouces six lignes. Les paupières sont garnies de petits mammelons d'un rouge très-vif. Le bec & les ongles sont de couleur de corne ; & les pieds sont gris. On le trouve à *la Jamaïque* & à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

exteriore, quò remix fit corpori viciniore, ita ut quò magis remix fit corpori finitima, eò minus castaneo imbuatur : decima-nona tandem est penitus cinereo-olivacea. Remix prima breviuscula : quinta & sexta reliquas omnes longitudine superant. Decem rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ splendidè cinereo-olivaceæ, nigro terminatæ : laterales omnes in exortu eodem cinereo-olivaceo imbutæ, in medio nigræ, & apice albæ. In istis omnibus lateralibus rectricibus color cinereo-olivaceus eò minus, niger autem eò majus spatium occupat, quò rectrix fit exterior. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis trium pollicum & sex linearum longitudine cedentem. Palpebræ exiguis obsitæ sunt papillis vividissimè coccineis. Rostrum, unguesque corneo colore tincti ; pedes verò grisei. Habitat in *Jamaica*, & *Dominicensi Insula*, unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. Chervain*.

6. LE COUCOU DU MEXIQUE.

Cuculus superne fulvus, internè niger; collo inferiore & pectore cinereis; rectricibus fulvo-nigricantibus
CUCULUS MEXICANUS.

Avis ridibunda. *Euf. Nieremb. pag. 214.*

Avis ridibunda, seu Quapachtotl. *Willugh. Ornith. pag. 298.*

Quapachtotl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 49. cap. CLXXIX.*

Jonst. Avi. pag. 119.

Raj. Syn. Avi. pag. 174.

Charlet. Exer. pag. 117. N°. VII.

Charlet. Onomazt. pag. 112. N°. VII.

Les Mexiquains l'appellent QUAPACHTOTL. *Fern.*

Præcedentem crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sexdecim pollices explet. Cauda octo pollices longa. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superioresque caudæ rectrices fulvo tinguntur colore. Guttur, collum inferius & pectus sunt cinerea. Venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores nigri sunt coloris. Remiges dorso concolores. Caudam componunt decem rectrices fulvo-nigricantes. Oculi nigri sunt: ipsorum irides candidæ. Rostrum è cyaneo nigricat. Habitat in Mexico.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de seize pouces. Sa queue a huit pouces de long. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont fauves. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont cendrées. Le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont noirs. Les plumes de l'aile sont de la même couleur que le dos. La queue est composée de dix plumes d'un fauve noirâtre. Les yeux sont noirs: & leur iris est d'un beau blanc. Le bec est d'un bleu-noirâtre. On le trouve au Mexique.

** 7. LE COUCOU DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. VIII. Fig. 1.

Cuculus superne rufo-fuscescens , internè sordidè albus , colore obscuriore leviter transversim striatus ; vertice & collo superiore nigricantibus , scapis pennarum saturatoribus & lucidioribus ; uropygio fusco , colore dilutiorè transversim striato ; rectricibus nigricantibus CUCULUS SENEGALENSIS.

Il est un peu plus gros que les précédens. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles de dix pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long ; sa queue huit pouces ; son pied un pouce sept lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , seize lignes , l'intérieur onze lignes ; l'extérieur de ceux de derrière treize lignes , & l'intérieur un pouce ; ce qui est très-long proportionnellement au même doigt des autres especes de ce genre : mais l'ongle de ce dernier doigt a plus de cinq lignes de longueur , & est presque droit , comme celui du doigt de derrière des *Alouettes*. Il a un pied sept pouces neuf lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent pas

Præcedentium crassitiem paululum superat. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem quindecim pollices & tres lineas explet ; & ad extremos ungues decem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est ; cauda octo pollices ; pes unum pollicem & septem lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue sexdecim lineas , intimus undecim lineas ; posteriorum extimus tredecim lineas , intimus unum pollicem ; quæ quidem longitudo maxima , parâs digiti reliquarum hujus generis specierum longitudini comparata : unguis autem hujus supra dicti digiti quinque lineas & ultra longus est & subrectus , digiti postici *Alaudarum* unguis instar. Alis expansis ;

expansis, extremitates majorum remigum unius pedis septem pollicum & novem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Partes capitis & colli superiores vestiunt pennæ nigricantes, quarum scapi saturatiores sunt & lucidiores. Quæ caput ad latera sive genas, guttur, partem inferiorem & latera colli obtegunt, sordidè albescent, scapisque donantur lucidioribus & magis conspicuis. Dorsum & pennæ scapulares sunt rufescentes. Uropygium & superiores caudæ rectrices fuscæ, colore dilutiorè transversim striatæ. Pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ sordidè albæ, quæ attentè intuenti colore obscuriore transversim striatæ videntur. Inferiores caudæ rectrices concolores, tæniis tamen donantur transversis magis conspicuis. Pennæ alas subtus obtegentes ex albo rufescunt. Superiores alarum rectrices sunt rufæ. Remiges eodem imbutæ colore, attamen apice nonnihil fuscescentes. Decem rectricibus nigricantibus cauda conflatur. Binæ intermedia lateralium longitudinem pau-

Tom. IV.

tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont couvertes de plumes noirâtres, & dont la tige est d'une couleur plus foncée & brillante. Celles qui couvrent les côtés de la tête ou les joues, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col, sont d'un blanc sale, ayant aussi leurs tiges plus brillantes & plus apparentes. Le dos & les plumes scapulaires sont d'un roux rembruni. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun rayé transversalement d'une couleur plus claire. La poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un blanc sale, mais qui, lorsqu'on le regarde attentivement, paroît rayé transversalement d'une couleur plus obscure. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur, mais les rayures transversales sont plus apparentes. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un blanc-roussâtre. Celles du dessus sont rufes. Les plumes de l'aile sont de cette dernière couleur, mais leur bout est un peu rembruni. La queue est composée de dix plumes noirâtres. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de

Q

longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

lulūm excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Rostrum nigrum. Pedes unguēque griseo-fusci. Habitat in *Senegalenſi* regione, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Adanson*.

** 8. LE COUCOU DE CAYENNE.

Voyez *Pl. VIII. Fig. 2.*

Cuculus superne castaneo-purpurascens, infernè cinereus; collo inferiore dilutè castaneo-purpurascēte; reſtricibus castaneo-purpurascētibz, versùs apicē nigris, apicē albis CUCULUS CAYANENSIS.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue dix pouces une ligne; son pied quatorze lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce, l'intérieur huit lignes; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes, & l'intérieur cinq lignes & demie. Il a quinze pouces quatre lignes de vol; &

Crassitie *Merulam* circiter æquat. Ipsiuz longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & novem lineas explet, & ad extremos unguē octo pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuordecim lineas longum est; cauda decem pollices cum linea una; pes quatuordecim cum semi lineas; digitorum anticorum exterior cum ungue unum pollicem, interior octo lineas; posticorum extimus decem lineas, intimus quinque cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum

distantia est quindecim pollicum & quatuor linearum ; alæ verò complicatæ ad duos tantum pollices ultra caudæ exortum protenduntur. (Unum observavi in museo D. Mauduyt, qui istum nunc descriptum omnium ipsarum partium magnitudine nonnihil superabat). Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudæ tectrices sunt castaneo-purpurascens. Guttur & collum inferius eodem imbuuntur colore, sed multò dilutius. Pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ cineræ. Quæ caudam subtus obtegunt, inferioresque alarum tectrices concolores. Remiges sunt castaneo-purpurascens, apicibus fuscis præditæ, fusco colore eò majus spatium occupante, quò remix fit à corpore remotior. Caudam componunt decem tectrices castaneo-purpurascens, versùs apicem nigræ, apice albæ. Binæ intermediæ lateralium longitudinem excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis sex pollicum longitudine ce-

ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent que jusqu'à deux pouces au-delà de l'origine de la queue. (J'en ai vu un dans le cabinet de M. Mauduyt, qui étoit un peu plus grand dans toutes ses proportions que celui que je décris.) La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un marron-pourpré. La gorge & la partie inférieure du col sont de la même couleur, mais beaucoup plus claire. La poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont cendrés. Les plumes de l'aile sont d'un marron-pourpré, & terminées de brun, cette dernière couleur occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus éloignée du corps. La queue est composée de dix plumes d'un marron-pourpré, noires vers le bout, & terminées de blanc. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de six pouces que les deux du milieu. Le bec, les pieds & les ongles

font d'un gris-brun. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

dentem. Rostrum; pedes, unguisque griseo-fusci. Habitat in *Cayana*, unde in museum *Realmurianum* missus à *D. Artur*.

** 9. LE PETIT COUCOU DE CAYENNE;

Voyez Pl. XVI. Fig. 2.

Cuculus superne castaneo - purpurascens, infernè cinereo-fuscus; collo inferiore & pectore dilutè castaneo-purpurascens; rectricibus castaneo-purpurascens, apice albis . . . CUCULUS CAYANENSIS MINOR.

Il ressemble beaucoup au précédent; il n'en diffère presque que par la taille. Il est à peu près de la grosseur du *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue cinq pouces dix lignes; son pied onze lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes, l'intérieur sept lignes; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes & demie, & l'intérieur cinq lignes & demie. Il a onze pouces trois lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la

Præcedenti valdè similis est; ab illo enim non discrepat ferè nisi magnitudine: *Turdum Iliacum* crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda quinque pollices & decem lineas; pes undecim cum semi lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue undecim lineas, intimus septem lineas; posticorum extimus novem cum semi lineas, intimus quinque cum semi lineas. Alis expansis; extremitates majorum remi-

gum undecim pollicum & trium linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput, collum superius, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ rectrices sunt castaneo - purpurascens. Guttur, pars colli inferior & pectus eodem imbuuntur colore, sed dilutior. Ventrem, latera & crura vestiunt pennæ cinereo-fuscæ. Inferiores caudæ rectrices ex saturatè castaneo fuscescunt. Remiges sunt castaneo - purpurascens, fusco terminatæ; fuscus autem color eò majus spatium occupat, quò remix fit à corpore remotior. Cauda decem conflatur rectricibus castaneo - purpurascens, apice albis. Binæ intermediæ lateraliū longitudinem excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis duorum pollicum & octo linearum longitudine cedentem. Rostrum, pedes, unguisque griseo-fusci. Habitat in *Cayana*, unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. Artur.*

queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un marron-pourpré. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont de la même couleur, mais plus claire. Le ventre, les côtés & les jambes sont d'un cendré-brun. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un marron foncé & rembruni. Les plumes de l'aîle sont d'un marron-pourpré, & terminées de brun, cette dernière couleur occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus éloignée du corps. La queue est composée de dix plumes d'un marron-pourpré, & terminées de blanc. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de deux pouces huit lignes que les deux du milieu. Le bec, les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Arur.*

10. LE COUCOU D'ANDALOUSIE.

Cuculus superne saturatè fuscus, infernè fusco-rufescens; capite superiore cinereo-cœrulescente; latâ fasciâ per oculos nigrâ; alis superne albo & dilutè cinereo maculatis; rectricibus nigricantibus, lateralibus apice albis . . .
CUCULUS ANDALUSIÆ.

Cuculus Andalusiæ. Klein. Avi. pag. 30. N^o. 5.

Grand Coucou tacheté. Edwards. Tom. II. pag. LVII; avec une figure exacte Pl. 57.

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur d'une *Pic*. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes d'un cendré-bleu, très-douces au toucher, & assez longues pour former une espee de hupe. De chaque côté de la tête est une bande noire, plus étroite à ses extrémités que dans son milieu, qui part des coins de la bouche, & s'étend jusque vers l'occiput, en passant par les yeux. La partie supérieure du col, le dos, & le croupion sont d'un brun foncé. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur, & variées de petites taches blanches & d'un cendré très-clair. La gorge, la partie

Magnitudine & crassitie cum *Pica* circiter convenit. Alæ complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ cinereo-cœrulescentes, mollissimæ, & satis magnam longitudinem obtinentes ut cristam quodammodo efforment. In utroque capitis latere fascia extat nigra, in medio lata, in extremitatibus strictior, ab oris angulis orta, per oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Collum superius, dorsum & uropygium sunt saturatè fusca. Pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ rectrices eodem imbuuntur colore, quem variegant minutæ maculæ albæ & dilutissimè cinereæ. Guttur, collum inferius & ad latera, sicut &

pectus, fusco-rufescente fati-
tis lucido tinguntur. Ven-
trem, latera, crura & tec-
trices caudæ inferiores tin-
git idem color, sed obscu-
rior. Remiges alarum su-
perne fusco imbuuntur quàm
in dorso saturatiore sive ni-
gricant, subtus verò cine-
rascunt : minores insuper mi-
nutâ terminantur maculâ di-
lutissimè cinereâ. Caudam
componunt decem rectri-
ces, quarum binæ interme-
diæ nigricantes : laterales
omnes concolores, apicibus
albis præditæ, albore eò ma-
jus spatium occupante, quò
rectrix exterior fit. Binæ rec-
trices intermediæ lateralium
longitudinem excedunt; la-
terales autem gradatim lon-
gitudine minuuntur ad utrinq-
ue extremam usque brevior-
em. Rostrum, pedes, un-
guesque nigri. Habitat in
Andalusia.

inférieure & les côtés du col,
& la poitrine sont d'un brun-
roussâtre assez vif. Le ventre,
les côtés, les jambes & les
couvertures du dessous de la
queue sont de la même cou-
leur, mais plus obscure. Les
plumes de l'aile sont d'un brun
plus foncé que le dos ou noirâ-
tres en-dessus, & cendrées en-
dessous : les moyennes sont de
plus terminées par une petite
tache d'un cendré très-clair.
La queue est composée de dix
plumes : les deux du milieu sont
noirâtres : toutes les latérales
sont de la même couleur & ter-
minées de blanc, cette dernie-
re couleur occupant d'autant
plus d'espace, que la plume est
plus extérieure. Les deux plu-
mes du milieu de la queue sont
plus longues que les latérales,
qui vont toutes en diminuant
de longueur par degrés jusqu'à
la plus extérieure de chaque
côté, qui est la plus courte. Le
bec, les pieds & les ongles
sont noirs. On le trouve en *An-
dalouzie.*

** II. LE COUCOU TACHETÉ DE CAYENNE.

Voyez Pl. IX. Fig. 1.

Cuculus superne saturatè fuscus ; ad viride nonnihil inclinans,
rufo & rufescente variegatus, infernè albo-rufescens ; collo
inferiore rufescente, lineis transversis ad fuscum vergenti-

bus vario ; rectricibus griseo-fuscis , ad margines & apicem rufescentibus CUCULUS CAYANENSIS NÆVIUS.

Il est à peu près de la grosseur du *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces huit lignes , & jusqu'à celui des ongles de sept pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long ; sa queue cinq pouces dix lignes ; son pied quatorze lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , treize lignes & demie , l'intérieur neuf lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes , & l'intérieur huit lignes. Il a douze pouces trois lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Les plumes qui couvrent la partie supérieure de la tête , sont d'un brun foncé , & terminées par une tache roussâtre ; quelques-unes sont aussi bordées de roux. La partie supérieure du col est variée de brun foncé & de gris tirant sur le roux , le brun occupant le milieu de chaque plume. Le dos & le croupion sont de la même couleur , mais chaque plume est terminée par une tache roussâtre. Les couvertures du dessus de la queue ,

Turdum Iliacum crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & octo lineas explet ; & ad extremos ungues septem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est ; cauda quinque pollices & decem lineas ; pes quatuordecim lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue tredecim cum semi lineas , intimus novem cum semi lineas ; posticorum exterior decem lineas , interior octo lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & trium linearum ; alæ verò complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Partem capitis superiorem obtegunt pennæ saturatè fuscæ , maculâ rufescente terminatæ ; quarum quædam insuper marginibus rufis præditæ sunt. Collum superius saturatè fusco & griseo-rufescente variegatur , fusco scilicet cujuslibet pennæ medium occupante. Quæ dorsum

sum & uropygium vestiunt, iisdem sunt coloribus variæ, sed unaquæque maculâ rufescente terminatur. Superiores caudæ tectrices, pennæ alas superne cooperientes, sicut & scapulares, pennis dorfi concolores, marginibus insuper rufis præditæ. Guttur & collum inferius rufescunt, quæque tamen penna versùs apicem lineolâ transversâ ad fuscum vergente variegatur. Pectus, venter, latera, crura & tectrices alarum inferiores albescent, & aliquid rufescentis admixtum habent. Inferiores caudæ tectrices sunt dilutè rufæ. Alarum remiges griseo-fuscæ, oris exterioribus rufescentibus præditæ, & minutâ maculâ similiter rufescente terminatæ. Caudam componunt decem rectrices griseo-fuscæ, in utroque latere rufescente marginatæ, exiguâque maculâ concolore terminatæ. Binæ intermediae lateraliū longitudinem excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrumque extimam usque binis intermediis trium pollicum longitudine cedentem. Avis ista attentè observata & secundum quemdam ad lucem

Tom. IV.

celles du dessus des ailes & les plumes scapulaires sont de la même couleur que celles du dos, mais elles sont de plus bordées de roux. La gorge & la partie inférieure du col sont roussâtres, & chaque plume a vers le bout une petite ligne transversale tirant vers le brun. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous des ailes sont d'un blanc mêlé d'une légère teinte de roussâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un roux clair. Les plumes de l'aile sont d'un gris-brun; elles sont bordées extérieurement de roussâtre, & sont terminées par une petite tache de la même couleur. La queue est composée de dix plumes d'un gris-brun, bordées des deux côtés de roussâtre, & terminées par une petite tache de la même couleur. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degré jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de trois pouces que les deux du milieu. Lorsqu'on regarde cet Oiseau avec attention & dans un certain jour, il paroît avoir sur le dos, les ailes & la queue une légère teinte de verd: cette couleur est plus apparente sur le mi-

R

lieu des plumes latérales de la queue que par-tout ailleurs. Quelques-unes des couvertures du dessus de la queue sont très-longues, & s'étendent presque jusqu'aux deux tiers de sa longueur. Le demi-bec supérieur est noirâtre en-dessus, & ses côtés sont roux; l'inférieur est roussâtre. Les pieds sont cendrés; & les ongles d'un gris-brun. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

objectum, in dorso, alis & cauda aliquid viridis admixtum habere videtur: qui viror in medio lateralium rectricum magis est conspicuus quam in aliis prædictis partibus. Ex superioribus caudæ rectricibus quædam sunt longissimæ, & duas ferè tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Mandibula superior superne nigricans, ad latera rufa; inferior rufescens. Pedes cinerei; ungues verò griseo-fusci. Habitat in *Cayana*, unde in museum *D. Aubry* missus est.

** 12. LE COUCOU TACHETÉ DE MINDANAO.

Voyez Pl. XII. Fig. 1.

Cuculus superne fuscus, ad viridi-aureum vergens, maculis albis & rufescentibus variegatus, infernè albus, nigricante transversim striatus; collo inferiore fusco, maculis albis vario; rectricibus fuscis, ad viridi-aureum vergentibus, rufescente transversim striatis . . . CUCULUS MINDANENSIS NÆVIUS.

Il est beaucoup plus gros que notre *Coucou*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a

Cuculum nostratem crassitie multum antecellit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius

apice ad oris angulos quindecim lineas longum est ; cauda septem pollices ; pes quindecim lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & quinque lineas , intimus unum pollicem tantum ; posticorum extimus tredecim cum semi lineas , intimus septem lineas. Alis expansis , extremitates majorum remigum unius pedis septem pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad tertiam longitudinis caudæ partem usque protenduntur. Partes capitis & colli superiores , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , alas superne vestientes & superiores caudæ tectrices ex fusco ad viridi-aureum vergunt , & maculis asperguntur plerisque albis , aliis rufescentibus. Maculæ synciput variegantes longæ sunt , strictiores & rufescentes. Guttur & collum inferius fusca sunt , maculis albis varia. Pectus , venter , latera , crura , inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albescent , & nigricante transversim striantur. Remiges alarum sunt dorso concolores , in latere exteriori tæniis transversis albo-

quinze lignes de long ; sa queue sept pouces ; son pied quinze lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , un pouce cinq lignes , l'intérieur un pouce ; l'extérieur de ceux de derrière treize lignes & demie , & l'intérieur sept lignes. Il a un pied sept pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun tirant sur le verd-doré , tout parsemé de taches , dont la plupart sont blanches & les autres roussâtres. Les taches qui sont sur le synciput , sont longues , étroites & roussâtres. La gorge & la partie inférieure du col sont brunes , & tachetées de blanc. La poitrine , le ventre , les jambes , les couvertures du dessous de la queue , celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs , & rayés transversalement de noirâtre. Les plumes de l'aile sont de la même couleur que le dos , marquées du côté extérieur de bandes transversales d'un blanc - roussâtre & du côté intérieur de bandes transversales blanches. La

queue est composée de dix plumes d'un brun tirant sur le verd-doré brillant, & rayées transversalement de roussâtre : quelques-unes de ces plumes sont terminées de blanc. Le bec est d'un gris-brun. Les pieds & les ongles sont gris. On le trouve dans l'*Isle de Mindanao*, l'une des *Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

rufescentibus, in interiore taniis transversis albis insignita. Caudam componunt decem rectrices fuscae, ad viridi-aureum splendentem vergentes colorem, rufescente transversim striatae, quarum aliquot apicibus albis praeditae sunt. Rostrum griseo-fuscum. Pedes, unguesque grisei. Habitat in *Mindana Insula*, ex *Philippensibus* una, unde in museum *D. Aubry* missus est.

13. LE COUCOU TACHETÉ DE BENGALÉ.

Cuculus superne rufescens, infernè albus, superne & infernè marginibus pennarum fuscis, rufo in imo ventre admixto; rectricibus rufescentibus, taniis transversis fuscis, obliquè positis, utrinque striatis CUCULUS BENGALENSIS NÆVIUS.

Cuculus Bengalensis, ex fusco, rufo, & cinereo à capite ad caudam varius. *Klein. Avi. pag. 31. N^o. 7.*

Coucou brun & tacheté des Indes. *Edwards. Tom. II. pag. LIX; avec une figure exacte Pl. 59.*

Les Habitans de Bengale l'appellent, BOUGHTSALLICK. *Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur d'une *Grive*; mais il a le corps plus allongé & la queue beaucoup plus longue. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long ;

Crassitie Turdum circiter æmulatur ; sed corpore donatur magis elongato, & caudâ multò longiori. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim circiter pollices explet, & ad extremos ungues novem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas lon-

gum est ; cauda septem pollicis & sex lineas ; pes unum pollicem ; digitorum anteriorum extimus cum ungue tredecim lineas , intimus octo lineas ; posteriorum extimus undecim lineas , intimus sex lineas. Alæ complicatæ tertiam circiter longitudinis caudæ partem attingunt. Caput , partem colli superiorem , dorsum & uropygium vestiunt pennæ rufescentes , marginibus fuscis præditæ. Superiores caudæ rectrices concolores. Guttur , pars colli inferior , pectus , venter , latera , crura , inferioresque caudæ rectrices albescentes , marginibus pennarum , similiter ac in corpore superiore , fuscis : venter imus , crura & rectrices caudæ inferiores aliquid insuper rufi admixtum habent. Superiores alarum rectrices minores sunt candidæ , fusco fimbriatæ : majores dorso concolores. Remiges , sicut & scapulares pennæ , rufescentes & fusco transversim striatæ. Caudam componunt decem rectrices rufescentes , quas in utroque latere variegant latæ tæniæ transversæ fuscæ , obliquè positæ. Binæ rectrices intermediae lateralium longitudinem paululum ex-

sa queue sept pouces six lignes ; son pied un pouce ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , treize lignes , l'intérieur huit lignes ; l'extérieur de ceux de derrière onze lignes , & l'intérieur six lignes. Ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont roussâtres , chaque plume étant bordée de brun. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les jambes , les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs , chaque plume étant , comme dans le dessus du corps , bordée de brun : il y a aussi un peu de roux mêlé au bas-ventre , aux jambes & aux couvertures du dessous de la queue. Les petites couvertures du dessus des ailes sont blanches , & bordées de brun : les grandes sont de la même couleur que le dos. Les plumes de l'aile , ainsi que les scapulaires , sont rayées transversalement de roussâtre & de brun. La queue est composée de dix plumes roussâtres , variées des deux côtés de larges bandes transversales brunes , placées obliquement. Les deux du milieu sont

un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec & les pieds sont d'un jaune sale & verdâtre; & les ongles sont bruns. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*.

cedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Rostrum, pedesque ex sordide flavo viridescunt, ungues vero fusci. Habitat in *Bengalensi* Regno.

** 14. LE COUCOU TACHETÉ DES INDES.

Voyez Pl. X. Fig. 2.

Cuculus superne fusco-nigricans, maculis rufis variis, inferne rufus, fusco-nigricante transversim striatus; tæniâ infra oculos rufâ; rectricibus fusco-nigricantibus, tæniis transversis, arcuatis, rufis utrinque striatis, apice dilute rufis.
. . . . CUCULUS INDICUS NÆVIUS.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Pigeon Romain*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied quatre pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue huit pouces quatre lignes; son pied dix-sept lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'intérieur treize lignes; l'extérieur de ceux de derrière quinze lignes, & l'intérieur neuf

Cum *Columba Romana* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem quatuor pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues undecim pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda octo pollices & quatuor lineas; pes septemdecim lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & septem lineas, intimus trede-

cim lineas; posticorum exterior quindecim lineas, interior novem lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & undecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices sunt fusco-nigricantes, maculis rufis variæ. Pennæ caudam superne cooperientes ex fusco quoque nigricant, & rufo transversim striantur. In utroque capitis latere tænia extat rufa, ab exortu mandibulæ superioris orta, infra oculos ducta, & ad aures usque protensa. Guttur, colum inferius, pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes rufo tinguntur colore, exiguiusque tæniis transversis fusco-nigricantibus striantur. Alarum remiges sunt fusco-nigricantes, in utroque latere maculis transversis rufis variatæ. Caudam component decem rectrices similiter fusco-nigricantes, tæniis transversis rufis, arcum referentibus, in utroque latere

lignes. Il a un pied onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont d'un brun-noirâtre, varié de taches rousses. Les couvertures du dessus de la queue sont aussi d'un brun-noirâtre, rayé transversalement de roux. De chaque côté de la tête est une bande rouffe, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, passe par-dessous les yeux & s'étend jusqu'aux oreilles. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont roux, & rayés de petites bandes transversales d'un brun-noirâtre. Les plumes de l'aîle sont de cette dernière couleur, & variées sur chacune de leurs côtés de taches transversales rousses. La queue est composée de dix plumes d'un brun-noirâtre, variées de même des deux côtés de bandes transversales rousses, formant chacune un arc de cercle; & toutes ces plumes sont terminées de roux clair. Les deux du milieu sont un

peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est de couleur de corne. Les pieds sont d'un gris-brun; & les ongles noirâtres.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a moins de taches rousses sur la tête & le dessus du col; & que le roux du dessous de son corps est beaucoup plus clair.

On les trouve aux *Indes Orientales*, d'où ils ont été envoyés à *M. le Comte de Bentinck*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

striatæ; quæ omnes rectrices apicibus dilutè rufis præditæ sunt. Binæ intermediae lateraliū longitudinem paululū excedunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Rostrum corneo colore imbutum. Pedes griseo-fusci; ungues verò nigricantes.

Fœmina à *mare* discrepat capite & collo superiore maculis rufis rarioribus insignitis, & in eo quod color rufus in parte corporis inferiore multò sit dilutior.

Habitant in *India Orientali*, unde missi ad *D. Comitem de Bentinck*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

15. LE COUCOU TACHETÉ DE MALABAR;

Voyez Pl. XI. A. Fig. 2.

Cuculus superne cinereo-nigricans, maculis albis variis, infernè albus, maculis transversis cinereis variegatus; rectricibus nigricantibus, tæniis transversis albis utrinque striatis . . . CUCULUS MALABARICUS NÆVIUS.

Les Malabares l'appellent CUIL.

Je n'ai jamais vu cette espèce de *Coucou*. Je l'ai décrite & fait graver d'après un dessin fait sur l'Oiseau vivant par *M. Poivre*.

Hanc *Cuculi* speciem videre nondum mihi contigit. Ipsius descriptionem desumpti ex icone ad vivum depicta à *D. Poivre*; & sic eam æri insculptam esse curavi.

Cuculo.

Cuculo nostrati paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo à rostri apice ad caudam extremam undecim pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda quinque pollices & sex lineas; pes decem lineas; digitorum anticorum exterior cum ungue unum pollicem, interior decem lineas; posticorum extimus undecim lineas, intimus sex lineas. Alæ complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput, partem colli superiorem & dorsum vestiunt pennæ saturatè cinereæ sive cinereo-nigricantes, binis maculis albis, versùs ipsarum apicem positis, utrinque scilicet unâ variegatæ. Pennæ scapulares & superiores caudæ rectrices iisdem coloribus, eodemque modo variegantur. Uropygium, superioresque caudæ rectrices sunt quoque cinereo-nigricantes, & qualibet versùs apicem maculâ insignitur candidâ. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & rectrices cau-

Il n'est pas tout-à-fait si gros que notre Coucou. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ onze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue cinq pouces six lignes; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce, l'intérieur dix lignes; l'extérieur de ceux de derrière onze lignes, & l'intérieur six lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête, le dessus du col & le dos sont couverts de plumes d'un cendré foncé ou noirâtre, & variées chacune de deux taches blanches, placées vers leur bout, sçavoir une de chaque côté. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont variées de même & des mêmes couleurs. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont aussi d'un cendré-noirâtre, chaque plume étant marquée vers son bout d'une tache blanche. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du

dessous de la queue sont d'un blanc varié de taches transversales, cendrées. Les plumes de l'aile sont cendrées, & marquées de bandes transversales blanches. La queue est composée de dix plumes noirâtres, marquées aussi des deux côtés de bandes transversales blanches. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui sont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de deux pouces six lignes que les deux du milieu. L'iris des yeux est d'un orangé clair. Le bec, les pieds & les ongles sont d'un cendré clair. On le trouve sur la Côte de Malabar, où il est en vénération.

da inferiores albes, transversisque variegantur maculis cinereis. Remiges alarum cinereæ, fasciis transversis candidis insignitæ. Caudam componunt decem rectrices nigricantes, tæniis similiter transversis albis in utroque latere striatæ. Binæ intermedia lateralium longitudinem excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis duorum pollicum & sex linearum longitudine cedentem. Oculorum irides dilutæ aurantiæ. Rostrum, pedes, unguesque dilutæ cinerei. Habitat in *Malabaria*, ubi honores ipsi redduntur.

** 16. LE COUCOU DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XIII. Fig. 2.

Cuculus anteriùs nigricans, pennis secundùm scapum alborufescentibus, posteriùs nigro-virescens; remigibus castaneis, apice fuscis; rectricibus superne nigro-virescentibus, infernè nigris CUCULUS MADAGASCARIENSIS.

Les Habitans de Madagascar l'appellent TOULOU.

Il n'est guères plus gros qu'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces quatre lignes, & jusqu'à

Merulam crassitie non multùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices & quatuor

lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices cum quatuor lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda octo pollices cum linea una; pes unum pollicem & sex lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue quindecim lineas, intimus decem lineas; posticorum exterior quatuordecim cum semi lineas, interior quindecim lineas; quæ longitudo valdè magna, parvis digiti reliquarum hujus generis specierum longitudini comparata: unguis autem hujus suprà dicti digiti novem lineas longus est, & planè rectus, digiti postici *Alaudarum* unguis instar. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis, quatuor pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput, guttur, collum superius & partem dorsi superam vestiunt pennæ longiusculæ, strictæ, rigidæ, in medio secundum scapi longitudinem albo-rufescentes, in utroque latere nigricantes. Quæ guttur partem colli inferiorem & pectus

celui des ongles de neuf pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue huit pouces une ligne; son pied un pouce six lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'intérieur dix lignes; l'extérieur de ceux de derrière quatorze lignes & demie; & l'intérieur quinze lignes; ce qui est extrêmement long proportionnellement au même doigt des autres especes de ce genre: mais l'ongle de ce dernier doigt a neuf lignes de longueur, & est tout-à-fait droit, comme celui du doigt de derrière des *Alouettes*. Il a seize pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge & les parties supérieures du col & du dos sont couvertes de plumes longues, étroites, roides, d'un blanc-roussâtre dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & noirâtres sur les deux côtés. Celles qui couvrent la gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont variées des mêmes couleurs que les précédentes, avec cette différence cependant qu'elles n'ont de noirâtre qu'une bande longitudinale de

chaque côté. Elles sont aussi, comme elles, longues, roides & étroites. La partie inférieure du dos, le croupion, le ventre, les côtés, les jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un noir verd. Les plumes scapulaires, & les couvertures du dessus & du dessous des ailes sont d'un beau marron : les tiges de celles du dessus, ainsi que celles des plumes scapulaires, sont d'une couleur plus vive & comme pourprée. Les plumes de l'aile sont aussi d'un beau marron, & terminées de brun : cette dernière couleur s'étend un peu plus sur les moyennes plumes de l'aile les plus proches du corps. La queue est composée de dix plumes d'un noir-verd en-dessus, & tout-à-fait noires en-dessous. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Le bec est brun. Les pieds & les ongles sont noirs. Il mange des *Reptiles*. On le trouve à *Madagascar*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

cum. Pedes, unguesque nigri. *Reptilibus* vescitur. Habitat in *Madagascaria*, unde in *museum Realmurianum* allatus est à *D. Poivre*.

obtegunt, iisdem ac præcedentes coloribus variegantur ; ab illis tamen differunt in eo quod fasciâ tantum longitudinali nigricante in utroque latere donentur : quæ pennæ, sicut præcedentes, sunt longiusculæ, rigidæ, strictæ. Dorsum infimum, uropygium, venter, latera, crura, rectricesque caudæ superiores & inferiores ex nigro virescunt. Pennæ scapulares, quæque alas superne & infernè vestiunt, eleganti castaneo tinguntur : alarum autem superiorum rectricum, sicut & scapularium, scapi colore lucidiore & quasi purpurascente refulgent. Remiges sunt quæque eleganter castaneæ, apicibus fuscis præditæ : qui fuscus color in remigibus minoribus corpori finitimis paulò majus spatium occupat. Cauda decem constat rectricibus superne nigro-virescentibus, subtus penitus nigris. Intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt. Rostrum fus-

17. LE COUCOU NOIR DE BENGALE.

Cuculus niger, viridi & violaceo colore varians; remigibus interiùs & subtus penitùs nigris; rectricibus nigris, viridi & violaceo colore variantibus *CUCULUS BENGALENSIS NIGER*.

Cuculus ex cœrulescente niger, rostro flavo, pedibus brevibus sordidè luteis, Bengalenfis. *Klein. Avi. pag. 31. N^o. 6.*

Coucou noir des Indes. *Edwards. Tom. II. pag. LVIII; avec une figure exacte Pl. 58.*

Les Habitans de Bengale l'appellent CUKEEL. *Edwards.*

Cum *Merula* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem circiter pollices explet, & ad extremos ungues sex pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem lineas longum est; cauda quatuor pollices & tres lineas; pes septem lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue octo lineas, intimus sex lineas; posteriorum extimus septem lineas, intimus quatuor cum semi lineas. Alæ complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. In universo corpore, capite scilicet, gutture, collo, dorso, uropygio, pectore, ventre, lateribus, cruribus, pennis scapularibus, alas superne

Il est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue quatre pouces trois lignes; son pied sept lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, huit lignes, l'intérieur six lignes; l'extérieur de ceux de derrière sept lignes, & l'intérieur quatre lignes & demie. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. Tout son corps, savoir la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du

dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue, est d'un noir brillant & changeant, selon qu'il est exposé à différens jours, en un verd & un violet très-éclatants. Les plumes de l'aîle sont de la même couleur en-dessus du côté extérieur; leur côté intérieur, ainsi que tout le dessous, est tout-à-fait noir. La queue est composée de dix plumes d'un noir changeant en verd & en violet brillants. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un orangé vif : les bords du demi-bec supérieur ne sont pas droits, mais ondés. Les pieds sont d'un brun-rougeâtre; & les ongles noirâtres. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*.

& infernè cooperientibus, & rectricibus caudæ superioribus & inferioribus, est splendide niger, & pro vario quo lucis radii incidunt modo, viridi & violaceo splendidissimo colore varians. Remiges alarum superne in latere exteriori concolores, in interiori, sicut & subtus in utroque latere, penitus nigra. Caudam componunt decem rectrices nigrae, viridi & violaceo colore splendenti variantes. Binæ intermediae lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Rostrum vividè aurantium, mandibulae superioris marginibus non quidem rectis, sed undatis. Pedes fusco-rubescētes; ungues verò nigricantes. Habitat in *Bengalensi* Regno.

** 18. LE COUCOU NOIR DES INDES.

Voyez Pl. X. Fig. 1.

Cuculus niger, viridi colore varians; remigibus interiùs & subtus penitus nigris; rectricibus nigris, superne viridi, infernè violaceo colore variantibus . . . CUCULUS INDICUS NIGER.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Pigeon*. Sa longueur *Columbam* crassitie circiter æquat. Ipsiùs longitudo

ab apice rostri ad caudam extremam sexdecim pollices explet, & ad extremos ungues undecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda octo pollices; pes unum pollicem & quinque lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & septem lineas, intimus tredecim lineas; posticorum exterior sexdecim lineas, interior novem lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & undecim pollicum; alæ verò complicatæ mediam longitudinem caudæ pertinent. Per universum corpus, caput scilicet, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera, crura, scapulares pennas, caudam superne & infernè vestientes, alarumque tectrices superiores & inferiores, est splendidè niger, viridi colore varians. Remiges superne in latere exteriori concolores, in interiori verò, sicut & subtus utrinque, penitus nigræ. Cauda decem constat rectricibus nigris, superne viridi, infernè violaceo colore variantibus. Rostrum, pedesque griseo-fusci;

depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied quatre pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue huit pouces; son pied un pouce cinq lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'intérieur treize lignes; l'extérieur de ceux de derrière seize lignes, & l'intérieur neuf lignes. Il a un pied onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps, sçavoir la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessus & du dessous des aîles, est d'un noir brillant & changeant en verd. Les plumes de l'aîle sont de la même couleur en-dessus du côté extérieur, mais leur côté intérieur, ainsi que tout le dessous, est tout-à-fait noir. La queue est composée de dix plumes d'un noir changeant en verd en-dessus, & d'un noir tirant sur le violet en-dessous. Le bec & les pieds sont d'un gris-brun; &

les ongles sont noirâtres. On le trouve aux *Indes Orientales*, d'où il a été envoyé à *M. le Comte de Bentinck*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

ungues verò nigricantes. Habitat in *India Orientali*, unde missus ad *D. Comitem de Bentinck*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

19. LE COUCOU HUPÉ DU BRÉSIL.

Cuculus cristatus, ex albo pallidè flavescent; cristâ, capite; collo & rectricibus alarum superioribus fusco & flavescente variegatis; rectricibus fuscis, apice albis . . . CUCULUS BRASILIENSIS CRISTATUS.

Guira Acangatara. Pison. Hist. Nat. pag. 95, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.

Guira Acangatara Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 216, in qua hujus icon non satis accurata.

Jonst. Avi. pag. 148. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 60.

Guira Acangatara Brasiliensibus Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 96. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XXII.

Guira Acangatara Brasiliensium Marcgravii. Raj. Syn. Avi. pag. 45. N^o. 5.

Trogon. Moehr. Avi. Gen. 114.

Les Brasiiliens l'appellent GUIRA ACANGATARA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Il est à peu près de la grosseur d'une *Pie*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue huit pouces; son pied un pouce six lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'intérieur un pouce; l'extérieur de

Crassitie Picam æmulatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quatuordecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda octo pollices; pes unum pollicem & sex lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue quindecim lineas,

neas, intimus unum pollicem; posticorum extimus quatuordecim lineas, intimus sex lineas. Totum caput pennis vestitur in medio secundum scapi longitudinem fuscis, ad latera flavescens. Guttur & collum obtegunt pennæ à contrario in medio flavescens & ad latera fusca. Superiores alarum rectrices concolores. Dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ alas subtus obtegentes ex albo pallide flavescunt. Pennæ capitulis verticem cooperientes reliquis sunt longiores, & cristam efficiunt. Remiges alarum fusca. Caudam componunt decem rectrices eodem fusco imbutæ, apicibus albis præditæ. Oculorum irides fusca. Rostrum obscure flavescens. Pedes thalassini coloris. Habitat in *Brasilia*, in cujus silvis ingentem excitat clamorem.

ceux de derrière quatorze lignes, & l'intérieur six lignes. Toute la tête est couverte de plumes brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & jaunâtres sur leurs côtés. Au contraire celles qui couvrent la gorge & le col, sont jaunâtres dans leur milieu & brunes sur les côtés. Les couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur. Le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des ailes sont d'un blanc tirant sur le jaune pâle. Les plumes du sommet de la tête sont plus longues que les autres & forment une huppe. Celles de l'aile sont brunes. La queue est composée de dix plumes de la même couleur, & terminées de blanc. L'iris des yeux est d'une couleur brune. Le bec est d'un jaunâtre sombre. Les pieds sont d'un verd de mer. On le trouve au *Brésil* dans les bois, où il fait un bruit horrible.

20. LE COUCOU CORNU DU BRÉSIL.

Cuculus cristatus, superne fuliginus, infernè cinereus; cristâ bifurcâ; rectricibus saturatè fuliginis, apice albis . . .

CUCULUS BRASILIENSIS CORNUTUS.

Tom. IV,

T

Atingacu Camucu Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 216, in qua hujus icon non satis accurata.*

Jonst. Avi. pag. 148. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 60.

Atinga guacu mucu Brasiliensibus Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.*

146. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XXXVIII.

Raj. Syn. Avi. pag. 165. N°. 2.

Les Brasiliens l'appellent ATINGACU CAMUCU. Marcgr. Jonst.

Il approche de la grosseur d'une *Litorne*. Il a la tête assez grosse, le bec un peu crochu, le col d'une longueur mediocre. Son corps a trois pouces de long; & sa queue neuf pouces. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'une couleur de suie. Il a sur la tête de longues plumes, qui forment une hupe ressemblante à des cornes, qu'il peut relever quand il veut. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont cendrés. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur. Les plumes de l'aîle sont de couleur de suie. La queue est composée de dix plumes de la même couleur, mais plus foncée, & terminées de blanc. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui

Cum *Turdela* magnitudine ferè convenit. Caput habet satis crassum, rostrum non-nihil aduncum, collum mediocris longitudinis, corpus tres pollices longum, caudam novem pollices. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne obtegunt, superioresque caudæ rectrices fuliginei sunt coloris. In capite longiusculas habet pennas cristam efficientes, quasque, duorum cornuum instar, potest surrigere. Gut-tur, collum inferius, pectus, venter, latera & crura pennis vestiuntur cinereis. Inferiores caudæ rectrices concolores. Remiges alarum sunt fuliginæ. Caudam componunt decem rectrices eodem imbutæ colore, sed saturatiore, & apicibus albis præditæ. Binæ intermediae lateralium longitudinem excedunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Oculorum

pupilla nigra; ipforum irides sanguineæ. Rostrum ex viridi & flavo mixtum. Pedes, unguesque cinerei. Habitat in *Brasília*.

est la plus courte. La prunelle de l'œil est noire; son iris est d'un rouge de sang. Le bec est d'une couleur mêlée de verd & de jaune. Les pieds & les ongles sont cendrés. On le trouve au *Brésil*.

21. LE COUCOU HUPÉ DE COROMANDEL.

Voyez Pl. XI. A. Fig. 1.

Cuculus cristatus, superne nigricans, infernè albus; maculâ ponè oculos rotundâ griseâ; collo superiore torque albo cincto; remigibus majoribus rufis; rectricibus nigricantibus CUCULUS COROMANDELANENSIS CRISTATUS.

Speciem istam nondum mihi videre contigit. Ipsius descriptionem desumpsi ab icone ad vivum depicta à *D. Poivre*; & sic eam æri insculptam esse curavi.

Crassitie *Turdum Iliacum* non antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & tres circiter lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda sex pollices cum novem lineis; pes decem lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue undecim lineas, intimus no-

Je n'ai jamais vu cette espece. Je l'ai décrite & fait graver d'après un dessin fait sur l'Oiseau vivant par *M. Poivre*.

Il n'est pas plus gros que le *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ douze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue six pouces neuf lignes; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle; onze lignes, l'intérieur neuf lignes; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes, & l'inté-

rieur cinq lignes & demie. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent que jusqu'à quinze lignes au-delà de l'origine de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres. Les plumes du sommet de la tête sont plus longues que les autres & forment une jolie huppe. De chaque côté de la tête est une petite tache ronde grise, placée derrière l'œil. La partie supérieure du col est entourée d'un collier blanc, d'environ trois lignes de largeur. La gorge & les jambes sont noirâtres. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont noirâtres dans leur milieu, & bordées de roux; cependant les grandes couvertures les plus éloignées du corps sont tout-à-fait rousses. Les grandes plumes de l'aile sont de la même couleur: les moyennes sont noirâtres dans leur milieu, & ont de larges bordures rousses. La queue est composée de dix plumes noirâtres. Les deux du milieu sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de lon-

vem lineas; posticorum extimus decem lineas, intimus quinque cum semi lineas. Alæ complicatæ ad quindecim tantum linearum distantiam ultra caudæ extimum potenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium; superioresque caudæ rectrices nigricant. Pennæ summum caput vestientes reliquas longitudine superant, elegantemque cristam efficiunt. In utroque capitis latere exigua extat macula rotunda grisea, pone oculum posita. Torquis albus, tres circiter lineas latus, collum superius cingit. Guttur & crura sunt nigricantia. Pars colli inferior; pectus, venter, latera, inferioresque caudæ rectrices alben. Pennæ scapulares, & superiores alarum rectrices sunt in medio nigricantes, rufo marginatæ; ex his tamen excipiendæ sunt majores alarum rectrices à corpore remotiores penitus rufæ. Remiges majores concolores: minores in medio nigricantes, latisque donantur marginibus rufis. Decem rectricibus nigricantibus cauda conflatur. Binæ intermedia lateralium longitudinem multum excedunt; laterales

verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque brevior. Oculorum irides flavicantes. Rostrum, unguisque saturatè cinerei; pedes verò dilutè cinerei. Habitat in *Coromandelâ*.
 gueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est jaunâtre. Le bec & les ongles sont d'un cendré foncé; & les pieds sont d'un cendré clair. On le trouve sur la *Côte de Coromandel*.

**** 22. LE COUCOU HUPÉ DE MADAGASCAR.**

Voyez Pl. XII. Fig. 2.

Cuculus cristatus, superne cinereo-virescens, infernè alborufescens; gutture cinereo; collo inferiore & pectore vinaceis; rectricibus superne dilutè viridibus, cœruleo & violaceo colore variantibus, lateralibus apice albis
CUCULUS. MADAGASCARIENSIS CRISTATUS.

Les Habitans de Madagascar l'appellent COUA.

Ad *Garruli* crassitiem accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices explet, & ad extremos ungues decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda septem pollices; pes unum pollicem cum septem lineis; digitorum anticorum exterior cum ungue quindecim lineas, interior novem cum semi lineas, posticorum extimus unum pollicem, intimus oc-

Il approche de la grosseur d'un *Geay*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue sept pouces; son pied un pouce sept lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'intérieur neuf lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière un pouce, & l'intérieur huit lignes. Il a un pied cinq pouces de vol; & ses

aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent que jusqu'à un pouce six lignes au-delà de l'origine de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un fort joli cendré tirant sur le verd. Les plumes du sommet de la tête sont plus longues que les autres, & forment une petite hupe. La gorge & la partie inférieure du col, qui en est la plus voisine, sont cendrées. Le reste du dessous du col & la poitrine sont d'une couleur vineuse. Le ventre & les côtés sont d'un blanc mêlé d'une très-légère teinte de roussâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-roussâtre. Les jambes sont d'un blanc, qui, regardé attentivement, paroît rayé transversalement de cendré clair. Les plumes de l'aîle sont cendrées en-dessous, mais en-dessus elles sont d'un verd clair, changeant en bleu & en violet très-éclatants. La queue est composée de dix plumes : les deux du milieu sont dessus & dessous d'un verd clair, changeant en bleu & en violet très-éclatants : toutes les latérales sont en-dessus de la même couleur, mais en-dessous

to lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & quinque pollicum; alæ verò complicatæ ad unius pollicis & sex tantum linearum distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ tectrices ex elegantissimo cinereo virescunt. Pennæ summum caput vestientes reliquas longitudine superant, exiguanque cristam efformant. Guttur & pars colli inferior ipsi finitima sunt cinereæ. Colli inferioris reliqua pars & pectus vinaceo colore tinguntur. Venter & latera albicant, & aliquid rufescentis admixtum habent. Inferiores caudæ tectrices ex albo rufescunt. Crura alba sunt, sed attentè intuenti dilutè cinereo transversim striata videntur. Alarum remiges subtus cinereæ, superne vero dilutè virides, cœruleo & violaceo colore splendidissimo variantes. Caudam componunt decem rectrices, quarum binæ intermedix superne & infernè dilutè virides, splendidissimo cœruleo & violaceo co-

lore variantes : laterales omnes superne concolores, subtus verò cinereæ, cœruleo & violaceo colore variantes; laterales insuper apicibus donantur albis. Binæ rectrices intermedia lateraliū longitudinem paululū excedunt. Rostrum, pedes, unguisque nigri. Habitat in *Madagascaria*, unde in *musæum Realmurianum* allatus est à *D. Poivre*.

elles sont d'un cendré changeant en bleu & en violet; de plus elles sont terminées de blanc. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *Madagascar*, d'où il a été apporté à *M. de Réaumur* par *M. Poivre*.

23. LE COUCOU VERT HUPÉ DE SIAM.

Voyez Pl. XIV. A. Fig. 1.

Cuculus cristatus, in toto corpore obscurè viridis; rectrice utrinque extimâ longissimâ, pinnulis in apice tantum præditâ *CUCULUS SIAMENSIS CRISTATUS VIRIDIS.*

Hanc speciem nondum mihi videre contigit. Ipsius descriptionem desumpsi ab icone ad vivum depicta à *D. Poivre*; & sic eam æri insculptam esse curavi.

Je n'ai jamais vu cette espèce. Je l'ai décrite & fait graver d'après un dessin fait sur l'Oiseau vivant par *M. Poivre*.

Præcedentem paululū crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & quinque circiter pollices explet, & ad extremos ungues octo pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuordecim lineas longum est;

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue dix pouces neuf lignes;

son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes, l'intérieur neuf lignes; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes, & l'intérieur cinq lignes & demie. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent que jusqu'à un pouce huit lignes au-delà de l'origine de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un verd obscur. Les plumes des ailes, leurs couvertures & les plumes de la queue sont de la même couleur. Celles du sommet de la tête sont un peu plus longues que les autres, & forment une petite hupe. La plume de la queue la plus extérieure de chaque côté est plus longue que les autres de cinq pouces neuf lignes, & n'a de barbes qu'à son extrémité dans l'espace d'environ trois pouces. L'iris des yeux est d'un beau bleu. Le bec est noirâtre. Les pieds & les ongles sont gris. On le trouve dans le Royaume de *Siam*.

cauda decem pollices cum novem lineis; pes decem lineas; digitorum anticorum exterior cum ungue undecim lineas, interior novem lineas; posticorum extimus decem lineas, intimus quinque cum semi lineas. Ala complicata ad unius pollicis & octo tantum linearum distantiam ultra caudæ exitum protenduntur. Per univsum corpus pennis vestitur obscurè viridibus. Alarum remiges, ipsarum rectrices & caudæ rectrices concolores. Pennæ summum caput cooperientes reliquas longitudine paululum antecellunt, exiguamque cristam efformant. Caudæ rectrix utrinque extrema alias rectrices quinque pollicum & novem linearum longitudine excedit, & pinnulis in apice tantum prædita est, idque per trium circiter pollicum spatium. Oculorum irides eleganti cœruleo tinguntur. Rostrum nigricat. Pedes, unguesque sunt grisei. Habitat in *Siamensi* Regno.

24. LE COUCOU VERD HUPÉ DE GUINÉE.

Cuculus cristatus, saturatè viridis; dorso infimo & uropygio purpureo-cœrulescentibus; imo ventre nigricante; latâ fasciâ

fasciâ per oculos nigrâ ; taniis supra & infra oculos candidis ; remigibus quatuor primoribus coccineis , exterius & apice nigro marginatis ; rectricibus purpureo-cœrulescentibus CUCULUS GUINEENSIS CRISTATUS VIRIDIS.

Cuculo adfinis. *Moehr. Avi. Gen.* 106.

Tauraco ; Regia Avis. *Klein. Avi. pag.* 36.

Touraco. *Edwards. Tom. I. pag. VII ; avec une assez bonne figure Pl. 7.*

Oiseau huppé , ou couronné du Mexique. *Alb. Tom. II. pag. 12 ; avec une figure mal coloriée Pl. 19.*

Les Anglois l'appellent CROWN BIRD FROM MEXICO. Alb.

Cum *Pica* crassitie circiter convenit. Rostrum habet breviusculum. Alæ complicatæ ad quartam circiter longitudinis caudæ partem usque protenduntur. Caput , guttur , collum , dorsum superius , pectus , ventrisque & laterum partes supremas vestiunt pennæ mollissimæ , saturatè virides. Superiores alarum rectrices minores eodem imbuuntur colore. Pennæ summum caput obtegentes reliquis sunt longiores , efficiuntque cristam , quam Avis ad libitum erigere aut componere potest. Pennæ quibus crista conflatur , rubro terminantur. In utroque capitis latere fascia extat nigra , in medio lata , in extremitatibus strictior , ab oris angulis orta , per oculos ducta , & versùs occipitium usque protensa. Supra , sicut & infra , quam fasciam ni-

Tom. IV.

Il est à peu près de la grosseur d'une *Pie*. Son bec est assez court. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'au quart de la longueur de la queue. La tête , la gorge , le col , la partie supérieure du dos , la poitrine , le haut du ventre & des côtés sont couverts de plumes très-douces au toucher & d'un verd foncé. Les petites couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur. Les plumes du sommet de la tête sont plus longues que les autres , & forment une huppe , que l'Oiseau peut redresser ou abaisser à volonté. Les plumes qui composent cette huppe sont terminées de rouge. De chaque côté de la tête est une bande noire , plus étroite à ses extrémités que dans son milieu , qui part des coins de la bouche , & s'étend jusque vers l'occiput , en passant par les yeux. Au-dessus & au-dessous de cette bande

noire sont des bandes blanches fort étroites, dont la supérieure part de la b  se du demi-bec sup  rieur, & s'  tend au dessus des yeux; & l'inf  rieure commence au-dessous de l'  il, & s'  tend jusque vers l'occiput. La partie inf  rieure du dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, les grandes du dessus des a  les & les plumes scapulaires sont d'un pourpre-bleu  tre. Le bas-ventre, le bas des c  t  s, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont noir  tres. Les quatre premieres plumes de l'a  le sont d'un rouge tr  s-vif, & bord  es de noir ext  rieurement &    leur bout: toutes les autres sont de la m  me couleur que la partie inf  rieure du dos & le croupion. Les plumes qui composent la queue, sont aussi d'un pourpre-bleu  tre. Les yeux sont d'un brun tirant sur la couleur de noisette. Les paupieres sont d'un tr  s-beau rouge vif. Le bec est d'un brun-rouge  tre. Les pieds & les ongles sont cendr  s. On le trouve en *Guin  e*.

gram tani   extant strictissim   candid  , quarum superior    basi mandibul   superioris orta est, & supra oculos ducta; inferior ver   infra oculum oritur, & versus occipitium usque tenditur. Dorsum infimum, uropygium, penn   caudam superne cooperientes, scapulares & t  ctrices alarum superiores majores sunt purpureo-c  rulescentes. Venter imus, laterum infima pars, crura, inferioresque caud   t  ctrices nigricant. Quatuor primores alarum remiges sunt vividissim   coccine  , exteri  s & apice nigro marginat  : reliqu   omnes eodem imbuuntur colore ac dorsum infimum & uropygium ipsa tinguntur. Caudam componunt t  ctrices similiter purpureo-c  rulescentes. Oculi ex fusco ad avellaneum colorem vergunt. Palpebr   elegantissim   coccine  . Rostrum fusco-rubescens. Pedes, unguisque cinerei. Habitat in *Guinea*.

25. LE COUCOU ROUGE HUP   DU BR  SIL.

Cuculus cristatus, ruber, superne saturati  s, infern   diluti  s; flavo varius; crist   saturat   rubr  , nigro variegat  ; remigibus, t  ctricibusque flavis, nigricante adumbratis
CUCULUS BRASILIENSIS CRISTATUS RUBER.

Cuculus Brasiliensis, venustissimè pictus. Seb. Vol. I. pag. 102. hujus icon accurata Tab. LXVI. fig. 2.

Columbæ adfinis. Moehr. Avi. Gen. 103.

Præcedenti crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem circiter pollices æquat, & ad extremos ungues septem pollices & tres lineas. Rostrum nonnihil aduncum, ab ipsius apice ad oris angulos usque sex lineas longum; cauda quatuor pollices & novem lineas; pes octo lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue undecim lineas, intimus novem lineas; posticorum extimus decem lineas, intimus sex lineas. Alæ complicatæ mediam circiter longitudinem caudæ pertingunt. Caput dilutè rubet, & cristâ ornatur saturatiùs rubrà, ex nigro variegatâ. Pars colli superior, dorsum, uropygium & tectrices caudæ superiores sunt saturatè rubræ. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ tectrices rubedine quidem tinguntur, sed dilutiorè, ventrisque ruborem nonnullæ distinguunt plumulæ flaventes. Superiores alarum tectrices dilutè quoque rubent, & flavo variegantur.

Il n'est pas si gros que le précédent. Sa longueur, depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces trois lignes. Son bec est un peu crochu, & a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche six lignes de long; sa queue quatre pouces neuf lignes; son pied huit lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes, l'intérieur neuf lignes; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes, & l'intérieur six lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête est d'un rouge clair, & ornée d'une huppe d'un rouge plus foncé, varié de noir. La partie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un rouge foncé. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un rouge plus clair. Le ventre est varié de quelques plumes jaunes. Les couvertures du dessus des aîles sont pareillement d'un rouge clair varié de jaune. Les

plumes de l'aîle, ainsi que celles de la queue, sont d'un jaune nuancé de noirâtre. Le bec est d'un rouge clair. On le trouve au *Brésil*.

tur. Remiges, sicut & rectrices, flavæ, nigricante adumbratæ. Rostrum dilutè rubrum. Habitat in *Brasilia*.

** 26. LE COUCOU BLEU DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XIII. Fig. 1.

Cuculus cœruleus; remigibus viridi & violaceo, rectricibus violaceo colore variantibus *CUCULUS MADAGASCARIENSIS CÆRULEUS*.

Les Habitans de Madagascar l'appellent TAIT-SOU.

Il est à peu près de la grosseur de *notre Coucou*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied seulement. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue neuf pouces; son pied deux pouces; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce six lignes, l'intérieur onze lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière quatorze lignes & demie, & l'intérieur dix lignes. Il a un pied sept pouces neuf lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Tout son corps, sçavoir la tête, la gorge, le col, le dos,

Cuculum nostratem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & quinque pollices æquat, & ad extremos unguis unum pedem tantum. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda novem pollices; pes duos pollices; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & sex lineas, intimus undecim cum semi lineas; posteriorum exterior quatuordecim cum semi lineas, interior decem lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis septem pollicum & novem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad ter-

tiam longitudinis caudæ partem extenduntur. In universo corpore, capite scilicet, gutture, collo, dorso, uropygio, pectore, ventre, lateribus, cruribus, rectricibus caudæ superioribus & inferioribus, pennis alas superne & inferne cooperientibus, sicut & scapularibus, eleganti cœruleo tingitur. Remiges alarum eodem imbuuntur cœruleo, sed viridi & violaceo colore splendidissimo variant. Caudam componunt decem rectrices eleganter cœruleæ, splendidissimo violaceo colore variantes. Binæ intermediae lateraliū longitudinem nonnihil excedunt. Rostrum, pedes, unguisque nigri. Habitat in *Madagascaria*, unde in *musæum Realmurianum* allatus est à *D. Poivre*.

le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessus & du dessous des ailes, & les plumes scapulaires, est d'un beau bleu. Les plumes de l'aile sont de ce même bleu, mais qui change en verd & en violet très - éclatants. La queue est composée de dix plumes d'un beau bleu changeant en violet très - éclatant. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *Madagascar*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

27. LE COUCOU BLEU DE LA CHINE.

Voyez Pl. XIV. A. Fig. 2.

Cuculus superne splendide cœruleus, inferne niveus; uropygio dilute cœruleo; capite nigricante; vertice albo, minutis maculis cœruleis vario; maculâ rotundâ pone oculos candidâ; rectricibus splendide cœruleis, maculâ ovatâ niveâ apice notatis . . . CUCULUS SINENSIS CÆRULEUS.

Les Chinois l'appellent SAN-HIA.

Speciem istam nondum mihi videre contigit. Ipsius descriptionem desumpsi ab

Je n'ai jamais vu cette espèce. Je l'ai décrite & fait graver d'après un dessin fait à

la Chine, sur l'Oiseau vivant par M. Poivre.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ treize pouces, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces neuf lignes: Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue sept pouces six lignes; son pied dix lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes, l'intérieur neuf lignes; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes, & l'intérieur cinq lignes & demie. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. Le sommet de la tête est d'un beau blanc, varié de petites taches bleues. Tout le reste de la tête & la gorge sont noirâtres: cette couleur descend en pointe sur la partie inférieure du col. De chaque côté de la tête est une tache ronde blanche, placée derrière l'œil. La partie supérieure du col, le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont du bleu le plus éclatant; il faut cependant excepter les grandes couvertures du dessus des aîles les plus éloignées du corps, qui

icone in *Sina* ad vivum depicta à D. Poivre; & sic eam æri insculptam esse curavi.

Merulam crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim circiter pollices explet, & ad extremos ungues septem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda septem pollices & sex lineas; pes decem cum semi lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue undecim lineas, intimus novem lineas; posticorum exterior decem lineas, interior quinque cum semi lineas. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Summum caput albore nitet, minutisque variegatur maculis cœruleis. Totum reliquum caput & guttur nigricant: color autem nigricans super inferiorem colli partem in acumen protenditur. In utroque capitis latere macula extat rotunda candida, ponè oculum posita. Pars colli superior, dorsum, pennæ scapulares & superiores alarum testrices splendidissimi cœrulei sunt coloris, exceptis tamen superioribus alarum testrici-

bus majoribus à corpore remotioribus albis. Uropygium dilutissimo tingitur cœruleo. Superiores caudæ rectrices eodem imbuuntur cœruleo ac dorsum ipsum tingitur, & ex istis quælibet majusculâ maculâ ovatâ niveâ versùs apicem insignitur. Collum inferius & ad latera, pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices niveo candore nitent. Alarum remiges majores sunt ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque dilutissimè cœruleæ, à medietate ad apicem eodem ac dorsum cœruleo imbutæ: minores quoque dorso concolores. Caudam componunt decem rectrices splendidissimè cœruleæ, majusculâ maculâ ovatâ niveâ versùs ipsarum apicem notatæ. Binæ intermediæ utrinque proximè sequentem trium pollicum & totidem linearum longitudine excedunt: laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque unum pollicem & novem tantum lineas longam. Oculorum irides rubræ. Mandibulæ superioris basis quibusdam obfita est plumulis rigidis, pili-formibus, antrorsum versis.

sont blanches. Le croupion est d'un bleu très-clair. Les couvertures du dessus de la queue sont du même bleu que le dos, & marquées chacune vers leur bout d'une grande tache ovale blanche. La partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc de neige. Les grandes plumes de l'aile sont d'un bleu très-clair depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; & de-là jusqu'à leur bout elles sont du même bleu que le dos: les moyennes sont de cette dernière couleur. La queue est composée de dix plumes du bleu le plus éclatant, & marquées chacune vers leur bout d'une grande tache ovale blanche. Les deux du milieu sont plus longues de trois pouces trois lignes que celle qui les suit immédiatement de chaque côté: & toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui n'a qu'un pouce neuf lignes de long. L'iris des yeux est rouge. La bête du demi-bec supérieur est garnie de quelques plumes roides, en forme de poils & tournées en-devant. Le bec, les pieds & les ongles sont rouges. On le

trouve à la Chine.

Rostrium, pedes, unguesque
rubent. Habitat in Sina.

** 28. LE GRAND COUCOU DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XV. le mâle Fig. 1, & la femelle Fig. 2.

Cuculus superne viridis, cupri puri colore varians, infernè cinereo-albus; vertice nigricante, viridi & cupri puri colore variante; capite & collo cinereis; lineolâ utrinque rostrum inter & oculos nigrâ; reëtricihus superne viridibus, cupri puri colore variantibus, subtus nigris. (*Mas*).

Cuculus superne fuscus, infernè rufescens, maculis nigricantibus varius; capite, gutture & collo superiore fusco & rufo transversim striatis; reëtricihus superne splendide fuscis, apice rufis, subtus cinereis. (*Fœmina*).... CUCULUS MADAGASCARIENSIS MAJOR.

Les Madagascariens appellent le mâle VOUROUG-DRIOU; & la femelle; CROMB.

Le mâle est environ de la grosseur d'un Pigeon Romain. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouce a deux pouces de long; sa queue sept pouces; son pied quinze lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes & demie, l'intérieur un pouce; l'extérieur de ceux de derriere treize lignes, & l'intérieur six lignes. Il a deux pieds un pouce huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jus-

Mas crassitie *Columbam Romanam* circiter æmulatur. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices æquat, & ad extremos ungues undecim pollices. Rostrium ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices longum est; cauda septem pollices; pes quindecim lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & quinque cum semi lineas, intimus unum pollicem tantum; posticorum extimus tredecim lineas, intimus sex lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum

duorum pedum unius pollicis & octo linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ duas circiter tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Caput, vertice excepto, guttur & collum sunt cinerea. Capitis vertex nigricat, & pro vario quo lucis radii incidunt modo, viridi & cupri puri colore variat. In utroque capitis latere exigua quoque adest linea nigra, ab exortu mandibulæ superioris orta, & ad oculum usque obliquè producta. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes & superiores caudæ tectrices sunt virides, cupi puri colore variantes. Pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes ex eleganti cinereo albescent. Remiges majores nigricantes, subtus ad cinereum, superne ad viride inclinantes, ad latus insuper interius ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque candicant : minores superne obscurè virides, splendide viridi & cupri puri colore in latere tantum exteriore variantes, in interiore tamen versùs exortum albidæ, infernè verò exterius & apice cinereo-nigricantes,

Tom. IV.

qu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, excepté son sommet, la gorge & le col sont cendrés. Le sommet de la tête est noirâtre, & change, selon qu'il est exposé aux différens rayons de lumière, en verd & en couleur de cuivre de rosette. Il y a aussi de chaque côté de la tête une petite ligne noire, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, & monte obliquement jusqu'à l'œil. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un verd changeant en couleur de cuivre de rosette. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un joli gris-blanc. Les grandes plumes de l'aile sont d'un noirâtre tirant sur le cendré en-dessous & sur le verd en-dessus ; & elles sont blanchâtres du côté intérieur depuis leur origine jusqu'à la moitié de leur longueur : les moyennes sont en-dessus d'un verd obscur, changeant du côté extérieur seulement en verd brillant & en couleur de cuivre de rosette, & leur côté intérieur est blanchâtre vers leur origine ; & en-dessous elles sont d'un cendré-noir.

X

râtre du côté extérieur & à leur bout, & d'un gris-blanc du côté intérieur. La queue est composée de douze plumes d'égale longueur, qui sont noires en-dessous, mais en-dessus elles sont d'un verd changeant en couleur de cuivre de rosette. Le bec & les ongles sont noirâtres; & les pieds rougeâtres.

La femelle (*voyez Pl. XV. Fig. 2*) est plus grande & plus grosse que le mâle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces quatre lignes de long; sa queue sept pouces neuf lignes; son pied quinze lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce six lignes, l'intérieur douze lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière treize lignes, & l'intérieur sept lignes. Elle a deux pieds cinq pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge & la partie supérieure du col sont rayées transversalement de brun & de roux. Le dos & le croupion sont bruns, ainsi que les cou-

intérius cinereo-albæ. Caudam componunt duodecim rectrices æqualem longitudinem obtinentes, subtus nigra, superne verò virides, cupri puri colore variantes. Rostrum, unguisque nigricant; pedes autem rubescunt.

Fœmina (vide Tab. XV. Fig. 2.) magnitudine & crassitie marem excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem quinque pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguis tredecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & quatuor lineas longum est; cauda septem pollices & novem lineas; pes quindecim lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & sex lineas, intimus duodecim cum semi lineas; posticorum exterior tredecim lineas, interior septem lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum quinque pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, guttur & collum su-

perius sunt fusco & rufo transversim striata. Dorsum, uropygium & superiores caudæ tectrices fuscae. Pars colli inferior, pectus, venter, latera & tectrices caudæ inferiores rufescunt, quâlibet tamen pennâ maculâ nigricante versùs apicem insignitâ. Crura & pennæ alas subtus obtegentes sunt rufescentes & immaculatæ. Superiores alarum tectrices minores fuscae, rufo terminatæ : majores in latere interiore fuscae, in exteriori verò obscurè virides, marginibus & apice rufis. Remiges superne & infernè remigibus *maris* concolores ; ab istis tamen in eo discrepant quod colores non ita sint vivi, & minores remiges oris exterioribus rufis præditæ sint. Cauda duodecim constat rectricibus longitudine æqualibus, subtus cinereis, superne verò splendide fuscis, pauco rufo terminatis. Rostrum fuscum. Pedes rubescentes ; ungues verò nigricantes. Habitant in *Madagascaria*, unde ambo in *museum D. Aubry* allati sunt.

Species ista rostro donatur multò rectiore quàm reliquæ omnes hujus generis species : quod rostrum ne-

vertures du dessus de la queue. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont roussâtres, chaque plume étant marquée vers le bout d'une tache noirâtre. Les jambes & les couvertures du dessous des ailes sont roussâtres & sans taches. Les petites couvertures du dessus des ailes sont brunes, & terminées de roux : les grandes sont brunes du côté intérieur, mais du côté extérieur elles sont d'un verd obscur, bordées & terminées de roux. Les plumes de l'aile sont dessus & dessous des mêmes couleurs que celles du *mâle* ; il y a cependant cette différence, que les couleurs sont moins vives, & que les moyennes plumes sont bordées extérieurement de roux. La queue est composée de douze plumes d'égale longueur, cendrées en-dessous, mais en-dessus d'un brun lustré, & terminées par un peu de roux. Le bec est brun. Les pieds sont rougeâtres ; & les ongles noirâtres. On les trouve à *Madagascar*, d'où ils ont été apportés l'un & l'autre à *M. l'Abbé Aubry*, qui les conserve dans son *cabinet*.

Le bec dans cette espèce est beaucoup plus droit que dans toutes les autres de ce genre : il n'est pas convexe en - dessus ;

mais anguleux. Les narines sont longues, & placées obliquement vers la moitié de la longueur du demi-bec supérieur. Elle diffère encore des autres especes en ce qu'elle a douze plumes à la queue, tandis que dans les autres je n'en ai jamais observé que dix. On pourroit faire de cette espece un genre particulier.

quaquam est superne convexum, sed angulosum. Nares habet longas, & versùs mediam longitudinem mandibulæ superioris obliquè positas. Ab aliis speciebus insuper discrepat caudâ duodecim rectricibus conflatâ, dum in alteris decem tantum nec amplius unquam observavi. Hæc species posset suum genus constituere.

SECTION IV.

SECTIO IV.

Ceux dont le bec est court & crochu.

Ea quæ rostrum habent breve, aduncum.

CETTE section contient trois genres d'Oiseaux. Les uns ont le bec plus large qu'épais, comme le *Couroucou* : & les autres ont le bec plus épais que large. De ces derniers les uns ont le bec tranchant en-dessus, comme le *Bout-de-Petun* : & les autres ont le bec convexe en-dessus, comme le *Perroquet*.

IN illa sectione tria continentur Avium genera. Aliæ sunt quarum rostri latitudo crassitiem superat, ut *Trogon* : aliæ quarum rostri crassities latitudinem antecellit. Ex posterioribus istis aliæ rostrum habent superne cultratum, ut *Crotophaga* : alteræ verò rostro donantur superne convexo, ut *Psittacus*.

L I.

L I.

Le genre du Couroucou (1).

Cæus Trogonis (1).

Son caractère est d'avoir

Hujus character est

(1.) *Couroucou*, nom formé de *Curucui*, qui est celui que les *Brasiliens* donnent à la quatrième espece de ce genre.

(1) *Trogon*, nomen quartæ hujus generis speciei à *Mochringio* inditum.



2. *Coucou de Cayenne.*





Dessiné et Gravé par Martinet

1. Coucou du Sénégal.

2. Coucou de Cayenne.

*Fig. 2.*

2. *Coccyz melanotos* de S. Domingue.



Fig. 1.



Fig. 2.

Designé et Gravé par Martinet.

1. Coucou tacheté de Cayenne.

2. Coucou de S. Domingue.



2. *Coucou tacheté des Indes.*

Fig. 1.



Fig. 2.



Échelle de 6 Pouces.



Fig. 2.

Coucou tacheté de Malabar.



Designé et Gravé par Martinet.

1. Coucou hupé de Coromandel.

2. Coucou tacheté de Malabar.



2. Coucou hupé de Madagascar.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Coucou tacheté de Mindanao.

2. Coucou hupé de Madagascar.





2. Coucou de Madagascar.



Designé et gravé par Martinet.

1. Coucou bleu de Madagascar.

2. Coucou de Madagascar.





Fig. 1.



Designé et Gravé par Martinet

1. Coucou verd hupé de Siam.

2. Coucou bleu de la Chine.





Fig. 1.

Fig. 2.

2. Grand Coucou de Madagascar, femelle.



Dessiné et Gravé par M. Linet.

1. Grand Coucou de Madagascar, mâle. 2. Grand Coucou de Madagascar, femelle.



Digiti quatuor, membranis destituti; duo scilicet antici, totidem postici; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Quatre doigts, dénués de membranes; deux devant & deux derriere; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Rostrum breve, aduncum, cujus latitudo crassitiem superat.

Le bec court, crochu & plus large qu'épais.

Omnes hujus generis Aves digitum habent extimum, sive anticum, sive posticum, intimo multò brevior. Omnium, quas observavi, specierum pedes circiter ad exortum digitorum usque plumulæ vestiunt.

Tous les Oiseaux de ce genre ont le doigt extérieur, soit celui de devant, soit celui de derriere, plus court que l'intérieur. Toutes les especes que j'ai observées, ont les pieds couverts de plumes environ jusqu'à l'origine des doigts.

** I. LE COUROUCOU CENDRÉ DE CAYENNE.

Voyez Pl. XVI. Fig. 1.

Trogon saturatè cinereus; ventre flavo-aurantio; rectricibus alarum superioribus nigricantibus, lineolis albidis transversim striatis; rectricibus nigricantibus, tribus utrinque extimis exterius albo transversim striatis, apice albis
TROGON CAYANENSIS CINEREUS.

Merulam crassitie paululum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius unco ad

Il est un peu plus gros qu'un *Merte*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a.

un pouce de long ; sa queue six pouces trois lignes ; son pied six lignes & demie ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , sept lignes & demie , l'intérieur neuf lignes ; l'extérieur de ceux de derriere quatre lignes & demie , & l'intérieur six lignes. Il a un pied cinq pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête , la gorge , le col , la poitrine , le dos , le croupion , les couvertures du dessus de la queue & les côtés sont d'un cendré très-foncé. Le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un très-beau jaune-orangé. Les jambes sont d'un cendré - noirâtre. Des plumes de la même couleur couvrent les pieds presque jusqu'à l'origine des doigts. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un cendré très-foncé , & bordées de blanchâtre. Les plumes scapulaires , les petites couvertures du dessus des ailes , ainsi que les grandes les plus proches du corps , sont d'un noirâtre rayé transversalement de petites lignes blanchâtres fort étroites : les grandes les plus éloignées du corps sont du même noirâtre , mais sans rayures. Les grandes plumes de l'aile sont noirâ-

oris angulos usque unum pollicem longum est ; cauda sex pollices cum tribus lineis ; pes sex cum semi lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue septem cum semi lineas , intimus novem lineas ; posticorum exterior quatuor cum semi lineas , interior sex lineas. Alis expansis , extremitates majorum remigum unius pedis quinque pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput , guttur , collum , pectus , dorsum , uropygium & latera vestiunt pennæ saturatissimè cineræ. Superiores caudæ testrices concolores. Venter & testrices caudæ inferiores elegantissimi sunt flavo-aurantii coloris. Crura ex cinereo nigricant. Pedes ferè ad exortum usque digitorum vestiunt plumulæ concolores. Quæ alas subtus obtegunt , sunt saturatissimè cineræ , albedo marginatæ. Scapulares , superioresque alarum testrices minores , sicut & majores corpori finitimæ , nigricant , lineolisque strictissimis albidis sunt transversim striatæ : majores à corpore remotiores similiter ni-

gricant, sed lineolis albidis destituuntur. Remiges majores nigricantes; ex istis quinque, à secunda scilicet ad sextam usque inclusivè, oris donantur exterioribus ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque, candidis: minores similiter nigricant, strictissimisque lineolis transversis candicantibus, sed in latere exteriori tantum, sunt striatæ. Minores insuper remiges in exortu albicant. Remix prima breviuscula: quarta omnium longissima. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes: tres utrinque extremis transversis albis in latere exteriori sunt striatæ, & apicibus concoloribus præditæ: tæniæ autem transversæ eò magis versùs rectricis exortum producuntur, quò rectrix exterior fit; quæque cujuslibet rectricis apicem variegant, ad latus interius nonnihil protenduntur. Sex intermedia rectrices reliquarum longitudinem excedunt; reliquæ autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque intermediis duorum pollicum longitudine cedentem. Rostrum, pedes,

tres; cinq de celles-ci, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la sixième inclusivement, sont bordées extérieurement de blanc depuis leur origine jusqu' vers les deux tiers de leur longueur: les moyennes sont pareillement noirâtres, & rayées, mais du côté extérieur seulement, de petites lignes transversales blanchâtres, extrêmement étroites. Ces dernières sont blanches à leur origine. La première des plumes de l'aile est assez courte: la quatrième est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes noirâtres: les trois plus extérieures de chaque côté sont marquées sur leur côté extérieur de bandes transversales blanches, & terminées de la même couleur; ces bandes transversales s'étendent d'autant plus loin vers l'origine de la plume, qu'elle est plus extérieure; & celles qui sont placées vers le bout de chaque plume, s'étendent un peu sur le côté intérieur. Les six plumes du milieu de la queue sont plus longues que les autres, qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de deux pouces que celles du milieu. Le bec, les pieds & les ongles sont d'un cendré foncé.

On le trouve à *Cayenne*. Du cabinet de *Madame de Bandeville*.
 unguetque saturatè cinereis.
 Habitat in *Cayana*. Ex museo *D. de Bandeville*.

** 2. LE COUROUCOU VERD DE CAYENNE.

Voyez Pl. XVII. Fig. 1.

Trogon superne viridi-aureus , infernè flavo-aurantius ; capite superiore & collo cœruleo-violaceis, viridi-aureo colore variantibus ; genis & gutture nigris ; taniâ transversâ in pectore viridi-aureâ ; rectricibus nigricantibus, quatuor intermediis viridi-aureo mixtis , utrinque sequenti exterius viridi-aureâ , tribus utrinque extimis apice obliquè & dentatim albis TROGON CAYANENSIS VIRIDIS.

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces cinq lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces neuf lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long ; sa queue six pouces ; son pied six lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , sept lignes, l'intérieur huit lignes ; l'extérieur de ceux de derrière trois lignes & demie, & l'intérieur cinq lignes & demie. Il a quinze pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le dessus de la tête & le col sont d'un bleu-violet chan-

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & quinque lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est ; cauda sex pollices ; pes sex lineas ; digitorum anteriorum exterior cum ungue septem lineas , interior octo lineas ; posticorum extimus tres cum semi lineas , intimus quinque cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quindecim pollicum ; alæ verò complicatæ ad mediam longitudinem caudæ

caudæ pertingunt. Caput superius & collum sunt cœruleo-violacea, viridi-aureo colore variantia. Caput ad latera & guttur nigra. Dorsum, uropygium & superiores caudæ tectrices splendide viridi aureæ. In summo pectore tania extat transversa concolor. Pectus infimum, venter, latera, inferioresque caudæ tectrices eleganti flavo-aurantio tinguntur. Crura nigricant. Pennæ alas subtus obtegentes similiter nigricantes, albo marginatæ. Superiores alarum tectrices, sicut & scapulares, nigræ. Remiges fusco-nigricantes, oris majorum exterioribus ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque albis, à medietate ad apicem albo tantùm punctulatis. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediae nigricantes, viridi-aureo mixtæ : utrinque proximè sequens pariter nigricans, sed in margine tantùm exteriore viridi-aureo mixta : tertia in latere exteriore viridi-aurea, in interiore & apice nigricans : quarta utrinque nigricans, sed cujus latus exterius albo terminatur, albedine cum nigricante colore dentatim.

Tom. IV.

geant en verd-doré. La gorge & les côtés de la tête sont noirs. Le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd-doré éclatant. Sur le haut de la poitrine est une bande transversale de la même couleur. Le bas de la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau jaune-orangé. Les jambes sont noirâtres. Les couvertures du dessous des aîles sont de cette dernière couleur, & bordées de blanc. Celles du dessus, ainsi que les plumes scapulaires sont noires. Les plumes de l'aîle sont d'un brun-noirâtre : le bord extérieur des grandes est blanc depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur, & seulement pointillé de blanc dans l'autre moitié. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un noirâtre mêlé de verd-doré : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est pareillement noirâtre, mais cette couleur n'est mêlée de verd-doré que sur le bord extérieur : la troisième est d'un verd-doré du côté extérieur, & noirâtre du côté intérieur & à son bout : la quatrième est noirâtre des deux côtés, mais son côté extérieur est terminé de blanc, qui s'engrenne

Y.

dans le noirâtre en forme de dents : enfin les deux plus extérieures de chaque côté sont noirâtres depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & blanches de là jusqu'à leur bout : ces deux couleurs s'engrennent l'une dans l'autre en forme de dents, & coupent obliquement chaque plume. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte que les deux du milieu de près de deux pouces. Le bec est d'un gris-blanc. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de plumes noirâtres. Les doigts sont d'un gris-blanc ; & les ongles d'un cendré-brun. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

immixtâ : binæ tandem utrinque extimæ ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque nigricantes, à medietate ad apicem albæ, duobus istis coloribus inter se quodammodo denticulatis, & quamlibet rectricem obliquè dividētibus. Binæ rectrices intermediae lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis duorum serè pollicum longitudine cedentem. Rostrum cinereo-album. Pedes ad exortum usque digitorum vestiunt plumulæ nigricantes. Digiti cinereo-albi ; ungues verò cinereo-fusci. Habitat in *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missus est à *D. des Essars*.

**** 3. LE COUROUCOU VERD A VENTRE BLANC
DE CAYENNE.**

Trogon superne viridi-aureus, infernè albus ; capite superiore & collo cœruleo-violaceis, viridi-aureo colore variantibus ; genis & gutture nigris ; taniâ transversâ in pectore viridi-aureâ ; rectricibus nigris, binis intermediis viridi-aureo mixtis, duabus utrinque sequentibus exteriùs viridi aureis, tribus utrinque extimis apice obliquè albis . . .
TROGON CAYANENSIS VIRIDIS VENTRE CANDIDO.

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda quinque pollices cum septem lineis; pes sex lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue eandem obtinet longitudinem, intimus septem lineas longus; posticorum extimus tres cum semi lineas, intimus quinque cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput superius & collum sunt cœruleo-violacea, viridi-aureo colore variantia. Caput ad latera & guttur nigra. Dorsum, uropygium, pennæ caudam superne cooperientes & superiores alarum tectrices minores splendidè viridi-aureæ. In summo pectore tænia extat transversa concolor. Pectus infimum, venter, latera, inferioresque caudæ tectrices alben-

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est dix pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces cinq lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long; sa queue cinq pouces sept lignes; son pied six lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, a aussi six lignes de long, l'intérieur sept lignes; l'extérieur de ceux de derrière trois lignes & demie, & l'intérieur cinq lignes & demie. Il a quatorze pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le dessus de la tête & le col sont d'un bleu-violet changeant en verd-doré. La gorge & les côtés de la tête sont noirs. Le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les petites du dessus des aîles sont d'un verd-doré éclatant. Sur le haut de la poitrine est une bande transversale de la même couleur. Le bas de la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les jambes sont noirâtres. Les couvertures du dessous des aîles sont de cette dernière cou-

leur, & bordées de blanc. Les grandes du dessus, ainsi que les plumes scapulaires, sont noires. Les plumes de l'aîle sont noirâtres; & quatre d'entr'elles, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la cinquième inclusivement, sont bordées extérieurement de blanc. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un noir mêlé de verd-doré : les deux suivantes de chaque côté sont d'un verd-doré du côté extérieur, & noires du côté intérieur & à leur bout : les trois plus extérieures de chaque côté sont noires depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & blanches dans leur dernière moitié, cette dernière couleur coupant obliquement chaque plume, & occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus extérieure : de plus la plus intérieure de ces trois plumes a un peu de verd-doré mêlé à son noir du côté extérieur seulement. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un gris-blanc. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts de plumes noirâtres. Les

Crura nigricant. Pennæ alas subtus obtegentes pariter nigricantes, albo fimbriatæ. Superiores alarum rectrices majores, sicut & scapulares, nigrae. Remiges nigricantes; ex istis quatuor, à secunda scilicet ad quintam usque inclusivè, marginibus donantur exterioribus albis. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediae nigrae, viridi-aureo mixtae : duæ utrinque sequentes in latere exteriori viridi-aureæ, in interiori & apice nigrae : tres utrinque extremae ab ipsarum exortu mediam versus longitudinem usque nigrae, à medietate ad apicem albæ, albedine quamlibet rectricem obliquè dividente, & eò majus spatium occupante, quod rectrix fit exterior : trium insuper istarum rectricum intima in latere tantum exteriori aliquid viridi-aurei nigro admixtum habet. Binæ rectrices intermediae lateralium longitudinem paululum superant; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum. Rostrum cinereo-album. Pedes ad exortum usque digitorum vestiunt plumulae nigricantes. Digi sunt

cinereo - albi ; unguis verò doigts font d'un gris-blanc ; &
cinereo - fusci. Habitat in les ongles d'un cendré - brun.
Cayana , unde in *musæum* On le trouve à *Cayenne* , d'où il
Realmurianum missus à *D.* a été envoyé à *M. de Reaumur*
des Effars. par *M. des Effars.*

An præcedentis fœmina ? C'est peut-être la femelle du
précédent.

4. LE COUROUCOU VERD DU BRÉSIL.

Trogon superne viridi-aureus, cœruleo & cupri puri colore
varians, infernè coccineus ; gutture nigro ; rectricibus sex
intermediis dorso concoloribus , apice nigris , tribus utrin-
que extimis albis , nigro transversim striatis TROGON
BRASILIENSIS VIRIDIS.

Trogon. *Moehr. Avi. Gen.* 114.

Avis anonyma tertia. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 219. (*An fœmina ?*)

Jonst. Avi. pag. 150. (*An fœmina ?*)

Picis congener. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag.* 863 , in qua hujus icon mi-
nimè accurata.

Jonst. Avi. pag. 80.

Picis congener , Curucui Brasiliensibus dictus *Marcgravii. Willugh.*
Ornith. pag. 96. hujus icon à *Marcgravio mutuata Tab. XXII.*

Picis congener , Curucui *Marcgravii* , *Willughbeji. Klein. Avi. pag.* 28.
Nº. 16.

Curucui Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 211 , in qua hujus icon
minùs accurata.

Jonst. Avi. pag. 144. hujus icon à *Marcgravio mutuata Tab. 60.*

Curucui Brasiliensibus *Marcgravii. Raj. Syn. Avi. pag.* 45. Nº. 4.

Tzinitzcan. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 23. cap. XLIII.

Tzinitzian. Euf. Nieremb. pag. 230.

Jonst. Avi. pag. 122.

Willugh. Ornith. pag. 303.

Raj. Syn. Avi. pag. 163.

Perroquet ou Psittacus flammeus , viridis & cinereus rostro serrato.

Feuillée Journ. des Obs. phys. pag. 20. (*ed.* 1725).

Les Brasiliens l'appellent CURUCUI. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Les Mexiquains , TZINITZEAN. *Fern.*

Magnitudine & crassitie Il approche de la grandeur &
ad *Picam* accedit. Caudam de la grosseur d'une *Pie.* Sa
Y iij

queue a cinq pouces & demi de longueur. La tête, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd-doré éclatant, changeant en bleu & en couleur de cuivre de rosette. Au-dessous de chaque œil est une peau blanche, qui forme une tache, comme dans les *Poules*. Les paupieres, sçavoir la supérieure & l'inférieure, sont garnies de poils noirs & assez durs. Dans le milieu du dessous du demi-bec inférieur & à chaque côté du bec est une espece de barbe, composée de plumes roides & en forme de poils; ces plumes sont d'un noir brillant du même bleu que celui du col des *Cannards*. La gorge est noire. La poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un rouge vif. Les jambes sont noirâtres. Les couvertures du dessous des ailes sont blanchâtres. Les petites du dessus sont de la même couleur que le dos : les grandes sont noirâtres, & parsemées de très-petits points blanchâtres. Les plumes de l'aile sont d'un brun-noirâtre. La queue est composée de douze plumes : les six du milieu sont d'un verd-doré éclatant, changeant en bleu & en couleur de cuivre de rosette,

habet quinque cum semī pollices longam. Caput, collum, dorsum & uropygium vestiunt pennæ splendide viridi-aureæ, cœruleo & cupri puri colore variantes. Scapulares & superiores caudæ rectrices concolores. Sub quolibet oculo maculam cutaceam habet albam, ut *Galina*: in palpebris superius & inferius pilos nigros duriusculos : sub mandibula inferiori in medio, & ad utrumque rostri latus quasi barbam pennis conflata rigidis, pilorum æmulis, nigris, sed in quibus transplendet color cœruleus, ut in collo *Anatum*. Guttur nigrum est. Pectus, venter, latera & rectrices caudæ inferiores coccinei sunt coloris. Crura nigricant. Pennæ alas subtus obtegentes candicant. Superiores alarum rectrices minores dorso concolores : majores nigricantes, minutissimis punctulis candicantibus respersæ. Remiges ex fusco nigricantes. Caudam componunt duodecim rectrices : sex intermediæ splendide viridi-aureæ, cœruleo & cupri puri colore variantes, apice nigrae : tres utrinque extremæ albæ, nigro transversim striatæ. Binæ intermediæ latera-

lium longitudinem paululùm excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Oculi cœrulei; ipsorum irides aureæ. Rostrum colore sulphureo imbutum. Pedes ad extimum usque digitorum vestiti plumulæ nigricantes. Digiti, unguesque cinereo-fusci.

& terminées de noir : les trois plus extérieures de chaque côté sont blanches, & rayées transversalement de noir. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont bleus ; leur iris est de couleur d'or. Le bec est de couleur de soufre. Les pieds sont couverts

jusqu'à l'origine des doigts de plumes noirâtres. Les doigts & les ongles sont d'un cendré-brun.

Avis anonima tertia Marcgravii, quæ forsan est hujus speciei *fœmina*, in omnibus ferè cum suprâ descripta convenit; ab illa tantùm discrepat in eo quod rectrices alarum superiores habeat fuscas; rostrum cinereum; oculorum irides croceas; & maculâ sub oculis cutaceâ albâ destituatur.

Le troisième Oiseau anonyme de Marcgrave, qui est peut-être la femelle de cette espèce, est presque en tout semblable à celui que je viens de décrire; il en diffère seulement en ce qu'il a les couvertures du dessus des ailes brunes, le bec cendré & l'iris des yeux de couleur de safran : & en ce qu'il n'a pas cette peau blanche, qui forme une tache sous chaque œil.

Fruïtibus vescuntur Aves istæ. Habitat in *Brasilia*.

Ces Oiseaux se nourrissent de fruits. On les trouve au *Brésil*.

5. LE COUROUCOU DU MEXIQUE.

Trogon superne albo, nigro & fulvo variegatus, infernè rubescens; capite nigro; rectricibus nigris, tribus utrinque extimis apice albis . . . TROGON MEXICANUS.

Tzanatl tototl, seu Avis similis aut congener Tzanatl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 22. cap. XXXVII.*

Tzanatl tototl Hernandezii. *Raj. Syn. Avi. pag. 166.*

Les Mexiquains l'appellent TZANATLTOTOTL. *Fern. Raj.*

Il est de la grosseur de notre *Etourneau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est presque de neuf pouces. Sa tête est noire. La partie supérieure du col, le dos & le croupion sont variés de blanc, de noir & de fauve. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont variées des mêmes couleurs. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont rougeâtres. Les jambes sont noirâtres. Les plumes de l'aile sont noires. La queue est composée de douze plumes de la même couleur : les trois plus extérieures de chaque côté sont terminées de blanc. Le bec & les pieds sont cendrés. On le trouve au *Mexique*.

Cum *Sturno nostrati* crassitie convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem ferè pollices æquat. Caput nigrum est. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superioresque caudæ rectrices albo, nigro & fulvo variegantur. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera & rectrices caudæ inferiores rubescunt. Crura nigricant. Remiges alarum sunt nigræ. Cauda duodecim conflatur rectricibus nigris, quarum tres utrinque extremæ apice albent. Rostrum, pedesque sunt cinerei. Habitat in *Mexico*.

6. LE COUROUCOU VARIÉ DU MEXIQUE.

Trogon cyaneo, luteo, viridi & nigro variegatus; vertice cyaneo. . . . TROGON MEXICANUS VARIUS.

Quaxoxoctototl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 49. cap. CLXXVII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 164.

Les Mexiquains l'appellent QUAXOXOCTOTOTL. *Fern. Raj.*


Il est à peu près de la grosseur d'un *Pigeon*. Le sommet

Columbam crassitie circiter æquat. Vertex capitis cyaneus



Fig. 2.

2. Petit Coucou de Cayenne .



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Couroucou cendré de Cayenne.

2. Petit Coucou de Cayenne.





2. Coucou à long bec de la Jamaïque.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Couroucou verd de Cayenne. 2. Coucou à long bec de la Jamaïque.

neus est. Reliquum corpus cyaneo, luteo, viridi & nigro variegatur. Rostrum nigrum. Habitat in *Mexico*. de la tête est d'un beau bleu. Tout le reste du corps est varié de bleu, de jaune, de verd & de noir. Le bec est de cette dernière couleur. On le trouve au *Mexique*.

LII.

LII.

Genus Crotophagi.

Le genre du Bout-de-petun.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis destituti; duo scilicet antici, totidem postici; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de membranes; deux devant, & deux derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Rostrum breve, aduncum, superne cultratum, cujus crassities latitudinem superat.

Le bec court, crochu, plus épais que large, & tranchant en-dessus.

Omnia hujus generis specierum cauda decem tantum rectricibus conflatur.

Toutes les especes de ce genre n'ont que dix plumes à la queue.

** I. LE BOUT-DE-PETUN.

Voyez Pl. XVIII. Fig. 1.

Crotophagus nigro-violaceus, oris pennarum obscure viridibus, cupri puri colore variantibus; remigibus, rectricibusque nigro-violaceis CROTOPHAGUS.

Crotophagus ater, rostro breviori compresso, superne arcuato-cultrato: *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 474.*

Monedula tota nigra. Catesb. append. pag. 3; avec une figure passable, mais mal coloriée, Pl. 3.

Tom. IV.

Z

Monedula tota nigra major, garrula, mandibulâ superiore arcuatâ.
Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 298. N°. XII. hujus icon non satis accurata Tab. 256. fig. 1.

Cornix garrula major. *Klein. Avi. pag. 59. N°. 7.*

Pica nigra Jamaicensis, plumis interspersis purpureis è viridi-resplendentibus, rostro novaculaformi. *Klein. Avi. pag. 64. N°. 12.*

Psittaco congener, Ani Brasiliensium Maregravii. *Willugh. Ornith. pag. 81.*

Raj. Syn. Avi. pag. 35. N°. 10.

Ani Brasiliensibus. *Maregr. Hist. Br. pag. 193, in qua hujus icon non satis accurata.*

Jonst. Avi. pag. 132. hujus icon à Maregravio mutuata Tab. 57, sub titulo, Sayacu.

Ani Brasiliensibus Maregravii. *Raj. Syn. Avi. pag. 185. N°. 29.*

Cacalotototl, seu Avis corvina. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 50. cap. CLXXXII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 168. N°. 27.

Bout-de-petun. *Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 260.*

Les Habitans de Cayenne l'appellent BOUT-DE-PETUN.

Les Anglois, GREAT BLACK-BIRD. Sloane. Raj.

Les Anglois de la Jamaïque SAVANNA BLACK-BIRD. Browne.

Les Brasiliens, ANI. Maregr. Jonst. Willugh. Raj.

Les Mexiquains, CACALOTOTOTL. Fern. Raj.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces neuf lignes. Son bec est épais de neuf lignes & demie, & a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche treize lignes de long; sa queue sept pouces; son pied un pouce cinq lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'intérieur neuf lignes; l'extérieur de ceux de derrière un pouce, & l'inté-

Crassitie Merulam circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & totidem lineas. Rostrum, novem cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda septem pollices; pes unum pollicem & quinque lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue quatuordecim lineas, intimus novem lineas; posticorum extimus

unum pollicem, intus octo lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & novem linearum; alæ verò complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ nigro-violaceæ, oris præditæ in tota circumferentiâ unam lineam latis, obscurè viridibus, cupri puri colore variantibus: quæ oræ in capite, collo & parte dorsi suprema magis sunt quàm in reliquis prædictis partibus conspicuæ. Pennæ caudam superne & infernè cooperientes, & superiores alarum tectrices minores eodem colore tinguntur, & marginibus pariter donantur obscurè viridibus. Pennæ scapulares, tectrices alarum inferiores, superiores majores, sicut & remiges, sunt quoque nigro-violaceæ, sed suprâ dictis marginibus destitutæ. Caudam componunt decem rectrices remigibus concolores. Binæ intermedix lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur

rius huit lignes. Il a quatorze pouces neuf lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont couverts de plumes d'un noir tirant sur le violet, bordées tout autour de la largeur d'une ligne d'un verd sombre, changeant en couleur de cuivre de rosette: cette bordure est plus apparente sur la tête, le col & la partie supérieure du dos qu'ailleurs. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue, ainsi que les petites du dessus des ailes, sont de la même couleur, & bordées de même. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessous des ailes, les grandes du dessus & les plumes de l'aile sont du même noir tirant sur le violet & sans bordure. La queue est composée de dix plumes de la même couleur que celles des ailes. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. La base du demi-bec supérieur est garnie de plumes en forme de poils, roides & tournées en-

devant. Ses cils sont de même roides & fort longs. Le bec , les pieds & les ongles sont noirs. Les Oiseaux de cette espece font de très-grands nids dans les buissons ; ils pondent & couvent jusqu'à cinquante ensemble dans le même nid. On les trouve à *Cayenne*, d'où ils ont été envoyés à *M. de Reaumur* par *M. des Essars* & *M. Artur*.

ad utrinque extimam usque brevior. Mandibula superioris basis pennis oblita est piliformibus , rigidis , antrosum versis. Cilia similiter rigida & longissima. Rostrum, pedes, unguisque nigri. Hujus speciei Aves amplissimos in sepibus nidos construunt, & quinquaginta simul in uno eodemque nido ova ponunt & incubant. Habitant in *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missi sunt à *D. des Essars* & *D. Artur*.

** 2. LE GRAND BOUT-DE-PETUN.

Voyez Pl. XVIII. Fig. 2.

Crotophagus nigro-violaceus, oris pennarum viridibus ; remigibus obscurè viridibus ; rectricibus nigro-violaceis
CROTOPHAGUS MAJOR.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Geay*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied six pouces six lignes , & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces. Son bec est épais de dix lignes & demie , & a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche un pouce huit lignes & demie de long ; sa queue dix pouces ; son pied un pouce sept lignes & demie ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , un

Garrulum crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem sex pollices & totidem lineas explet , & ad extremos ungues undecim pollices. Rostrum decem cum semi lineas crassum , ab ipsius unco ad oris angulos usque unum pollicem & octo cum semi lineas longum est ; cauda decem pollices ; pes unum pollicem & septem cum semi lineas ;

digitorum anticorum exterior cum ungue octodecim cum semi lineas, interior undecim cum semi lineas; posteriorum extremus sexdecim cum semi lineas, intimus novem lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & undecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ tertiam longitudinis caudæ partem attingunt. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera & crurapennis vestiuntur nigro-violaceis, in tota circumferentia lineæ circiter unius latitudine viridi marginatis: margines autem virides in capite, collo & dorso supremo magis sunt quàm in reliquis prædictis partibus conspicuæ. Tectrices caudæ superiores & inferiores eodem imbuuntur colore, & marginibus similiter viridibus præditæ sunt. Superiores alarum tectrices minores obscurè virides, & pennarum corporis instar fimbriatæ. Scapulares, tectrices alarum superiores majores, sicut & inferiores omnes, remigesque, eodem viridi obscuro imbutæ, & marginibus suprà dictis destitutæ. Decem rectricibus nigro-violaceis cauda conflatur. Binæ

pouce six lignes & demie, l'intérieur onze lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière seize lignes & demie, & l'intérieur neuf lignes. Il a un pied onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont couverts de plumes d'un noir tirant sur le violet, qui ont tout autour une bordure verte d'environ une ligne de largeur: cette bordure est plus apparente sur la tête, le col & la partie supérieure du dos qu'ailleurs. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur & bordées de même. Les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un verd obscur, & bordées de même que les plumes du corps. Les scapulaires, les grandes couvertures du dessus, ainsi que toutes celles du dessous des aîles, & les plumes de l'aile sont du même verd obscur & sans bordures. La queue est composée de dix plumes d'un noir-violet. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de

chaque côté, qui est plus courtes de deux pouces cinq lignes que les deux du milieu. Son bec est plus allongé que celui du précédent : il est noir, ainsi que les pieds & les ongles. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

intermediæ lateralium longitudinem excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis duorum pollicum & quinque linearum longitudine cedentem. Rostrum habet magis quam in præcedente elongatum, nigrum. Pedes, unguesque similiter nigri. Habitat in *Cayana*, unde in museum *D. Aubry* missus est.

LIII.

Le Genre du Perroquet.

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; deux devant, & deux derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

Le bec court, crochu, plus épais que large, & convexe en-dessus.

Les Oiseaux de ce genre sont de grosseur fort inégale : il y en a qui sont de la grosseur d'une *Poule*; d'autres ne passent pas celle d'un *Merle* ou même d'une *Alouette*. Parmi les grands & les petits les uns ont la queue fort longue, les autres l'ont beaucoup plus courte. Nous

LIII.

Genus Psittaci.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; duo scilicet antici, totidem postici; omnes circiter usque ad exortum discreti :

Crura ad calcaneum usque plumosa :

Rostrum breve, aduncum, superne convexum, cujus crassities latitudinem superat.

Inæqualem obtinent crassitiem hujus generis Aves : aliæ enim *Gallinam* crassitie amulantur; alteræ *Merulam* aut etiam *Alaudam* crassitie non antecellunt. Ex majoribus; sicut & minoribus, aliæ caudâ longissimâ, aliæ caudâ multò breviori præ-



2. Grand Bout-de-Petun.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Bout-de-Petun.

2. Grand Bout-de-Petun.

ditæ sunt. Majores caudâ longissimâ donatas vocantur *Aras*, latinè *Aræ*; *Angli* eas nuncupant *Maccaos*. Inter majores caudâ breviori præditas aliæ in toto ferè corpore alben; eas vocamus *Kakatoes*, latinè *Cacatuæ*; *Angli* verò illas *Cockatoons* nominant: aliæ in majore corporis parte rubent; à nobis, sicut & ab *Anglis*, nominantur *Lorys*, latinè *Lorii*: aliæ tandem sunt diversicolores; eas nuncupamus *Perroquets*, latinè *Psittaci*, & ab *Anglis* *Parrots* vocantur. Minores quæ caudâ longissimâ gaudent, nominantur *Perruches*, latinè *Psittacæ*; *Angli* illas nuncupant *Long Tail'd Parakeets*. Minores tandem caudâ breviori præditas vocamus *Petites Perruches*, latinè *Psittaculæ*, ab *Anglis* simpliciter *Parrakeets* nominantur.

appelons les grands qui ont la queue longue *Aras*, en latin *Aræ*: les *Anglois* les nomment *Maccaos*. Parmi les grands dont la queue est courte, les uns sont presqu'entièrement blancs; nous les nommons *Kakatoes*, en latin *Cacatuæ*, & les *Anglois* les appellent *Cockatoons*: d'autres ont pour dominante la couleur rouge; & nous, ainsi que les *Anglois*, les appelons *Lorys*, & en latin *Lorii*: d'autres enfin sont variés de différentes couleurs; nous les appelons *Perroquets*, en latin *Psittaci*, & les *Anglois* les nomment *Parrots*. Les petits qui ont la queue longue, s'appellent *Perruches*, en latin *Psittacæ*, & les *Anglois* les nomment *Long Tail'd Parrakeets*. Enfin les petits dont la queue est courte, nous les nommons *Petites Perruches*, en latin *Psittaculæ*, & les *Anglois* les appellent simplement *Parrakeets*.

Les Grecs appellent le Perroquet en général Παπαγός. Gesn. Aldrov. Schwenck. Charlet. Ψιττάκος. Rel. Aldrov. Schwenck. Ψιττάκος. Bel. Schwenck. Σιττακος; Φιττακος. Aldrov. Ανδροπογλωσσος. Schwenck.

Les Turcs, DUDI. Gesn. Aldrov.

Les Espagnols, PAPAGAIO. Gesn. Aldrov.

Les Italiens, PAPAGALLO. Gesn. Aldrov. Ils appellent les petits, PERQUETO. Raj.

Les Allemands, PAPPENGEY; SICKUST. Gesn. Aldrov. PAPENGEY; PAPPEGEY; SICKUS. Schwenck. SITTICH. Gesn. Aldrov. Schwenck.

Les Flamands, PAPPENGEY. Aldrov.

Les Illyriens, PAPPASSEK. Gesn. Aldrov.

Les Polonois, PAPUGA. *Gesn. Aldrov.*

Les Anglois, POPPINJAY ou POPPINGEY. *Gesn. Aldrov.* Ils appellent les grands, MACAOS & COCKATOONS : les moyens, PARROTS & POPPINJAYS : & les petits, PEROKEETS. *Willugh. Raj.*

Les Brasiliens, AJURU : ils appellent les petits à longue queue, TUI. *Marcgr. Jonst.*

** I. L'ARA DU BRÉSIL.

Voyez Pl. XIX. Fig. 1.

Psittacus major longicaudus, coccineus ; uropygio dilutè cœruleo ; pennis scapularibus cœruleo & viridi variegatis ; genis nudis, candidis ; rectricibus binis intermediis coccineis, apice dilutè cœruleis, utrinque proximâ primâ medietate obscurè rubrâ, alterâ cyaneâ, quatuor utrinque extimis superne cyaneis, violaceo mixtis, infernè obscurè rubris ARA BRASILIENSIS.

Psittacus puniceus. Barr. Ornith. Class. III. Gen. II. sp. 7.

Psittacus erythroxantus. Gesn. Avi. pag. 720, in qua hujus icon minimè accurata.

Gesn. icon. Avi. pag. 38, in qua eadem icon.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 343.

Jonst. Avi. pag. 23.

Psittacus erythroxantus Ornithologi. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 683.

Psittacus erythroxanthus. Charlet Exer. pag. 74. N°. 15.

Charlet. Onomazt. pag. 67. N°. 15.

Psittacus maximus alter. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 665. hujus icon minimè accurata pag. 666.

Jonst. Avi. pag. 21. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XV.

Psittacus maximus alter Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 73.

Raj. Syn. Avi. pag. 29. N°. 2.

Psittacus maximus alter, vertice capitis compresso. Charlet. Exer. pag. 74. N°. 2.

Charlet. Onomazt. pag. 66. N°. 2.

Psittacus alter Aldrovandi. Klein. Avi. pag. 24. N°. 1.

Aras. Nouv. Voy. de l'Amér. Tom. II. pag. 154, dans laquelle il y a une assez mauvaise figure.

Aras rouge & bleu. Edwards. Tom. IV. pag. CLVIII ; avec une figure exacte Pl. 158.

Arras. Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 247 ; avec une assez mauvaise figure pag. 246. N°. 7.

Grand

Grand Perroquet de Macao. *Alb. Tom. I. pag. 11 ; avec une figure mal coloriée Pl. II.*

Les Allemands l'appellent GEELBER SITTICH. *Schwenck.* ROT-GELBER SITTICH. *Gesn.*

Les Anglois , MACAO. *Willugh.* *Alb.* MACCAW ; COCKATOON. *Willugh.* RED AND YELLOW PARRAT ; GREAT FLAT-CROWN'D PARRAT. *Charlet.* RED AND BLUE MACCAW. *Edwards.*

Ad *Caponis* crassitiem accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes septem pollices & sex lineas aequat, & ad extremos ungues quindecim pollices. Rostrum, duos pollices & quatuor cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est; cauda unum pedem & septem pollices cum novem lineis; pes quatuordecim lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue duos pollices & totidem lineas, intimus sexdecim cum semi lineas; posticorum exterior unum pollicem & undecim lineas, interior tredecim lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput (genis tamen exceptis), collum, partem dorsi supremam, pectus, ven-

Tom. IV.

Il est presque aussi gros qu'un Chapon. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces. Son bec, qui a deux pouces quatre lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche un pouce neuf lignes de long; sa queue un pied sept pouces neuf lignes; son pied quatorze lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, deux pouces deux lignes, l'intérieur seize lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière un pouce onze lignes, & l'intérieur treize lignes. Il a trois pieds dix pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées; s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La tête (si l'on en excepte les joues), le col, la partie supérieure du dos, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un rouge vif. La partie inférieure du dos & le croupion sont d'un bleu clair. Les couvertures du dessus de la

Aa

queue sont de la même couleur en-dessus, & de couleur de rose pâle en-dessous : celles du dessous sont à leur origine de couleur de rose pâle, & terminées de bleu clair, ces deux couleurs se perdant l'une dans l'autre. Les petites couvertures du dessous des ailes sont d'un rouge vif : les grandes sont d'un rouge très-pâle. Les joues & la gorge sont couvertes d'une peau blanche, dégarnie de plumes. Les petites couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos : les moyennes sont d'un rouge vif, ayant leur bout orangé & terminé de verd : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un bleu mêlé d'une légère teinte de violet tout le long de la tige de chaque plume ; & les grandes les plus proches du corps, ainsi que les plumes scapulaires, sont variées de bleu & de verd, le tout mêlé le long de la tige de chaque plume d'une légère teinte de rouge sombre. Les plumes de l'aile sont d'un rouge obscur en-dessous ; mais en-dessus les dix-huit premières sont d'un bleu mêlé tout le long de leur tige d'une teinte de violet, & ont une assez grande partie de leur côté intérieur noirâtre : toutes les autres sont variées de verd, de bleu & de marron-

trem, latera & crura vestiunt pennæ coccineæ. Dorsum infimum & uropygium sunt dilutè cœrulea. Tectrices caudæ superiores superne colores, infernè verò pallidè roseæ : inferiores sunt in exortu pallidè roseo colore tinctæ, dilutè cœruleo terminatæ, duobus istis coloribus sensim atque sensim inter se mixtis. Inferiores alarum tectrices minores sunt coccineæ : majores pallidè rubræ. Genæ & guttur cutē teguntur candidâ, plumis denudatâ. Tectrices alarum superiores minores dorso colores : mediæ coccineæ, versus apicem aurantiæ, viridi terminatæ : majores à corpore remotiores cœruleæ, cum aliqua secundum cujuslibet pennæ scapi longitudinem violacei mixtura ; majores verò corpori finitimæ, sicut & pennæ scapulares, cœruleo & viridi variatæ, aliquid rubri obscuri secundum cujusque pennæ scapi longitudinem admixtum habentes. Remiges sunt subtus obscurè rubræ ; superne verò octodecim primores cœruleæ, secundum ipsarum scapi longitudinem violaceo adumbratæ, & in latere interiore maximâ parte

nigricantes : reliquæ omnes viridi, cœruleo & castaneo-purpureo variegatæ. Remiges omnes scapis donantur nigris. Remix tertia omnium est longissima. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ superne & infernæ coccineæ, apice dilutè cœruleo præditæ: utrinque proximè sequens ab ipsius exortu mediam versus longitudinem usque obscurè rubra, à medietate ad apicem cyanea : quatuor utrinque extimæ cyaneæ, secundum ipsarum scapi longitudinem aliquid violacei admixtum habentes : laterales insuper omnes subtus obscurè rubent. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem multum excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis tredecim pollicum longitudine cedentem. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda candida, in qua nares sitæ sunt. Mandibula superior alba, in unci tamen apice & ad latera circa basin nigra ; inferior penitus nigra. Pedes fusci ; ungues verò nigri. Habitat in *America*. *Ex museo D. Aubry.*

pourpré. La tige de toutes ces plumes est noire. La troisième des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un rouge vif dessus & dessous, & terminées de bleu clair : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est d'un rouge sombre depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur, & bleue delà jusqu'à son bout : les quatre plus extérieures de chaque côté sont d'un bleu mêlé tout le long de leur tige d'une teinte de violet : de plus le dessous de toutes les latérales est d'un rouge obscur. Les deux plumes du milieu de la queue sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de treize pouces que les deux du milieu. La bête du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & blanche, dans laquelle sont placées les narines. Le demi-bec supérieur est blanc, excepté le bout de son crochet & ses côtés vers sa bête, qui sont noirs ; l'inférieur est de cette dernière couleur. Les pieds sont bruns ; & les ongles noirs. On le trouve en *Amerique*. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

** 2. L'ARA DE LA JAMAÏQUE.

Psittacus major longicaudus, dilutè coccineus; uropygio dilutè cœruleo; pennis scapularibus luteis, viridi terminatis; genis nudis, candidis; rectricibus superne cyaneis, violaceo admixto, infernè obscurè rubris; binis intermediis utrinque proximâ primâ medietate obscurè rubrâ ARA JAMAÏCENSIS.

Psittacus caudâ cuneiformi, temporibus nudis rugosis. *Erythrocyaneus*.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 37. sp. 1.

Psittacus capite cœruleo. Klein. Avi. pag. 24. N°. 3.

Psittacus maximus coccineo varius, caudâ productâ. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 472.*

Psittacus maximus Marcgravii. Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 145.

Psittacus major diversicolor, Maccaw, seu Macao dictus. *Willughb. Ornith. pag. 73.*

Psittacus Erythrocyaneus. Gesn. Avi. pag. 721, in qua hujus icon non satis accurata.

Gesn. icon. Avi. pag. 32, in qua eadem icon.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 343.

Jonst. Avi. pag. 23.

Charlet. Exer. pag. 74. N°. 14.

Charlet. Onomast. pag. 67. N°. 14.

Psittacus Erythrocyaneus Ornithologi. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 683.

Araracanga Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 206, in qua hujus icon minùs accurata.

Jonst. Avi. pag. 141. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 59.

Araracanga Marcgravii. Raj. Syn. Avi. pag. 29. N°. 3.

Perroquet de la Jamaïque. Alb. Tom. II. pag. 11; avec une figure très-mal coloriée Pl. 17.

Les Grecs l'appellent Ψιττακὸς Ποικίλος. Schwenck.

Les Allemands, ROTT-BLAVER PAPAGEY; ROTT-BLAVER SITTICH. Schwenck.

Les Anglois, MACAO ou MACCAW. Willugh. MACAW FROM JAMAICA. Alb. RED AND BLEW PARROT; RAIN-BOW PARROT. Charlet.

Les François de la Guiane, ARRA ROUGE. Barr.

Les Indiens de la Guiane, CONNORO. Barr.

Les Brasiliens, ARARACANGA. Marcgr. Jonst.

Il est de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le Crassitie præcedentem adæquat. Ipsius longitudo à

rostri apice ad caudæ extremitatem duos pedes octo pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues quindecim pollices. Rostrum, duos pollices & quatuor lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est; cauda unum pedem octo pollices & novem lineas; pes quatuordecim lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue duos pollices & totidem lineas, intimus sexdecim lineas; posticorum extimus unum pollicem & undecim lineas, intimus tredecim lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum decem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ tertiam circiter longitudinis caudæ partem attingunt. Caput (genis tamen exceptis), collum, supremam dorsi partem, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ dilutè coccineæ. Dorsum infimum & uropygium sunt dilutè cœrulea. Tectrices caudæ superiores superne concolores, infernè verò pallidè roseo colore tinctæ: inferiores sunt in exortu pallidè roseæ, dilutè cœruleo termi-

bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces. Son bec, qui a deux pouces quatre lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche un pouce neuf lignes de long; sa queue un pied huit pouces neuf lignes; son pied quatorze lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, deux pouces deux lignes, l'intérieur seize lignes; l'extérieur de ceux de derrière un pouce onze lignes, & l'intérieur treize lignes. Il a trois pieds dix pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête (si l'on en excepte les joues), le col, la partie supérieure du dos, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un beau rouge clair. La partie inférieure du dos & le croupion sont d'un bleu clair. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur en-dessus, & de couleur de rose pâle en-dessous: celles du dessous sont à leur origine de couleur de rose pâle, & terminées de bleu clair, ces deux couleurs se perdant l'une dans l'autre. Les petites couvertures

ou dessous des ailes sont d'un beau rouge : les grandes sont d'un rouge pâle. Les joues & la gorge sont couvertes d'une peau blanche, dégarinée de plumes. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un rouge vif : les moyennes sont de la même couleur, excepté leur bout, qui est orangé & terminé de verd : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un bleu mêlé d'une légère teinte de violet tout le long de la tige de chaque plume ; enfin les grandes les plus proches du corps, ainsi que les plumes scapulaires, sont jaunes & terminées de verd. Les plumes de l'aile sont en-dessous d'un rouge obscur ; mais en-dessus les dix-huit premières sont d'un bleu mêlé tout le long de leur tige d'une teinte de violet, & ont une assez grande partie de leur côté intérieur noirâtre : toutes les autres sont variées de verd, de bleu & de marron-pourpré. La tige de toutes ces plumes est noire. La troisième des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un rouge obscur en-dessous ; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un bleu clair : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est d'un rouge sombre depuis son origine

nata, duobus istis coloribus sensim atque sensim inter se mixtis. Inferiores alarum rectrices minores eleganti rubro imbutæ : majores pallidè rubræ. Genas & guttur obvestit curis candida, plumis denudata. Rectrices alarum superiores minores sunt coccineæ : mediæ concolores, versùs apicem aurantiæ, viridi terminatæ : majores à corpore remotiores cœruleæ, aliquid violacei secundum cujuslibet pennæ scapi longitudinem admixtum habentes ; majores tandem corpori viciniore, sicut & scapulares pennæ, luteæ, viridi terminatæ. Remiges sunt subtus obscurè rubræ ; superne verò octodecim primores cœruleæ, secundum ipsarum scapi longitudinem violaceo adumbratæ, & in lateris interioris maxima parte nigricantes : reliquæ omnes viridi, cœruleo & castaneo-purpureo variegatæ. Remiges omnes scapis nigris præditæ. Remix tertia reliquarum omnium longitudinem excedit. Caudam componunt duodecim rectrices subtus obscurè rubræ ; superne verò binæ intermediae sunt dilutè cyaneæ : utrinque proximè sequens ab ipsius

extortu mediam versùs longitudinem usque obscurè rubra, à medietate ad apicem cyanea: quatuor utrinque extimæ cyaneæ, cum aliqua secundum ipsarum scapi longitudinem violacei mixtura. Binæ rectrices intermediæ lateraliū longitudinem multum excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis tredecim pollicum & sex linearum longitudine cedentem. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda candida, in qua nares collocatæ. Oculorum irides lutæ. Mandibula superior alba, in unci tamen apice & ad latera circa basim nigra; inferior penitus nigra. Pedes fusci; ungues verò nigri. Habitat in *Jamaica, Guiana & Brasilia. Ex museo D. Aubry.*

jusque vers la moitié de sa longueur, & bleue de là jusqu'à son bout : les quatre plus extérieures de chaque côté sont d'un bleu mêlé tout le long de leur tige d'une légère teinte de violet. Les deux plumes du milieu de la queue sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte que les deux du milieu de treize pouces six lignes. La bête du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & blanche, dans laquelle sont placées les narines. L'iris des yeux est jaune. Le demi-bec supérieur est blanc, excepté le bout de son crochet & ses côtés vers sa bête, qui sont noirs; l'inférieur est de cette dernière couleur. Les pieds sont bruns; & les ongles noirs. On le trouve à la *Jamaïque*, dans la *Guiane* & au *Bresil*. Du cabinet de *M. l'Abbé Aubry.*

3. L'ARA BLEU ET JAUNE DE LA JAMAÏQUE.

Psittacus major longicaudus, superne cyaneus, infernè croceus; genis nudis, candidis; rectricibus superne cyaneis, infernè croceis *ARA JAMAICENSIS CYANEO-CROCEA.*

Psittacus maximus coeruleo varius, caudâ productâ. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 472.*

Plittacus coeruleo luteus. Klein. Avi. pag. 24. N°. 2.

Femelle du Perroquet de Macao. *Alb. Tom. III. pag. 5 ; avec une figure passable Pl. 10.*

Les Anglois l'appellent BLEW MACCAW. Alb.

Il est à peu près de la grosseur des précédens. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ deux pieds six pouces, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces. Son bec, qui a deux pouces six lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche deux pouces de long ; sa queue environ un pied six pouces ; son pied quatorze lignes ; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, deux pouces trois lignes, l'intérieur un pouce cinq lignes ; l'extérieur de ceux de derrière un pouce onze lignes, & l'intérieur quatorze lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête, le dessus du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un beau bleu. Les joues & la gorge sont couvertes d'une peau blanche, dé-garnie de plumes. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes,

Cum præcedentibus crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & sex circiter pollices explet, & ad extremos ungues sexdecim pollices. Rostrum, duos pollices & sex lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque duos pollices longum est ; cauda unum pedem & sex circiter pollices ; pes quatuordecim lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue duos pollices cum tribus lineis, intimus unum pollicem & quinque lineas, posticorum extimus unum pollicem & undecim lineas, intimus quatuordecim lineas. Alæ complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Capitis superior pars, collum superius, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes & superiores caudæ rectrices eleganti tinguntur cyaneo. Genas & guttur obtegit cutis alba, plumulis destituta. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, inferiores

inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus cooperientes croceo tinguntur colore. Remiges alarum sunt superne dorso concolores, marginibus interioribus nigris præditæ, subtus verò obscurè luteæ. Cauda duodecim constat rectricibus superne cyaneis, infernè croceis. Binæ intermediæ lateralium longitudinem multum superant; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda candicans, in qua nares sitæ sunt. Rostrum, unguesque nigri; pedes verò saturatè cinerei. Habitat in *Jamaica*.

les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un jaune de safran. Les plumes de l'aile sont en-dessus de la même couleur que le dos, & bordées intérieurement de noirâtre; mais en-dessous elles sont d'un jaune obscur. La queue est composée de douze plumes d'un beau bleu en-dessus, & d'une couleur de safran en-dessous. Les deux du milieu sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. La base du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & blanchâtre, dans laquelle les narines sont placées. Le bec & les ongles sont noirs; & les pieds d'un cendré foncé. On le trouve à la *Jamaïque*.

** 4. L'ARA BLEU ET JAUNE DU BRÉSIL.

Voyez Pl. XX.

Psittacus major longicaudus, superne cyaneus, infernè croceus; syncipite viridi; tæniâ transversâ sub gutture nigrâ; genis nudis, candidis, lineis plumosis nigris striatis; rectricibus infernè luteis, superne cyaneis, lateralibus interioribus ad violaceum inclinantibus ARA BRASILIENSIS CYANEO - CROCEA.

Psittacus caudâ cuneiformi, temporibus nudis, lineis plumosis. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 37. sp. 2.*

Tom. IV,

Bb

- Psittacus vertice viridi, caudâ cyaneâ. Klein. Avi. pag. 24. N°. 4.*
Psittacus cyanocroceus. Schwenck. Avi. Sil. pag. 343.
Psittacus maximus cyanocroceus. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 663. hujus icon non satis accurata pag. 664.
Jonst. Avi. pag. 21. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XV, sub titulo, Psittacus maximus.
Charlet. Exer. pag. 74. N°. 1.
Charlet. Onomazt. pag. 66. N°. 1.
Psittacus maximus cyanocroceus Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 72. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XV.
Raj. Syn. Avi. pag. 28. N°. 1.
Raj. Syn. Avi. pag. 181. N°. 5.
Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 296. N°. V.
Psittacus maximus cyanocroceus Jonstoni. Barr. Ornith. Class. III. Gen. II. sp. 6.
Psittacus maximus alter Jonstoni. Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 145.
Ararauna Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 206.
Jonst. Avi. pag. 141.
Ararauna Brasiliensibus Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 73.
Canide Lerii. Raj.
Aras bleu & jaune. Edwards. Tom. IV. pag. CLIX; avec une figure exacte Pl. 159.
Les François de la Guiane l'appellent ARRA BLEU. Barr.
Les Allemands, ROL-GEELBER PAPAGEY. Schwenck.
Les Anglois, MACAO. Willugh. GREAT MACCAW. Sloane. Raj. BLUE AND YELLOW MACCAW. Edwards.
Les Indiens de la Guiane, KARARAOUA. Barr.
Les Brasiliens, ARARAUNA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Barr.

Il est à peu près de la grosseur des précédens. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied quatre pouces six lignes. Son bec, qui a deux pouces six lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche deux pouces de long; sa queue un pied sept pouces; son pied quatorze lignes; le

Præcedentes crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem duos pedes septem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem quatuor pollices & sex lineas. Rostrum, duos pollices & sex lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque duos pollices longum est; cauda unum pedem &

septem pollices; pes quatuordecim lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue duos pollices & quatuor lineas, intimus unum pollicem & sex lineas; posticorum exterior duos pollices, interior quindecim lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuor pedum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Synciput obscuro tingitur viridi; qui color ad medium capitis verticem usque & nonnihil ultra ad capitis latera protenditur. Reliquum caput superius, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne obtegunt, testricesque caudæ superiores & inferiores eleganti cyaneo tinguntur. Genas & guttur cooperit cutis candida, pennis denudata; in utraque tamen gena novem extant lineæ plumulis nigris conflata; quæ omnes lineæ ab oris angulis oriuntur, & ex istis tres infra oculos ductur, & versùs occipitium usque protenduntur; sex autem reliquæ narem inter & oculum assurgunt. Infra guttur latiuscula extat

doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, deux pouces quatre lignes, l'intérieur un pouce six lignes; l'extérieur de ceux de derrière deux pouces, & l'intérieur un pouce trois lignes. Il a quatre pieds de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. Le synciput est d'un verd obscur; cette couleur s'étend jusqu'au milieu du sommet de la tête & un peu plus loin sur ses côtés. Le reste du dessus de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont d'un beau bleu. Les joues & la gorge sont couvertes d'une peau blanche, décorée de plumes: il y a seulement sur chaque joue neuf lignes formées par de petites plumes noires: toutes ces lignes partent des coins de la bouche; & trois d'entr'elles s'étendent jusque vers l'occiput, en passant par-dessous les yeux, tandis que les six autres remontent entre la narine & l'œil. Au-dessous de la gorge est une assez large bande transversale noire, bordée dans sa partie inférieure d'un peu de verd obscur. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre,

les côtés, les jambes & les couvertures du dessous des ailes sont d'un jaune de safran. Quelques individus de cette espèce ont quelques plumes de cette dernière couleur mêlées aux couvertures supérieures de leurs ailes. Les plumes de l'aile sont en-dessus d'un bleu-violet, & bordées intérieurement de noirâtre, mais en-dessous elles sont d'un jaune obscur, & bordées de noirâtre tout autour. La queue est composée de douze plumes d'un jaune sombre en-dessous; mais en dessus les deux du milieu sont bleues: toutes les latérales sont de la même couleur, mais leur côté intérieur tire un peu sur le violet, & est bordé de noirâtre vers l'origine de la plume seulement. Les deux plumes du milieu de la queue sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est d'un pied plus courte que les deux du milieu. La prunelle des yeux est noire; leur iris est d'un jaune pâle; & les paupières sont bordées de noir. L'arête du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & blanchâtre, dans laquelle sont les narines. Le bec & les ongles sont noirs; & les pieds d'un cendré foncé.

tænia transversa nigra; paucos viridi obscuro in parte infima fimbriata. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & rectrices alarum inferiores crocei sunt coloris. In quibusdam hujus speciei individuis quædam sunt pennæ similiter crocæ superioribus alarum rectricibus admixtæ. Remiges sunt superne cyaneo-violacæ, marginibus interioribus nigricantibus, subtus verò obscurè luteæ, in tota circumferentia nigricante marginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices subtus obscurè luteæ; superne verò binæ intermediæ sunt cyaneæ: laterales omnes concolores, sed in latere interiore nonnihil ad violaceum inclinantes, & versùs ipsarum exortum tantum nigricante marginatæ. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem multum excedunt, laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis unius pedis longitudine cedentem. Oculorum pupilla nigra; ipsorum irides pallidè luteæ; palpebræ nigro fimbriatæ. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda candicans,

in qua nares sunt collocata. On le trouve à la Jamaïque,
 Rostrum, unguisque nigri; dans la Guiane & au Brésil. Du
 pedes verò saturatè cinerei. cabinet de M. de Reaumur.
 Habitat in Jamaica, Guiana & Brasilia. Ex museo
 Realmuriano.

5. L'ARA VARIÉ DES MOLUQUES.

Psittacus major longicaudus, superne saturatè cyaneus, infernè
 saturatè viridis, rubro variegatus; capite superiore nigro;
 collo superiore torque viridi & rubro cincto; collo inferiore
 & pectore dilutè rubris; rectricibus superne viridibus,
 subtus rubris, marginibus nigricantibus ARA
 MOLUCCENSIS VARIA.

Psittacus Orientalis, exquisitus, Loeri dictus. *Seb. Vol. I. pag. 63. hu-*
jus icon accurata (nisi essent digiti tres antici) Tab. XXXVI. I. fig. 4.
Psittacus capite nigro, collari viridi, Loeri dictus. Klein. Avi. pag. 25.
 N°. 16.

Craffitie *Psittacum Amazonicum* paululum antecel-
 lit. Ipsi longitudo ab apice
 rostri ad caudam extremam
 quatuordecim circiter polli-
 ces æquat, & ad extremos
 ungues decem pollices. Ros-
 trum, unum pollicem cras-
 sum, ab ipsius unco ad oris
 angulos usque decem lineas
 longum est; cauda sex pol-
 lices cum novem lineis; pes
 undecim lineas; digitorum
 anticorum extimus cum un-
 gue unum pollicem & sex
 lineas, intimus tredecim li-
 neas; posticorum exterior
 quindecim lineas, interior

Il est un peu plus gros qu'un
Perroquet Amazone. Sa lon-
 gueur depuis le bout du bec
 jusqu'à celui de la queue est
 d'environ quatorze pouces, &
 jusqu'à celui des ongles de dix
 pouces. Son bec, qui a un
 pouce d'épaisseur, a depuis son
 crochet jusqu'aux coins de la
 bouche dix lignes de long; sa
 queue six pouces neuf lignes;
 son pied onze lignes; le doigt
 extérieur de devant, joint avec
 l'ongle, un pouce six lignes,
 l'intérieur treize lignes; l'exté-
 rieur de ceux de derriere quinze
 lignes, & l'intérieur neuf lignes.
 Ses ailes, lorsqu'elles sont

pliées, s'étendent environ jusqu'au quart de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est noire. Le dessus du col est entouré d'un collier mêlé de verd & de rouge. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un bleu foncé. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un très-beau rouge clair. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd foncé, varié de rouge. Les plumes de l'aile sont d'un bleu foncé. La queue est composée de douze plumes vertes en-dessus, rouges en-dessous & bordées de noirâtre. Les deux du milieu sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. *Seba* n'a rien dit de la couleur du bec, des pieds & des ongles. On le trouve aux *Molucces*.

novem lineas. Alæ complicatae quartam circiter longitudinis caudæ partem attingunt. Capitis superior pars nigro tingitur colore. Collum superius cingit torquis viridi & rubro mixtus. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne obtegunt, superioresque caudæ rectrices sunt saturatè cyanæ. Guttur, collum inferius & pectus elegantissimo tinguntur rubro diluto. Venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores saturato imbuuntur viridi, rubro variegato. Remiges sunt saturatè cyanæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus superne viridibus, subtus rubris, nigricante marginatis. Binæ intermediæ lateralium longitudinem multum excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque brevior. De rostri, pedum, unguumque colore nulla apud *Sebam* mentio facta est. Habitat in *Moluccis Insulis*.

** 6. L'ARA VERD DU BRÉSIL.

Plittacus major longicaudus, viridis; syncipite & tæniâ utrinque secundum maxillam inferiorem castaneo-purpurascens; tibis; vertice cœruleo; marginibus alarum coccineis;

calcaneis rubro circumdati; genis nudis, candidis, lineis plumosis nigris striatis; rectricibus superne in exortu viridibus, apice coeruleis, subtus obscurè rubris . . . ARA BRASILIENSIS VIRIDIS.

Ara vert du Brésil. *Edwards. Glanur. pag. 41. Chap. XIX; avec une figure assez exacte Pl. 229.*

Les Anglois l'appellent BRASILIAN GREEN MACCAW. *Edwards.*

Cum *Psittaco Guineensi cinereo* crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & quinque pollices aequat, & ad extremos ungues undecim pollices & novem lineas. Rostrum, unum pollicem & novem lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque octodecim lineas longum est; cauda octo pollices cum sex lineis; pes undecim lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & decem lineas, intimus quindecim lineas; posticorum extimus unum pollicem & septem lineas, intimus decem lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & totidem pollicum intervallo distant; alae verò complicatae ad tertiam circiter longitudinis caudae partem extenduntur. Synciput castaneo-purpureo imbuatur

Il est à peu près de la grosseur du *Perroquet cendré de Guinée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces neuf lignes. Son bec, qui a un pouce neuf lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche dix-huit lignes de long; sa queue huit pouces six lignes; son pied onze lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce dix lignes, l'intérieur quinze lignes; l'extérieur de ceux de derrière un pouce sept lignes, & l'intérieur dix lignes. Il a deux pieds deux pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Le synciput est d'un marron-pourpré. Il y a de chaque côté de la tête une bande de la même couleur, qui s'étend tout le long de la mâchoire inférieure, & se termine en une pointe tendante vers les coins

de la bouche. Le sommet de la tête est bleu; & cette couleur dégénere peu à peu en verd en descendant vers le col. Les joues sont couvertes d'une peau blanche, dégarinée de plumes; il y a seulement sur chacune d'elles quelques lignes formées par de petites plumes noires: toutes ces lignes partent des coins de la bouche, & quelques-unes s'étendent jusque vers l'occiput, en passant par-dessous les yeux, tandis que les autres remontent entre la narine & l'œil. La gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, la poitrine, le ventre & les côtés sont verds. Les jambes sont de la même couleur, excepté dans le bas auprès du talon, où elles sont entourées d'un anneau de plumes rouges. Les petites couvertures du dessous des aîles sont rouges, & tachetées de verd pâle: les grandes sont rouges dans les uns, & noirâtres dans d'autres. Le bord de l'aîle est d'un rouge vif. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont vertes: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un très-beau bleu. Les grandes plumes des aîles sont en-dessus

colore. In utroque capitis latere tania extat concolor; secundum maxillæ inferioris longitudinem protensa, & in acumen versus oris angulos ductum desinens. Vertex capitis cœruleus; qui color sensim atque sensim, versus collum procedendo, viridescit. Genas cooperit cutis candida, pennis denudata; in utraque tamen gena quædam extant lineæ plumulis nigris conflata; quæ omnes lineæ ab oris angulis ortæ sunt, & ex istis quædam infra oculos ducuntur, & versus occipitium usque protenduntur, dum reliquæ narem inter & oculum assurgunt. Guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem & latera vestiunt pennæ virides. Scapulares, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Crura sunt quoque viridia; attamen ipsorum infima pars prope calcaneum annulo pennis rubris conflato circumdatur. Inferiores alarum tectrices minores sunt rubræ, viridi pallido maculata: majores in aliis rubræ, in alteris nigricantes. Alarum margines coccineæ. Ipsarum tectrices superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ;

timæ, virides : majores à corpore remotiores amoenissimo cyaneo tinctæ. Remiges majores superne similiter cyaneæ, attamen in lateris interioris maxima parte nigræ, subtus verò in latere exteriori nigricantes, in interiori obscurè rubræ : minores superne viridi-flavicantes, infernè obscurè rubræ. Caudam componunt duodecim rectrices subtus obscurè rubræ, superne verò in exortu virides, qui color viridis sensim atque sensim, versùs rectricis extremitatem procedendo, cœrulescit ; cœruleus autem color eò majus spatium occupat, quò rectrix fit exterior. Binæ rectrices intermedia lateralium longitudinem multùm excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda candida, in qua nares sitæ sunt. Oculorum pupilla nigra ; ipsorum irides aureo colore imbutæ. Rostrum, unguisque nigri ; pedes verò fusci. Habitat in *Brasilia*. Speciem istam *Parisiis* vivam observavi.

de cette dernière couleur, ayant la plus grande partie de leur côté intérieur noir ; & en-dessous elles sont noirâtres du côté extérieur & d'un rouge terni du côté intérieur : les moyennnes sont d'un verd-jau-nâtre en-dessus, & d'un rouge terni en-dessous. La queue est composée de douze plumes d'un rouge terni en-dessous ; mais en-dessus elles sont vertes à leur origine, & cette couleur se change graduellement en bleu en approchant de l'extrémité de la plume, le bleu occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus extérieure. Les deux plumes du milieu de la queue sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. La bête du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & blanche, dans laquelle sont les narines. La prunelle des yeux est noire ; & leur iris est d'une couleur d'or. Le bec & les ongles sont noirs ; & les pieds bruns. On le trouve au *Bresil*. Je l'ai vu vivant à *Paris*.

7. L'ARA VERD ET ROUGE DU BRÉSIL.

Psittacus major longicaudus, saturatè viridis; maculâ in syncipite fuscâ; vertice viridi-cœrulescente; maculâ in alarum exortu miniatâ; genis nudis, candidis, lineis plumosis nigris striatis; rectricibus superne primâ medietate viridibus, alterâ cyaneis, subtus saturatè rubris ARA BRASILIENSIS ERYTHROCHLORA.

Psittacus minor, prolixâ caudâ, maculis flammeis conspersus. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 145.*

Maracana Brasiliensibus (secunda). *Marcgr. Hist. Br. pag. 207. Jonst. Avi. pag. 142.*

Maracana Brasiliensibus (secunda) *Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 74.*
Maracana altera Brasiliensibus Marcgravii. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 297. N^o. VI.

Maracana Araræ, id est, Macai species minor. *Raj. Syn. Avi. pag. 29. N^o 5.*

Arara & Macao. Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 556.

Les François de la Guiane l'appellent PERRICHE-ARRA. Barr.

Les Anglois de la Jamaïque, SMALL MACCAW. Sloane.

Les Brasiiliens, MARACANA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Barr.

Il est de la grosseur du *Perroquet Amazone*, mais il a la queue beaucoup plus longue & le bec beaucoup plus épais. Le sommet de la tête est d'un verd-bleuâtre. Sur le synciput est une petite tache brune. Les joues sont couvertes d'une peau blanche, dégarnie de plumes; il y a seulement sur chacune d'elles quelques lignes formées par de petites plumes noires: toutes ces lignes partent des coins de la bouche, & quelques-unes s'étendent jusque vers l'occiput, en passant par-dessous les yeux, tandis que les autres remontent

Psittacum Amazonicum crassitie adæquat, sed caudâ multò longiori gaudet, & crassiori rostro donatur. Vertex capitis ex viridi cœrulescit. In syncipite exigua extat macula fusca. Genas obtegit cutis candida, pennis denudata; in utraque tamen gena quædam extant lineæ plumulis nigris conflata; quæ omnes lineæ ab oris angulis oriuntur, & ex istis quædam infra oculos ducuntur, & versùs occipitium usque protenduntur, dum reliquæ narè inter & oculum

assurgunt. Capitis posterior pars, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crura, pennæ scapulares, tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniores, tectricesque caudæ superiores & inferiores viridi saturato tinguntur. In utriusque tamen alæ exortu macula adest miniata. Pennæ alas subtus obtegentes sunt rubræ. Tectrices alarum superiores majores à corpore remotiores obscurè cœruleæ. Remiges majores superne concolores, attamen in lateris interioris maxima parte nigricantes, subtus verò exterius nigricantes, interiùs rubræ : minores superne saturatè virides, infernè rubræ. Cauda duodecim constat rectricibus subtus rubris, superne verò ab ipsarum exortu mediani versùs longitudinem usque viridibus, à medietate ad apicem cyaneis. Binæ intermediæ lateraliùs longitudinem multùm excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum. Basim mandibulæ superioris circumdat cutis nuda candida, in qua nares sitæ sunt. Ocu-

entre la narine & l'œil. Le derrière de la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les plumes scapulaires, les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, & celles du dessus & du dessous de la queue sont d'un verd foncé. Il y a cependant à l'origine de chaque aile une tache d'un beau rouge. Les couvertures du dessous des ailes sont rouges. Les grandes du dessus les plus éloignées du corps sont d'un bleu sombre. Les grandes plumes de l'aile sont en-dessus de cette dernière couleur, ayant la plus grande partie de leur côté intérieur noirâtre, & en-dessous elles sont noirâtres du côté extérieur, & rouges du côté intérieur : les moyennes sont d'un verd foncé en-dessus, & rouges en-dessous. La queue est composée de douze plumes rouges en-dessous ; mais en-dessus elles sont vertes depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & bleues de-là jusqu'à leur bout. Les deux du milieu sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. La bête du de-

mi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & blanche, dans laquelle sont placées les narines. La prunelle des yeux est noire; & leur iris est jaunâtre. Le bec & les ongles sont noirs; & les pieds bruns. On le trouve à la Jamaïque, dans la Guiane & au Brésil.

lorum pupilla nigra; ipsorum irides flavescentes. Rostrum, unguisque nigri; pedes verò fusci. Habitat in *Jamaica*, *Guiana* & *Brasilis*.

** 8. LE KAKATOES.

Voyez Pl. XXI.

Psittacus major brevicaudus, cristatus, niveus; capitis vertice nudo; remigibus majoribus & rectricibus lateralibus interioribus primâ medietate sulphureis CACATUA.

Psittacus albus cristatus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 668. hujus icon non satis accurata pag. 667.*

Jonst. Avi. pag. 22. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XV.

Charl. t. Exer. pag. 74. N^o. 3.

Charlet. Onomast. pag. 66. N^o. 3.

Psittacus albus cristatus Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 74. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XV.

Raj. Syn. Avi. pag. 30. N^o. 1.

Kakatoeba tota alba. Klein. Avi. pag. 24. N^o. 6.

Les Anglois l'appellent WHITE CRESTED PARROT. Willugh.

Il est à peu près de la grosseur d'une Poule. Sa longueur depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue est de dix-huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces. Son bec, qui a deux pouces d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche quinze lignes de long; sa queue six pouces; son pied dix lignes; le doigt extérieur de de-

Crassitie Gallinam circiter aequat. Ipsius longitudo à capitis vertice ad caudam extremam octodecim pollices explet, & ad extremos unguis quindecim pollices. Rostrum, duos pollices crassum, ab ipsius unco ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda sex pollices; pes decem lineas; digitorum anticorum extimus

cum ungue duos pollices ,
intimus octodecim lineas ;
posticorum extimus unum
pollicem & novem lineas ,
intimus tredecim lineas. Alis
expansis , extremitates ma-
jorum remigum trium pe-
dum intervallo distant ; alæ
verò complicatæ ad duas
tertias longitudinis caudæ
partes usque protenduntur.
Per universum corpus pen-
nis vestitur niveis , exceptis
tamen quibusdam rectrici-
bus caudæ inferioribus ele-
ganti sulphureo colore tinctis.
Remiges omnes eodem
imbuuntur colore niveo ; at-
tamen majores in latere in-
teriore sunt ab ipsarum exor-
tu versùs duas tertias longi-
tudinis partes usque sulphu-
reæ. Duodecim rectricibus
cauda conflatur : binæ inter-
mediæ eodem ac corpus ni-
veo candore nitent : laterales
omnes concolores , attamen
in latere interiore ab ip-
sarum exortu mediam versùs
longitudinem usque sulphu-
reæ. Vertex capitis plumis
penitus denudatur ; sed lon-
gioribus circumdatur pennis
elegantem efficientibus cristam ,
quam Avis ad libitum
erigere aut componere po-
test. Crista autem quinque
pollices longa est. Dum Avis

avant , joint avec l'ongle , deux
pouces , l'intérieur dix-huit lig-
nes ; l'extérieur de ceux de der-
rière un pouce neuf lignes , &
l'intérieur treize lignes. Il a
trois pieds de vol ; & ses aîles ,
lorsqu'elles sont pliées , s'éten-
dent jusqu'aux deux tiers de la
longueur de la queue. Tout son
corps est couvert de plumes
d'un blanc de neige , si l'on en
excepte quelques-unes des cou-
vertures du dessous de la queue ,
qui sont d'une belle couleur de
soufre. Toutes les plumes de
l'aîle sont du même blanc ; ce-
pendant le côté intérieur des
grandes est d'une couleur de
soufre depuis l'origine de la
plume jusque vers les deux tiers
de sa longueur. La queue est
composée de douze plumes : les
deux du milieu sont du même
blanc que le corps : toutes les
latérales sont de la même cou-
leur , excepté leur côté inté-
rieur , qui est d'une couleur de
soufre depuis l'origine de cha-
que plume jusque vers la moitié
de sa longueur. Le sommet de
la tête est nud ; mais il est en-
touré de longues plumes , qui
forment une belle hupe , que
l'Oiseau peut redresser ou abaîs-
ser à volonté. Cette hupe
a cinq pouces de long. Lors-
qu'elle est relevée , les plumes
qui la composent , représentent

par leur arrangement un fer à cheval. Alors les plumes des côtés du col se relevent aussi, & leurs extrémités forment ensemble sur le col un arc de cercle. Lorsque la hupe est abaissée, les plumes des côtés de la tête s'élèvent au-dessus d'elle, & celles des joues se retournent en-devant, & viennent couvrir entièrement le demi-bec inférieur. Les yeux sont noirs & entourés d'une peau nue, d'un blanc de lait. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & noire, dans laquelle sont placées les narines. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve aux *Molucces*. Je l'ai vu vivant à *Paris*.

eam tenet erectam, pennæ illam constituentes ita sunt dispositæ, ut ferri equini formam representent. Tunc pennæ colli latera vestientes sunt similiter erectæ, & ipsarum extremitates in collo superiore arcum circuli simul efformant. Dum crista componitur, pennæ capitis latera cooperientes supra cristam ipsam eriguntur, & pennæ genas vestientes antrorsum reflectuntur, inferioremque mandibulam penitus obtinent. Oculi nigri sunt, illosque ambit cutis nuda, candore lacteo tincta. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda nigra, in qua nares sitæ sunt. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Moluccis Insulis*. Speciem istam *Lutetiæ Parisiorum* vivam observavi.

** 9. LE KAKATOES A HUPE JAUNE.

Psittacus major brevicaudus, cristatus, albus, infernè sulphureo adumbratus; crista sulphureâ; maculâ infra oculos saturatè sulphureâ; rectricibus lateralibus interiùs primâ medietate sulphureis. . . . CACATUA LUTEO CRISTATA.

Psittacus albus Galeritus. Frisch. hujus icon satis accurata Tab. 50.

Avis Kakatoeha Orientalis, ex Insulis Moluccis, cristata, candidissima & sulphurea. Seb. Vol. I. pag. 94. hujus icon non satis accurata Tab. LIX. fig. 1.

Kakatoeha alba. Klein. Avi. pag. 24. No. 5.

Cockatoo ou Perroquet à crête blanche. *Alb. Tom. III. pag. 6; avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl. 12.*

Les Allemands l'appellent GROSSE WEISSE PAPAGEY, ou CACACTOU. Frisch.

Les Anglois, CRESTED PARROT, ou COCKATOO. Alb.

Craffitie Psittacum Amazonicum paululum antecellit. Ipsi longitudine à capitis vertice ad caudæ extremitatem quatuordecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices. Rostrum, sexdecim lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda quatuor pollices cum tribus lineis; pes decem lineas; digitorum anticorum exterior cum ungue octodecim lineas, interior unum pollicem; posticorum extimus quindecim lineas, intimus novem lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & septem pollicum; alæ verò complicatæ tres quartas longitudinis caudæ partes pertingunt. In universo corpore pennis vestitur albis; corpus solummodo inferius sulphureo adumbratur colore. Remiges omnes albes; attamen majores in latere interiore sunt ab ipsarum exortu versus duas tertias longitudinis partes usque sulphureæ. Caudam componunt duodecim rectrices,

Il est un peu plus gros que le Perroquet Amazone. Sa longueur depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue est de quatorze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces. Son bec, qui a seize lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche onze lignes de long; sa queue quatre pouces trois lignes; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, dix-huit lignes, l'intérieur un pouce; l'extérieur de ceux de derrière quinze lignes, & l'intérieur neuf lignes. Il a deux pieds sept pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes blanches; le dessous du corps a seulement une légère nuance de couleur de soufre. Toutes les plumes de l'aile sont blanches; cependant le côté intérieur des grandes est d'une couleur de soufre depuis l'origine de la plume jusque vers les deux tiers de sa longueur. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont du même blanc que le dessus du corps:

toutes les latérales sont de la même couleur, excepté leur côté intérieur, qui est d'une couleur de soufre depuis l'origine de chaque plume jusque vers la moitié de sa longueur, ou même un peu au-delà. De chaque côté de la tête est une assez grande tache ronde, d'une couleur de soufre foncée, placée au-dessous des yeux. Le sommet de la tête est entouré de longues plumes d'une très-belle couleur de soufre, dont les extrémités sont un peu recourbées vers le haut, & qui forment une belle hupe, que l'Oiseau peut redresser ou abaisser à volonté. Cette hupe a trois pouces six lignes de long. Lorsqu'elle est relevée, les plumes qui la composent, représentent par leur arrangement un fer à cheval fort étroit. Alors les plumes des côtés du col se relevent aussi, & leurs extrémités forment ensemble sur le col un arc de cercle. Lorsque la hupe est abaissée, les plumes des côtés de la tête s'élèvent un peu au-dessus d'elle, & celles des joues se retournent en-devant, & viennent couvrir entièrement le demi-bec inférieur. Les yeux sont entourés d'une peau nue & blanche : leur prunelle est noire ; & leur iris est rougeâtre. La bête du demi-bec supérieur est

quarum binæ intermediæ eodem ac corpus superius albore nitent : laterales omnes concolores, attamen in latere interiore ab ipsarum exortu mediam versus longitudinem usque vel etiam nonnihil ultra sulphureæ. In utroque capitis latere majuscula extat macula rotunda, saturatè sulphurea, infra oculos posita. Vertex capitis longioribus circumdatur pennis amœnissimo sulphureo colore tinctis, quarum extremitates sursum nonnihil reflectuntur, quæque elegantem efficiunt cristam, quam Avis ad libitum erigere aut componere potest. Crista autem tres pollices & sex lineas longa est. Dum eam Avis tenet erectam, pennæ quibus illa conflatur, ita sunt dispositæ ut strictioris ferri equini formam representent. Tunc pennæ collæ latera vestientes sunt pariter erectæ, & ipsarum extremitates in collo superiore arcum circuli simul efformant. Dum cristam componitur, pennæ caput ad latera cooperientes supra cristam ipsam paululum eriguntur, & pennæ genas vestientes antrosum reflectuntur, inferioremque mandibulam penitus obtegunt.

obtegunt. Oculos circumdat cutis nuda, candida. Ipforum pupilla est nigra; irides verò rubescentes. Bassim mandibulæ superioris ambit cutis nuda nigra, in qua nares sitæ sunt. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Moluccis Insulis*. Speciem istam *Lutetiæ Parisiorum* vivam observavi.

entourée d'une peau nue & noire, dans laquelle les narines sont placées. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve aux *Moluques*. Je l'ai vu vivant à *Paris*.

** 10. LE KAKATOES A HUPE ROUGE.

Psittacus major brevicaudus, cristatus, albus, roseo adumbratus; cristâ subtus rubrâ; rectricibus lateralibus interiùs primâ medietate sulphureis . . . CACATUA RUBRO CRISTATA.

Grand Cacatua. *Edwards. Tom. IV. pag. CLX; avec une figure exacte Pl. 160.*

Les Anglois l'appellent GREATER COCKATOO. Edwards.

Cum *Ara Brasiliensi* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo à capitis vertice ad caudæ extremitatem unum pedem quinque pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues quindécim pollices. Rostrum, duos pollices & quinque lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est; cauda sex pollices; pes quatuordecim lineas; digitorum anticorum exterior cum ungue duos pollices cum tribus lineis, interior unum
Tom. IV.

Il est à peu près de la grosseur de l'*Ara du Brésil*. Sa longueur depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue est d'un pied cinq pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces. Son bec, qui a deux pouces cinq lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche un pouce neuf lignes de long; sa queue six pouces; son pied quatorze lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, deux pouces trois lignes, l'intérieur un pouce cinq lignes; l'extérieur
D d

de ceux de derrière deux pouces, & l'intérieur quatorze lignes. Il a trois pieds six pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un blanc nuancé d'une très-légère teinte de couleur de rose, si l'on en excepte cependant les couvertures du dessous des ailes & celles du dessous de la queue, qui sont d'une belle couleur de soufre. Toutes les plumes de l'aile sont du même blanc que le dos; cependant le côté intérieur des grandes est d'une couleur de soufre depuis l'origine de la plume jusqu'à vers les deux tiers de sa longueur. La queue est composée de douze plumes d'égale longueur: les deux du milieu sont d'un blanc mêlé d'une très-légère teinte de couleur de rose: toutes les latérales sont de la même couleur, excepté leur côté intérieur, qui est d'une couleur de soufre depuis l'origine de chaque plume jusqu'à vers la moitié de sa longueur, ou même un peu au-delà. Le sommet de la tête est entouré de longues plumes, dont les supérieures sont du même blanc que le reste du corps, & les inférieures sont rouges. Ces plumes forment ensemble une

pollicem & quinque lineas; posticorum extimus duos pollices, intimus quatuordecim lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum sex pollicum & totidem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Per universum corpus pennis vestitur albis, roseo colore adumbratis; attamen excipiendæ sunt inferiores alarum rectrices & pennæ caudam subtus obtegentes eleganti sulphureo colore imbutæ. Remiges omnes eodem ac in dorso albore tinguntur; majores tamen in latere interiore sunt ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque sulphureæ. Caudam componunt duodecim rectrices æqualem longitudinem obtinentes: binæ intermediae albescent, & aliquid rosei coloris admixtum habent: laterales omnes concolores, attamen in latere interiore ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque vel etiam nonnihil ultra sulphureæ. Verticem capitis circumdant longiores pennæ, quarum superiores eodem ac reliquum corpus

albore tinguntur, inferiores verò sunt rubræ. Pennis istis elegantissima conflatur cristæ, quam Avis ad libitum erigere aut componere potest. Ex istis pennis anteriores sex pollicum & totidem linearum longitudinem obtinent; reliquæ omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur. Dum Avis cristam tenet erectam, pennæ quibus illa conflatur, ita sunt dispositæ ut ferri equini formam representent. Tunc pennæ colli latera vestientes sunt pariter erectæ, & ipsarum extremitates in collo superiore arcum circuli simul efformant. Dum cristæ componitur, pennæ caput ad latera cooperientes supra cristam ipsam eriguntur, & pennæ genas vestientes antrosum reflectuntur, inferioremque mandibulam penitus obtegunt. Oculos circumdat cutis nuda cinereo-alba: ipsorum pupilla nigra; irides verò obscurè rubescentes. Basin mandibulæ superioris ambit cutis nuda nigra, in qua nares collocatæ. Rostrum, unguisque ex nigro cœrulescunt; pedes verò plumbeo colore imbuuntur. Habitat in *Moluccis Insulis*, unde missa ad *D. Comitem de Bentinck*, qui *D. de Reaumur* dono dedit. Speciem istam *Lutetiæ Parisiorum* quoque vivam observavi.

trè-belle hupe, que l'Oiseau peut redresser ou abaisser à volonté. Les antérieures ont jusqu'à six pouces six lignes de longueur; toutes les autres vont en diminuant par degrés. Lorsque la hupe est relevée, les plumes qui la composent, représentent par leur arrangement un fer à cheval. Alors les plumes des côtés du col se relevent aussi, & leurs extrémités forment ensemble sur le col un arc de cercle. Lorsque la hupe est abaissée, les plumes des côtés de la tête s'élèvent au-dessus d'elle, & celles des joues se retournent en-devant, & viennent couvrir entièrement le demi-bec inférieur. Les yeux sont entourés d'une peau nue, d'un gris-blanc: leur prunelle est noire; & leur iris est d'un rougeâtre sombre. La base du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & noire, dans laquelle sont les narines. Le bec & les ongles sont d'un noir-bleuâtre; & les pieds de couleur de plomb. On le trouve aux *Molouques*, d'où il a été envoyé à *M. le Comte de Bentinck*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*. Je l'ai aussi vu vivant à *Paris*.

** 11. LE PETIT KAKATOES.

Voyez Pl. XXII. Fig. 1.

Psittacus major brevicaudus, cristatus, albus; cristâ in exortu sulphureâ, subtus pallidè rubrâ; rectricibus caudæ inferioribus pallidè rubris, albo terminatis; rectricibus lateralibus interiùs sulphureis . . . CACATUA MINOR.

Il est à peu près de la grosseur du *Perroquet cendré de Guinée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces dix lignes. Son bec, qui a un pouce d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche dix lignes de long; sa queue quatre pouces cinq lignes; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, dix-sept lignes, l'intérieur un pouce; l'extérieur de ceux de derrière quinze lignes & demie, & l'intérieur huit lignes. Il a deux pieds trois pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont blancs. Il y a cependant de chaque côté de la tête vers les

Psittacum Guineensem cinereum crassitie circiter adæquat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues undecim pollices & decem lineas. Rostrum, unum pollicem crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque decem lineas longum est; cauda quatuor pollices cum quinque lineis; pes decem lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue septemdecim lineas, intinus unum pollicem; posticorum extimus quindecim cum semi lineas, intinus octo lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & trium pollicum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus,

venter, latera & crura pennis vestiuntur albis. In utroque tamen capitis latere versùs aures aliquid extat pallidè rubri admixtum; qui color ruber non multùm est conspicuus. Pennæ synciput obtegentes reliquas longitudine excedunt, elegantem efficiunt cristam, quam Avis ad libitum erigere aut componere potest. Ex istis pennis superiores, quæ quidem octodecim linearum longitudinem obtinent, sunt in exortu eleganti sulphureo colore tinctæ, & apice albæ; inferiores verò pallidè rubræ; ita tamen ut ruber, sulphureusque color non sit conspicuus, nisi dum cristæ erigitur. Pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt quoque in exortu sulphuræ, in reliqua longitudine albæ; albedo autem, dum pennæ aliæ aliis incumbunt, sola est conspicua. Pennæ caudam subtus cooperientes pallidè rubræ, in apice albo marginatæ. Tectrices alarum superiores & inferiores eodem ac corpus albore tinctæ. Remiges in latere exteriori & apice concolores, in latere interiore dilutè sulphuræ: qui sulphureus color in remigibus

oreilles un petit mélange de rouge très-pâle & fort peu apparent. Les plumes du synciput sont plus longues que les autres, & forment une jolie hupe, que l'Oiseau peut relever ou abaisser à volonté. Les supérieures, qui ont jusqu'à dix-huit lignes de longueur, sont d'une belle couleur de soufre à leur origine, & terminées de blanc; les inférieures sont d'un rouge pâle; mais de façon que ce rouge & la couleur de soufre ne paroissent que lorsque la hupe est relevée. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont aussi d'une couleur de soufre à leur origine, le reste est blanc: & c'est la seule couleur qui paroît lorsque ces plumes sont couchées les unes sur les autres. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un rouge pâle, & bordées de blanc par le bout. Celles du dessus & du dessous des ailes sont du même blanc que le corps. Les plumes de l'aile sont de cette dernière couleur du côté extérieur & à leur bout; leur côté intérieur est d'une couleur de soufre claire: cette dernière couleur est très-foible sur les grandes plumes, & plus vive sur les moyennes. La queue est composée de douze plumes: les

deux du milieu sont blanches : toutes les latérales sont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout ; leur côté intérieur est d'une couleur de soufre plus foncée & plus vive que celle des plumes de l'aile. La bête du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue d'un gris-blanc, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est blanc, excepté à son origine, où il est d'un cendré clair. Les pieds & les ongles sont d'un gris-blanc tirant sur la couleur de plomb. On le trouve aux *Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

majoribus est valde pallidus ; in minoribus vividior. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediae candidæ : laterales omnes exterius & apice concolores, interioribus vero colore sulphureo quàm in remigibus saturatiore & vividioribus imbutæ. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda, cinereo-alba, in qua nares collocatæ. Rostrum candidum, excepto exortu dilute cinereo. Pedes, unguesque ex cinereo alben, & ad plumbeum colorem inclinant. Habitat in *Philippensibus Insulis*, unde in museum *D. Aubry* missa est.

12. LE KAKATOES A AISLES ET QUEUE ROUGES ;

Psittacus major brevicaudus, sordide albus, ad cinereum vergens ; uropygio, remigibus, rectricibusque miniaceis . . .
CACATUA ALIS ET CAUDA RUBRIS.

Psittacus erythroleucos. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 675. hujus icon non satis accurata pag. 677.*

Jonst. Avi. pag. 23.

Psittacus erythroleucos Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 76.*

Raj. Syn. Avi. pag. 31. N°. 8.

Psittacus erythroleucus. *Charlet. Exer. pag. 74. N°. 9.*

Charlet. Onomazt. pag. 67. N°. 9.

Les Anglois l'appellent RED AND WHITE PARROT. *Charlet.*

Il est de la grosseur d'un Caponem crassitie adæquat, ou même un peu plus superatve. Ipsi longitudo à rostri apice ad cau-

da extremitatem unum pedem & quinque pollices explet. Caput habet crassum, sicut & collum. Caput, guttur, collum, dorsi partem supremam, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ sordide albæ, ad cinereum vergentes. Scapulares, alarumque rectrices superiores & inferiores concolores. Dorsum infimum, uropygium, rectricisque caudæ superiores & inferiores miniacei sunt coloris. Remiges tingit idem color. Caudam componunt duodecim rectrices similiter miniaceæ. Rostrum, unguisque nigri; pedes verò subnigri. Quò habitet, prorsus ignoro. bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces. Il a la tête & le col fort épais. La tête, la gorge, le col, la partie supérieure du dos, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un blanc sale, tirant sur le cendré. Les plumes scapulaires, & les couvertures du dessus & du dessous des ailes sont de la même couleur. La partie inférieure du dos, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les plumes de l'aile sont d'un rouge vif. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec & les ongles sont noirs; & les pieds noirâtres. Je ne sçais dans quel pays on le trouve.

** 13. LE LORY DE CERAM.

Psittacus major brevicaudus, coccineus; rectricibus alarum superioribus minimis luteis; remigibus majoribus exterius superne viridibus, infernè cinereo-albis, interius coccineis, apice saturatè cinereo; rectricibus quatuor utrinque extimis superne primùm coccineis, dein saturatè violaceis, apice saturatè viridibus . . . *LORIUS CERAMENSIS.*

Psittacus ruber, alis viridibus, remigibus rectricibusque introrsum purpureis. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 37. sp. 3.*

Psittacus coccineus, alis ex viridi & nigro variis. *Willugh. Ornith. pag. 78.*

Psittacus coccineus Orientalis, alis ex viridi & nigro variis. *Raj. Syn. Avi. pag. 31. N°. 9.*

Psittacus rufus, femoribus alisque viridibus. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 45.*

Klein. Avi. pag. 25. N°. 8.

Psittacus purpureus. Charlet. Exer. pag. 75. N^o. 16.

Charlet. Onomazt. pag. 67. N^o. 16.

Lory. Raj. Syn. Avi. pag. 151. N^o. 9.

Noyra. Clus. exot. pag. 364.

Euf. Nieremb. pag. 229.

Jonst. Avi. pag. 155.

Jonst. Avi. pag. 157.

Les Suédois l'appellent PAPEGOYA. Linn.

Les Anglois, PURPLE PARROT. Charlet.

Il est à peu près de la grosseur d'une *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces deux lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces sept lignes. Son bec, qui a neuf lignes d'épaisseur, a aussi depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche neuf lignes de long; sa queue trois pouces neuf lignes; son pied huit lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, douze lignes & demie, l'intérieur neuf lignes; l'extérieur de ceux de derrière un pouce, & l'intérieur sept lignes & demie. Il a dix-huit pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un rouge vif. Les plumes scapulai-

Crassitie Turturem circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & lineas binas explet, & ad extremos ungues octo pollices & septem lineas. Rostrum, novem lineas crassum; ab ipsius unco ad oris angulos usque novem similiter lineas longum est; cauda tres pollices cum novem lineis; pes octo cum semi lineas; digitorum anticorum extremus cum ungue duodecim cum semi lineas, intimus novem lineas; posticorum extremus unum pollicem, intimus septem cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum octodecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, tectricesque caudæ superiores

Superiores & inferiores coccineo colore tinguntur. Pennæ scapulares, sicut & crura, sunt virides. Tectrices alarum inferiores minores luteo & viridi obscuro variegatæ: majores saturatè cinereæ. Superiores minimæ, istæ scilicet quæ alæ articulum carpo humano respondentem vestiunt, luteæ: mediæ, majoresque virides. Alæ nothæ est obscurè violacea. Remix prima, quæ quidem valdè brevis, eodem imbutur colore: novem quæ sequuntur, à secunda scilicet ad decimam usque inclusivè, sunt superne in latere exteriori virides, saturatè cinereo terminatæ, in latere interiore ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque coccineæ, in reliqua longitudine nigre; subtus verò in latere exteriori cinereo-albæ, saturatè cinereo terminatæ, in interiore ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque coccineæ, inde ad apicem saturatè cinereæ: undecima flavo-aurantio imbuta: reliquæ omnes sunt subtus saturatè cinereæ, superne autem in latere exteriori virides, in interiore ni-

Tom. IV.

res & les jambes sont vertes. Les petites couvertures du dessous des ailes sont variées de jaune & de verd sombre: les grandes sont d'un cendré foncé. Les plus petites du dessus, sçavoir celles qui couvrent le pli de l'aile qui répond à celui du poignet, sont jaunes: les moyennes & les grandes sont vertes. L'aile bâtarde est d'un violet sombre. La première des plumes de l'aile, qui est extrêmement courte, est de la même couleur: les neuf suivantes, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la dixième inclusivement, sont en-dessus vertes & terminées de cendré foncé du côté extérieur, leur côté intérieur est rouge depuis l'origine de la plume jusque vers les deux tiers de sa longueur, & le reste est noir; en-dessous elles sont du côté extérieur d'un gris-blanc & terminées de cendré foncé, du côté intérieur elles sont rouges depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, & le reste est d'un cendré foncé: l'onzième est d'un jaune-orangé: toutes les autres sont en-dessous d'un cendré foncé, & en-dessus elles sont vertes du côté extérieur & noires du côté intérieur; il faut cependant excepter les deux ou trois plus proches du corps, dont le

Ee

verd s'étend aussi sur le côté intérieur. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont en-dessus d'un verd sombre à leur origine, ensuite d'un rouge sombre, & enfin terminées de verd sombre, sur lequele est une tache d'un très-beau rouge qui a la forme d'un V : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est en-dessus rouge depuis son origine jusqu'aux deux tiers de sa longueur, le reste est d'un verd foncé : les quatre plus extérieures de chaque côté sont pareillement rouges en-dessus depuis leur origine jusqu'aux deux tiers de leur longueur, ensuite d'un violet foncé, & terminées de verd foncé : le dessous de toutes ces plumes est rouge, cette couleur tirant sur le jaune vers le bout de chaque plume : de plus toutes leurs tiges sont noires. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue & cendrée : leur prunelle est noire ; & leur iris jaune. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & cendrée, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est rouge. Les pieds sont bruns ; & les ongles noirâtres. On le

græ, exceptis tamen duabus tribusve corpori finitimis, in quibus viridis color ad latus quoque interius protenditur. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediae sunt superne in exortu obscurè virides, dein obscurè rubræ, apice tandem obscurè virides, & in eo maculâ vividissimè coccineâ, litteram V figurâ suâ referente, insignitæ : utrinque proximè sequens superne ab ipsius exortu ad duas tertias longitudinis partes usque coccinea, in reliqua longitudine saturatè viridis : quatuor utrinque extremae superne similiter ab ipsarum exortu ad duas tertias longitudinis partes usque coccineæ, dein saturatè violaceæ, & apice saturatè virides : omnes autem rectrices subtus rubro tinguntur, qui color ruber versùs cujuslibet rectricis apicem ad flavum inclinat : omnium insuper rectricum scapi sunt nigri. Rectrices intermediae lateraliū longitudinem nonnihil excedunt. Oculos circumdat cutis nuda cinerea : ipsum pupilla est nigra ; irides verò luteæ. Basim quoque mandibulae superioris ambit cutis nuda cinerea,

in qua nares collocantur. trouve dans l'*Ile de Ceram*,
 Rostrum rubrum. Pedes fuf- l'une des *Moluques*. Du cabinet
 ci; ungues verò nigricantes. de *M. de Reaumur*.
 Habitat in *Ceramo* ex *Mo-*
luccis Insulis una. Ex mu-
seo Realmuriano.

** 14. LE LORY DES MOLUQUES.

Voyez Pl. XXIII. Fig. 1.

Psittacus major brevicaudus, coccineus; maculâ in dorso fu-
 premo & rectricibus alarum superioribus minimis luteis;
 remigibus majoribus exteriùs superne viridibus, infernè
 pallidè roseis, interiùs coccineis, apice nigro; rectricibus
 lateralibus superne primâ medietate coccineis, alterâ satu-
 ratè viridibus, binis utrinque extimis ultimâ medietate ex-
 teriùs saturatè violaceo mixtis LORIUS MOLUCCENSIS.

Lory écarlate. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXXII; avec une figure exacte*
Pl. 172.

Les Anglois l'appellent SCARLET LORY. *Edwards.*

Cum præcedente crassitie
 convenit. Ipsiùs longitudo
 ab apice rostri ad caudam
 extremam decem pollices
 æquat, & ad extremos un-
 gues octo pollices & lineas
 binas. Rostrum, novem lineas
 crassum, ab ipsius unco ad
 oris angulos usque decem
 lineas longum est; cauda
 tres pollices cum sex lineis;
 pes octo lineas; digitorum
 anticorum extimus cum un-
 gue unum pollicem, inti-
 mus novem lineas; postico-
 rum exterior undecim cum

Il est de la grosseur du pré-
 cédent. Sa longueur depuis le
 bout du bec jusqu'à celui de la
 queue est de dix pouces, & jus-
 qu'à celui des ongles de huit
 pouces deux lignes. Son bec,
 qui a neuf lignes d'épaisseur,
 a depuis son crochet jus-
 qu'aux coins de la bouche dix
 lignes de long; sa queue trois
 pouces six lignes; son pied huit
 lignes; le doigt extérieur de de-
 vant, joint avec l'ongle, un
 pouce, l'intérieur neuf lignes;
 l'extérieur de ceux de derriere
 onze lignes & demie, & l'inté-

rieur sept lignes. Il a dix-huit pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre; les côtés, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un rouge vif; il y a cependant sur la partie supérieure du dos une grande tache jaune. Les jambes sont vertes. Les plumes scapulaires sont d'un rouge plus foncé que celui du dos. Les petites couvertures du dessous des ailes sont variées de jaune & de verd sombre: les grandes sont noirâtres. Les plus petites du dessus, savoir celles qui couvrent le pli de l'aile qui répond à celui du poignet, sont jaunes: les moyennes & les grandes sont d'un verd foncé. La première des plumes de l'aile bâtarde est d'un violet foncé vers son origine, & d'un verd foncé vers son bout, ces deux couleurs coupant obliquement la plume: les autres sont d'un verd foncé. La première des plumes de l'aile, qui est extrêmement courte, est noire: les dix suivantes, savoir depuis la seconde jusqu'à l'onzième inclusivement, sont en-dessus d'un verd foncé & ter-

femi lineas, interior septem lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & sex pollicum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, rectricesque caudæ superiores & inferiores coccinei sunt coloris; dorsum tamen supremum majusculâ maculâ luteâ insignitur. Crura sunt viridia. Pennæ scapulares coccineo quàm in dorso saturatiore tinguntur. Rectrices alarum inferiores minores luteo & viridi obscuro variegantur: majores nigricant. Superiores minimæ, istæ scilicet quæ alæ articulum carpo humano respondentem obtegunt, luteæ: mediæ, majoresque saturatè virides. In ala notha prior penna est in exortu saturatè violacea, versùs apicem viridi saturato imbuta, duobus istis coloribus pennam obliquè dividitibus: reliquæ sunt saturatè virides. Remix prima, quæ quidem brevissima, est nigra: decem quæ sequuntur, à secunda scilicet ad undecimam usque inclusivè, sunt supernæ

in latere exteriori saturatè virides, nigro terminatæ, in latere interiori ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque coccineæ, in reliqua longitudine nigræ; subtus autem exterius pallidè roseæ, nigro terminatæ, interiori ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque coccineæ, indeque ad apicem nigræ: reliquæ omnes subtus nigræ, superne verò in latere exteriori saturatè virides, in interiori nigræ, exceptis tamen duabus tribusve corpori vicinioribus, in quibus viridis color ad latus quoque interius & etiam subtus protenditur. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ superne saturatè virides, attamen ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque secundùm ipsarum scapi longitudinem rubro valdè obscuro tinctæ: laterales omnes superne ab ipsarum exortu ad mediam circiter longitudinem usque coccineæ, alterâ medietate saturatè virides: binæ insuper utrinque extremæ exterius in parte viridi aliquid saturatè violacei admixtum ha-

minées de noir du côté extérieur, leur côté intérieur est rouge depuis l'origine de la plume jusqu'à vers les deux tiers de sa longueur, & le reste est noir; en-dessous elles sont du côté extérieur de couleur de rose pâle & terminées de noir, du côté intérieur elles sont rouges depuis leur origine jusqu'à vers les deux tiers de leur longueur, & le reste est noir; toutes les autres sont noires en-dessous, & en-dessus elles sont d'un verd foncé du côté extérieur & noires du côté intérieur; il faut cependant excepter les deux ou trois plus proches du corps, dont le verd s'étend aussi sur le côté intérieur & même en-dessous. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont en-dessus d'un verd foncé, excepté le long de leur tige depuis leur origine jusqu'à vers la moitié de leur longueur, où elles sont d'un rouge très-sombre: toutes les latérales sont en-dessus rouges depuis leur origine jusqu'à vers la moitié de leur longueur, le reste est d'un verd foncé: les deux plus extérieures de chaque côté ont de plus un mélange de violet foncé sur leur partie verte du côté extérieur: le dessous de toutes ces plumes est rouge, cette couleur tirant sur le jaune

vers le bout de chaque plume : de plus toutes leurs tiges sont noires. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue & cendrée : leur prunelle est noire ; & leur iris d'un bel orangé. La bête du demi-bec supérieur est pareillement entourée d'une peau nue & cendrée , dans laquelle les narines sont placées. Le bec est rouge. Les pieds sont bruns ; & les ongles noirs. On le trouve aux *Molouques*. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

bent : omnes autem rectrices subtus rubro tinguntur, qui color ruber versus uniuscujusque rectricis apicem ad flavum vergit : omnium insuper rectricum scapi sunt nigri. Rectrices intermediae lateralium longitudinem non nihil superant. Oculos circumdat cutis nuda cinerea : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò aurantiæ. Basin mandibulae superioris similiter ambit cutis nuda cinerea , in qua nares sunt positæ. Rostrum rubrum. Pedes fusci ; ungues verò nigri. Habitat in *Moluccis Insulis*. *Ex museo D. Aubry.*

**** 15. LE LORY DES INDES ORIENTALES.**

Voyez Pl. XXIV. Fig. 1.

Psittacus major brevicaudus, coccineus ; syncipite nigro-violaceo ; vertice dilutè violaceo ; marginibus alarum viridi & cœruleo variis ; remigibus majoribus exteriùs superne viridibus , infernè nigricantibus , interiùs luteis , apice nigricante ; rectricibus coccineis , apice viridi marginatis . . .
LORIUS ORIENTALIS INDICUS.

Psittacus rufus , vertice nigro , alis viridibus , femoribus cœruleis ;
Frisch. hujus icon non satis accurata Tab. 44.

Klein. Avi. pag. 24. N^o. 7.

Second Lory à calotte noir. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXXI ; avec une figure exacte Pl. 171.*

Les Anglois l'appellent SECOND BLACK-CAPPED LORY. Edwards.

Il est un peu plus gros que le Lory de Ceram. Sa longueur *Craffitie Lorium Ceramen-*
sem paululùm antecellit. Ip-

sius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem decem pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & quatuor lineas. Rostrium, novem cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda tres pollices cum undecim lineis; pes decem lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue quindecim lineas, intimus decem lineas; posticorum extimus tredecim lineas, intimus octo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis quinque pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Synciput nigro imbuatur splendido, paululum ad violaceum vergente. Vertex capitis occipitium versùs est dilutè violaceus. Caput ad latera, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, pennæ scapulares, tectricesque caudæ superiores & inferiores coccineo tinguntur colore, in dorso & scapularibus pennis nonnihil obscuro, in capitis lateri-

depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces quatre lignes. Son bec, qui a neuf lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche onze lignes de long; sa queue trois pouces onze lignes; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'intérieur dix lignes; l'extérieur de ceux de derrière treize lignes, & l'intérieur huit lignes. Il a un pied cinq pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Le synciput est d'un noir brillant, tirant un peu sur le violet. Le sommet de la tête vers l'occiput est d'un violet clair. Les côtés de la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les plumes scapulaires, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un fort beau rouge: cette couleur est un peu sombre sur le dos & les plumes scapulaires, & plus vive aux côtés de la tête, à la gorge, au col & à la poitrine. Les plumes qui couvrent la partie inférieure du col & la poitrine, sont d'un beau jaune à leur

origine, mais cette couleur ne paroît pas lorsqu'elles sont couchées les unes sur les autres. Les jambes sont couvertes de plumes vertes à leur origine & terminées de bleu, n'y ayant aussi que cette dernière couleur qui paroisse. Les petites & les moyennes couvertures du dessous des ailes sont bleues : les plus grandes sont noirâtres. Le bord de l'aile est varié de bleu & de verd. Les couvertures du dessus des ailes sont d'un verd un peu sombre, & qui tire en quelques endroits sur le rouge. L'aile est composée de dix-huit plumes : la première est noirâtre du côté extérieur, cette couleur tirant un peu sur le verd vers le bout de la plume & en-dessus seulement, & son côté intérieur est jaune depuis son origine jusque vers les trois quarts de sa longueur, le reste étant noirâtre : les neuf suivantes, savoir depuis la seconde jusqu'à la dixième inclusivement, sont vertes en-dessus & noirâtres en-dessous du côté extérieur ; leur côté intérieur est jaune depuis l'origine de la plume jusque vers les trois quarts de sa longueur, & terminé de verd en-dessus & de noirâtre en-dessous : les huit autres, savoir depuis l'onzième jusqu'à la dix-huitième inclusivement, sont

bus, gutture, collo & pectore vivacior. Pennæ partem colli inferiorem & pectus obtegentes sunt in exortu eleganter luteæ. qui color luteus, dum pennæ alix aliis incumbunt, nequaquam est conspicuus. Crura vestiunt pennæ in exortu virides, apice cœruleæ, cœruleo pariter solo conspicuo. Tectrices alarum inferiores minimæ & mediæ cœruleæ : majores nigricantes. Alarum margines cœruleo & viridi variegatæ. Superiores alarum tectrices viridi imbutæ nonnihil obscuro, & quibusdam in locis ad rubrum vergente. Octodecim remigibus ala conflatur : prima in latere exteriori nigricans, versùs ipsius apicem & superne tantùm paululùm ad viride inclinans, in latere interiore ab ipsius exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque lutea, in reliqua longitudine nigricans : novem sequentes, à secunda scilicet ad decimam usque inclusivè, in latere exteriori superne virides, infernè nigricantes, in interiore verò ab ipsarum exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque luteæ, superne viridi, subtus nigricante

cante terminatæ : octo reli-
quæ, ab undecima scilicet
ad decimam-octavam usque
inclusivè, subtus nigrican-
tes, superne verò virides,
attamen lateris interioris ma-
ximâ parte nigricantes. Re-
mix secunda omnium est lon-
gissima. Cauda duodecim
constat rectricibus cocci-
neis, coccineo colore pau-
lulum versùs cujuslibet rec-
trici apicem obscuriore ;
apice autem viridi, sed pa-
rum conspicuo, fimbriato.
Rectrices intermediæ latera-
lium longitudinem nonnihil
excedunt. Oculos circum-
dat cutis nuda, saturatè ci-
nerea : ipsorum pupilla est
nigra ; irides verò aurantiæ.
Basim mandibulæ superioris
similiter ambit cutis nuda,
saturatè cinerea, in qua na-
res sitæ sunt. Rostrum ru-
brum. Pedes, unguisque ni-
gricantes. Habitat in *India*
Orientali, unde missus ad
D. Comitem de Bentinck,
qui *D. de Reaumur* dono
dedit.

noirâtres en dessous ; mais en-
dessus elles sont vertes, ayant
la plus grande partie de leur
côté intérieur noirâtre. La se-
conde des plumes de l'aîle est la
plus longue de toutes. La queue
est composée de douze plumes
rouges : cette couleur s'obscur-
cit un peu vers le bout de chaque
plume, qui est bordé de verd ;
mais peu apparent. Les plumes
du milieu de la queue sont un
peu plus longues que les laté-
rales. Les yeux sont entourés
d'une peau nue, d'un cendré
foncé : leur prunelle est noire ;
& leur iris est d'un bel orangé.
La bête du demi-bec supérieur
est aussi entourée d'une peau
nue, d'un cendré foncé, dans
laquelle sont placées les nari-
nes. Le bec est rouge. Les pieds
& les ongles sont noirâtres. On
le trouve aux *Indes Orientales*,
d'où il a été envoyé à *M. le*
Comte de Bentinck, qui en a fait
présent à *M. de Reaumur*.

** 16. LE LORY DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XXIII. Fig. 2.

Psittacus major brevicaudus, coccineus ; collo superiore,
dorso supremo, medio pectore, medio ventre, rectricibus-
que caudæ inferioribus cœruleo-violaceis ; capite superius
Tom. IV. Ff

nigro ; remigibus majoribus exterius superne saturatè viridibus , internè nigris , interiùs luteis , apice nigro ; rectricibus lateralibus superne primâ medietate coccineis , alterâ saturatè viridibus , exterius saturatè violaceo marginatis LORIUS PHILIPPENSIS.

Premier Lory à calotte noir. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXX ; avec une figure exacte Pl. 170.*

Les Anglois l'appellent FIRST BLACK-CAPPED LORY. Edwards.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces neuf lignes , & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces. Son bec , qui a neuf lignes d'épaisseur , a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche dix lignes de long ; sa queue trois pouces onze lignes ; son pied huit lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , quatorze lignes , l'intérieur dix lignes ; l'extérieur de ceux de derrière un pouce , & l'intérieur sept lignes. Il a seize pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un beau noir. Le derrière & les côtés de la tête , la gorge , la partie inférieure & les côtés du col sont d'un rouge clair. Le derrière de la tête est mêlé d'un peu de blanchâtre. Les par-

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & novem lineas explet , & ad extremos ungues novem pollices. Rostrum , novem lineas crassum , ab ipsius unco ad oris angulos usque decem lineas longum est ; cauda tres pollices & undecim lineas ; pes octo lineas ; digitorum anticorum exterior cum ungue quatuordecim lineas , interior decem lineas ; posticorum extimus unum pollicem , intimus septem lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est sexdecim pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ duas ferè tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Capitis superior pars splendido imbuitur nigro. Caput in parte posteriore & ad latera , guttur , collumque inferius &

ad latera pennis vestiuntur dilutè coccineis. Capitis posterior pars aliquid candicantis admixtum habet. Collum superius, dorsum supremum, pectus medium, medius venter, inferioresque caudæ teatrices elegantissimo tinguntur coeruleo-violaceo. Dorsum infimum, uropygium, superiores caudæ teatrices, latera pectoris, sicut & ventris, latera, pennæ alas subtus obtegentes, alarumque margines coccinei sunt coloris. Crura in parte suprema eodem colore imbuta, in parte infima coeruleo-violacea. Pennæ scapulares & superiores alarum teatrices saturatè virides. Remix prima in latere exteriorè nigra, in interiorè ab ipsius exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque eleganter lutea, in reliqua longitudine nigra: tredecim quæ sequuntur, à secunda scilicet ad decimam-quartam usque inclusivè, exterius superne saturatè virides, subtus nigra, interius ab ipsarum exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque eleganter luteæ, nigro terminatæ: decima-quinta in latere exteriorè superne saturatè viridis, infernè ni-

ties supérieures du col & du dos, le milieu de la poitrine, le milieu du ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un très-beau bleu-violet. La partie inférieure du dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, les côtés de la poitrine & du ventre, les côtés, les couvertures du dessous des aîles & le bord de l'aîle sont d'un rouge vif. Le haut des jambes est de la même couleur & le bas est d'un bleu-violet. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont d'un verd foncé. La première des plumes de l'aîle est noire du côté extérieur & son côté intérieur est d'un beau jaune depuis son origine jusqu'à sa longueur, le reste est noir: les treize qui suivent, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la quatorzième inclusivement, sont d'un verd foncé en-dessus & noires en-dessous du côté extérieur; leur côté intérieur est d'un beau jaune depuis l'origine de la plume jusqu'à sa longueur, & terminé de noir: la quinzième est d'un verd foncé en-dessus & noire en-dessous du côté extérieur; son côté intérieur est noir & marqué vers les trois quarts de sa longueur d'une ta-

che ronde d'un beau jaune : toutes les autres sont d'un verd foncé en-dessus & noires en-dessous. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu ont en-dessus un peu de verd à leur origine, ensuite elles sont d'un rouge sombre jusque vers la moitié de leur longueur, & le reste est d'un verd foncé : toutes les latérales sont en-dessus d'un beau rouge depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & de là jusqu'à leur bout elles sont d'un verd foncé, bordé extérieurement de violet foncé : le dessous de toutes ces plumes est rouge, cette couleur devenant un peu sombre vers le bout de chaque plume, qui est terminé d'un peu de verdâtre. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue, d'un cendré clair : leur prunelle est noire ; & leur iris est d'un bel orangé. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue, d'un cendré clair, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est rouge. Les pieds sont gris ; & les ongles noirâtres. On le trouve aux *Philippines*, d'où il a été envoyé à M. l'Abbé Aubry, qui le conserve dans

gra, in interiore nigra, versus tres quartas longitudinis partes maculâ rotundâ eleganter luteâ insignita : reliquæ omnes superne saturatè virides, subtus nigra. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ superne in exortu nonnihil virides, dein mediam versus longitudinem usque obscurè coccineæ, in reliqua longitudine saturatè virides : laterales omnes superne ab ipsarum exortu mediam versus longitudinem usque coccineæ, à medietate ad apicem saturatè virides, exteriùs saturatè violaceo marginatæ : omnes autem rectrices subtus rubro tinguntur, qui color ruber versus cujuslibet rectricis apicem paululùm fit obscurior ; apex verò paucò viridescente terminatur. Rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt. Oculos circumdat cutis nuda, dilutè cinerea : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò aurantiæ. Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda, dilutè cinerea, in qua nares sitæ. Rostrum rubrum. Pedes grisei ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Philippensibus In-*

17. LE LORY DU BRÉSIL.

Psittacus major brevicaudus, coccineus; capite, collo superiore, imo ventre, alis & caudâ nigris . . . LORUS BRASILIENSIS.

Paragua. Marcgr. Hist. Br. pag. 207.

Jonst. Avi. pag. 142.

Willugh. Ornith. pag. 76.

Raj. Syn. Avi. pag. 33. N°. 4.

Les Brasiliens l'appellent PARAGUA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Cum *Psittaco Amazonico* magnitudine convenit. Caput, pars colli superior, venter imus, crura & tectrices caudæ inferiores nigri sunt coloris. Dorsum, uropygium, superiores caudæ tectrices, guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem supremum & latera coccineus tingit color. Pennæ scapulares, & tectrices alarum superiores & inferiores sunt nigrae. Remiges eodem imbutæ colore. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Oculi sunt nigri; ipsorum irides rubrae. Rostrum, pedesque obscure cinerei. Habitat in *Brasilia*.

Il est de la grandeur du *Perroquet Amazone*. La tête, la partie supérieure du col, la partie inférieure du ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont noires. Le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, la gorge, le dessous du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont d'un rouge vif. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, ainsi que les plumes de l'aile sont noires. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles des ailes. Les yeux sont noirs; & leur iris est rouge. Le bec & les pieds sont d'un cendré obscur. On le trouve au *Brésil*.

18. LE LORY A COLLIER DES INDES.

Psittacus major brevicaudus, coccineus; uropygio & imo ventre ex albo & roseo variegatis; capite superiore & remigibus majoribus cyaneis; torque luteo; rectricibus purpureis, fusco-rubescence adumbratis LORIUS TORQUATUS INDICUS.

Psittacus capite cyaneo, collari luteo. Klein. Avi. pag. 25. N°. 17.
Perroquet du Brésil appelé par les Anglois Laurey. Alb. Tom. I.
pag. 12; avec une figure passable Pl. 13.
Les Anglois l'appellent LAUREY. Alb.

Il est à peu près de la grandeur du *Lory des Philippines*. La partie supérieure de la tête est d'un bleu éclatant. Le derrière & les côtés de la tête, la gorge, le col, la partie supérieure du dos, les plumes scapulaires, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont d'un rouge d'écarlate. Le col est entouré d'un collier jaune. La partie inférieure du dos, le croupion & le bas-ventre sont variés de blanc & de couleur de rose. Les jambes sont variées des mêmes couleurs. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont variées de blanc & de rouge vif. Celles du dessus des ailes sont d'un verd mêlé de jaune. Les grandes plumes de l'aile sont d'un très-beau bleu : les moyennes sont d'un verd-jaunâtre. La queue est composée de douze plumes

Lorium Philippensem crassitie circiter æquat. Capitis superior pars splendidissimo imbuitur cyaneo. Caput posterius & ad latera, guttur, collum, partem dorsi supremam, scapulares pennas, pectus, ventrem supremum & latera tingit coccineus color. Collum ambit torquis luteus. Dorsum infimum, uropygium & infimus venter albo & roseo colore variegantur. Iidem colores crura variegant. Tectrices caudæ superiores & inferiores albo & coccineo variæ. Pennæ alas superne vestientes sunt virides, luteo mixtæ. Remiges majores elegantissimo cyaneo tinctæ : minores viridi-flavicantes. Cauda duodecim conflatur rectricibus purpureis, fusco-rubescence adumbratis. Oculos circumdat cutis nuda

nigra : ipforum pupilla concolor ; irides verò luteæ. Rostrum flavicans. Pedes cinerei ; ungues verò nigri. Secundum *Albinum*, habitat in *Brasilia* ; in *India* potius *Orientali* eum inveniri censeo.

d'un pourpre nuancé d'un brun-rougeâtre. Les yeux sont entourés d'une peau nue & noire : leur prunelle est de la même couleur ; & leur iris est jaune. Le bec est jaunâtre. Les pieds sont cendrés ; & les ongles noirs. *Albin* dit qu'il vient du *Brésil* ; je crois plutôt qu'on le trouve dans les *Indes Orientales*.

** 19. LE LORY D'AMBOINE.

Psittacus major brevicaudus, superne saturatè coccineus, infernè obscurè violaceus ; rectricibus saturatè coccineis, apice sordidè pallidè rubris . . . *LORIUS AMBOINENSIS*.

Reliquas omnes *Loriorum* species crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues decem pollices. Rostrum, decem lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque undecim cum semi lineas longum est ; cauda quatuor pollices ; pes decem lineas ; digitorum anteriorum extimus cum ungue sexdecim lineas, intimus undecim lineas ; posteriorum exterior quatuordecim lineas, interior octo cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum

Il est plus gros que toutes les autres especes de *Lorys*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces. Son bec, qui a dix lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche onze lignes & demie de long ; sa queue quatre pouces ; son pied dix lignes ; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, seize lignes, l'intérieur onze lignes ; l'extérieur de ceux de derriere quatorze lignes, & l'intérieur huit lignes & demie. Il a un pied sept pouces de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étend-

dent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un beau rouge foncé. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessous des ailes sont d'un violet sombre. Les grandes couvertures du dessous des ailes sont d'un brun-noirâtre. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un rouge obscur du côté extérieur & d'un brun-noirâtre du côté intérieur. Les grandes plumes de l'aile sont de la même couleur en-dessus, mais en-dessous elles sont d'un brun-noirâtre : les moyennes sont pareillement d'un brun-noirâtre en-dessous, & d'un rouge foncé en-dessus. La queue est composée de douze plumes d'un rouge foncé, qui se change vers le bout de chaque plume en un rouge pâle & terni. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue & noirâtre : leur prunelle est noire ; & leur iris

unius pedis & septem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices sunt saturatè coccineæ. Pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam subtus obtegentes & tectrices alarum inferiores minores obscuro tinguntur violaceo. Inferiores alarum tectrices majores ex fusco nigricant. Superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, dorso concolores : majores à corpore remotiores in latere exteriori obscurè coccineæ, in interiore fusco-nigricantes. Remiges majores superne concolores, subtus verò ex fusco nigricant : minores sunt similiter subtus fusco-nigricantes, superne autem saturatè coccineæ. Caudam componunt duodecim tectrices saturatè coccineæ ; apice tamen sordidè pallidè rubræ. Intermediæ lateraliū longitudinem paululum excedunt. Oculos circumdat cutis nuda nigricans : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò aurantiæ.

Bafim

Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda nigricans, in qua nares sunt positæ. Rostrum obscurè rubrum. Pedes fusci; ungues verò nigricantes. Habitat in *Amboinensi Insula*, unde missus ad *D. Comitem de Bentinck*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

est d'un bel orangé. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & noirâtre, dans laquelle les narines sont placées. Le bec est d'un rouge obscur. Les pieds sont bruns; & les ongles noirâtres. On le trouve dans l'*Ile d'Amboine*, d'où il a été envoyé à *M. le Comte de Bentinck*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

20. LE PERROQUET A TESTE JAUNE DE LA JAMAÏQUE. |

Psittacus major brevicaudus, viridis, infernè ad luteum vergens; syncipite & gutture coerulesco-viridibus; capite & pectore luteis; marginibus alarum & rectricibus caudæ inferioribus coccineis; rectricibus viridi-luteis.... PSITTACUS JAMAICENSIS ICTEROCEPHALOS.

Psittacus medius viridis, oculis & rostro nigris. Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 473.

Psittacus melanorinchus. Charlet. Onomast. pag. 67. N°. 6.

Psittacus melanorinchos. Charlet. Exer. pag. 74. N°. 6.

Psittacus viridis melanorinchos. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 670. hujus icon satis accurata pag. 672.

Jonst. Avi. pag. 22. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XV.

Psittacus viridis melanorhynchos Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 75. Raj. Syn. Avi. pag. 30. N°. 4.

Psittacus viridis melanorinchos Jonstoni. Barr. Ornith. Class. III. Gen. II. sp. 8.

Les Anglois l'appellent JAMAICA PARROT. Browne.

Crassitie Psittacum Guineensem cinereum circiter æmulatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices æquat. Cauda quatuor circi-
Tom. IV.

Il est de la grosseur du *Perroquet cendré de Guinée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces. Sa queue a environ quatre pouces de long.
G g

Le synciput & la gorge sont d'un bleu tirant sur le verd. Le reste de la tête & la poitrine sont jaunes. Le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessous de la queue sont d'un beau verd. Le ventre, les côtés & les jambes sont d'un verd tirant sur le jaune. Les couvertures du dessous de la queue & le bord des ailes sont d'un rouge vif. Les grandes plumes de l'aile sont vertes en-dessus, ayant cependant la plus grande partie de leur côté intérieur noirâtre, & en-dessous elles sont noires à leur origine, & rouges vers le bout : les moyennes sont vertes en-dessus, & noires en-dessous. La queue est composée de douze plumes d'un verd tirant sur le jaune. La prunelle des yeux est noire ; & leur iris est d'une couleur de safran foncée. Le bec & les ongles sont noirs ; & les pieds bruns. On le trouve à la Jamaïque.

ter pollices longa est. Synciput & guttur ex cœruleo ad viride vergunt. Reliquum caput & pectus lutea sunt. Collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superioresque caudæ rectrices virore pleno tinguntur. Venter, latera & crura ex viridi ad luteum inclinant. Inferiores caudæ rectrices, sicut & alarum margines, sunt coccineæ. Remiges majores sunt superne virides ; attamen lateris interioris maximâ parte nigricantes, subtus verò in exortu nigræ, versùs apicem rubræ : minores superne virides, infernè nigræ. Caudam componunt duodecim rectrices ex viridi ad luteum vergentes. Oculorum pupilla est nigra ; ipsorum irides saturatè coccæ. Rostrum, unguesque nigri ; pedes verò fusci. Habitat in *Jamaica*.

21. LE PERROQUET A TESTE BLEUE DU BRÉSIL;

Psittacus major brevicaudus, viridis ; capite superius cœruleo, nigro mixto ; vertice & maculis infra oculos luteis ; guttore cœruleo ; rectricibus superne dilutè viridibus, infernè viridi-luteis *PSITTACUS BRASILIENSIS*
CYANOCEPHALUS;

Psittaci majoris, seu mediæ magnitudinis *Marcgravii*, tertia species,

Ajuru-curuca. Willugh. Ornith. pag. 76.

Ajuru-curuca, *Psittaci* tertia species. *Marcgr. Hist. Br. pag. 205.*

Jonst. Avi. pag. 141.

Ajuru-curuca. Raj. Syn. Avi. pag. 33. N^o. 3.

Les Brâsiliens l'appellent AJURU-CURUCA. Marcgr. Jonst.

Præcedentem crassitie circiter adæquat. Capitis superior pars est cœrulea, paucò nigro mixta; in cujus medio, scilicet in vertice, macula adest lutea. Infra utrumque oculum macula extat concolor. Guttur cœruleum est. Collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superiores alarum tectrices, pectus, venter, latera, crura, tectricesque caudæ superiores & inferiores viridi tinguntur colore, in dorso & tectricibus alarum superioribus paulò saturatiore. Remiges sunt virides, sed quàm in dorso dilutiùs; majores autem in ipsarum extremitatibus flavo, rubro & cœruleo-violaceo variegantur. Cauda duodecim constat tectricibus superne dilutè viridibus, subtus viridi-luteis. Rostrum superiùs cinereum, in extremitate nigrum. Pedes cinereo-cœrulescentes; ungues verò nigri. Habitat in *Brâsilia*.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. La partie supérieure de la tête est d'un bleu mêlé d'un peu de noir, & dans son milieu, sçavoir sur le sommet de la tête, est une tache jaune. Au-dessous de chaque œil est une tache de la même couleur. La gorge est bleue. Le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, celles du dessus & du dessous de la queue, la poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont verts : cette couleur est un peu plus foncée sur le dos & les couvertures du dessus des aîles qu'ailleurs. Les plumes de l'aîle sont d'un verd plus clair que celui du dos : les grandes sont variées à leur extrémité de jaune, de rouge & de bleu-violet. La queue est composée de douze plumes d'un verd clair en-dessus & d'un verd-jaune en-dessous. Le bec est cendré en-dessus & noir vers le bout. Les pieds sont d'un cendré-bleuâtre; & les ongles noirs. On le trouve au *Brésil*.

22. LE PERROQUET DES BARBADES.

Psittacus major brevicaudus, viridis; syncipite dilutè cinereo; vertice, genis, gutture, collo inferiore, rectricibus alarum superioribus minimis & cruribus luteis; remigibus intermediis exterius primâ medietate rubris; rectricibus viridibus.
 *PSITTACUS BARBADENSIS.*

Psittacus viridis & luteus, capite cinereo Barbadenfis. Klein. Avi. pag. 25. N°. 24
Perroquet des Barbades. Alb. Tom. III. pag. 6; avec une figure peu exacte Pl. 11.
Les Anglois l'appellent GREEN AND YELLOW PARROT FROM BARBADOES. Alb.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Pigeon Romain*. Le synciput est d'un cendré clair. Le sommet de la tête, les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont jaunes. Le derrière de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les côtés sont verts. Les jambes sont jaunes. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même verd que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un beau bleu. Les premières grandes plumes de l'aile sont en-

Columbam Romanam crassitie circiter æmulator. Synciput dilutè cinereo tingitur. Capitis verticem, genas, guttur & partem colli inferiorem vestiunt pennæ luteæ. Capitis posterior pars, collum superius, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, pectus, venter, latera; rectricesque caudæ superiores & inferiores viridis sunt coloris. Crura lutea. Superiores alarum rectrices minimæ eodem colore tinctæ; mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, eodem viridi imbutæ ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores eleganter cyanæ. Remiges majores primores sunt superne in latere exteriori eleganti cœruleo-violaceo

tinctæ, in interiore nigræ; è contrario verò subtus in latere exteriori nigræ, in interiore cœruleo-violaceæ: quæ sequuntur, sunt superne in latere exteriori ab ipsarum exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque rubræ, in reliqua longitudine cœruleo-violaceæ, in latere interiore nigræ; subtus verò exterius nigræ, interiùs cœruleo-violaceæ: reliquæ omnes superne virides, infernè viridi - cœruleæ. Caudam componunt duodecim rectrices eleganti viridi imbutæ. Intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt. Oculos circumdat cutis nuda cinerea: ipsorum pupilla est nigra: irides verò eleganter croceæ. Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda cinerea, in qua nares sitæ sunt. Rostrum corneo colore imbutum. Pedes cinerei; ungues verò nigri. Habitat. in *Barbata Insula*.

pieds sont cendrés; & les ongles noirs. On le trouve dans l'*Isle Barbade*.

23. LE PERROQUET DE CAYENNE.

Psittacus major brevicaudus, viridis, infernè ad luteum vergens: rectricibus lateralibus interiùs rubris, apice viridibus, binis utrinque extimis exterius superne cœrulescentibus *PSITTACUS CAYANENSIS*.

dessus d'un beau bleu-violet du côté extérieur, & noires du côté intérieur; mais en dessous au contraire elles sont noires du côté extérieur, & d'un bleu-violet du côté intérieur: les suivantes sont en-dessus rouges du côté extérieur depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur, & d'un bleu-violet de là jusqu'à leur bout, leur côté intérieur est noir; en-dessous elles sont noires du côté extérieur & d'un bleu-violet du côté intérieur: toutes les autres sont vertes en-dessus & d'un verd - bleu en - dessous. La queue est composée de douze plumes d'un beau verd. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue & cendrée: leur prunelle est noire; & leur iris est d'une belle couleur de safran. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & cendrée, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est d'une couleur de corne. Les

Psittacus subtrus flavescens, superne ex viridi cœruleus. *Barr. Ornith.*

Class. III. Gen. II. sp. 1.

Psittacus major vulgaris prasinus. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 144.*

Petit Perroquet verd. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXVIII* ; avec une figure exacte Pl. 168.

Les Anglois l'appellent LITTLE GREEN PARROT. *Edwards.*

Les Catalans, PAPAGAY ; PAPAGALL ; LORO. *Barr.*

Les Indiens de la Guiane, TAUHA. *Barr.*

Il est à peu près de la grosseur d'un Pigeon. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces six lignes. Son bec, qui a onze lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche dix lignes & demie de long ; sa queue trois pouces trois lignes ; son pied huit lignes ; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, seize lignes, l'intérieur onze lignes ; l'extérieur de ceux de derrière treize lignes, & l'intérieur huit lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un beau verd. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la

Columbam crassitie circiter aquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues novem pollices & sex lineas. Rostrum, undecim cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque decem cum semi lineas longum est ; cauda tres pollices & totidem lineas ; pes octo lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue sexdecim lineas, intimus undecim lineas ; posticorum exterior tredecim lineas, interior octo lineas. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, superiores caudæ rectrices & scapulares pennæ sunt eleganter virides. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores viridi tinguntur diluto & ad luteum

vergente. Testrices alarum superiores & inferiores sunt virides, si tamen excipias majores superiores à corpore remotiores splendide cyaneas, & unicam ex illis rubram. Remiges majores superne in latere interiore & apice nigricantes, in latere exteriori splendide cœruleæ; subtus verò penitus nigricantes: minores virides. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ virides: tres utrinque sequentes in latere exteriori concolores, in interiore ab ipsarum exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque rubræ, in reliqua longitudine virides: binæ utrinque extremæ iisdem coloribus imbuuntur ac tres suprâ dictæ rectrices ipsæ tinguntur, sed in latere tantum interiore; in exteriori verò sunt superne cœrulescentes, subtus dilutè virides. Rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululum superant. Oculos circumdat cutis nuda dilutè cinerea: ipsorum pupilla est nigra; irides verò obscurè avellaneæ. Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda candicans, in qua nares sunt positæ. Rostrum cine-

queue sont d'un verd clair & tirant sur le jaune. Les couvertures du dessus & du dessous des aîles sont vertes; il faut cependant en excepter les grandes du dessus les plus éloignées du corps, qui sont d'un beau bleu, l'une d'entr'elles étant rouge. Les grandes plumes de l'aîle sont en-dessus noirâtres du côté intérieur & à leur bout, d'un beau bleu du côté extérieur; & en-dessous elles sont tout-à-fait noirâtres: les moyennes sont vertes. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont vertes: les trois suivantes de chaque côté sont de la même couleur du côté extérieur; mais leur côté intérieur est rouge depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur, le reste est verd: les deux plus extérieures de chaque côté sont colorées comme ces trois dernières, mais du côté intérieur seulement; leur côté extérieur est bleuâtre en-dessus & d'un verd clair en-dessous. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue, d'un cendré clair: leur prunelle est noire; & leur iris est de couleur de noisette sombre. La bête du demi-bec supérieur est aussi en-

tourée d'une peau nue & blanche, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est d'un cendré assez clair vers sa bête & plus foncé à son bout. Les pieds sont cendrés; & les ongles bruns. On le trouve à Cayenne, & en différens endroits d'Amérique.

reum versùs l'asin quidem dilutiùs, in apice saturatiùs. Pedes cinerei; ungues verò fusci. Habitat in *Cayana*, variisque *Americæ* locis.

24. LE PERROQUET A TESTE ROUGE DU BRÉSIL.

Psittacus major brevicaudus, viridis; capite, gutture, collo inferiore, pectore & tectricibus alarum superioribus minimis rubris; rectricibus viridibus. . . . PSITTACUS BRASILIENSIS ERYTHROCEPHALOS.

Tarabe Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 207.

Jonst. Avi. pag. 142.

Willugh. Ornith. pag. 76.

Tarabe. Raj. Syn. Avi. pag. 33. N°. 5.

Les Brasiliens l'appellent TARABE. Marcgr. Jonst. Willugh.

Il est plus grand que le *Lory du Brésil*. La tête, la gorge; la partie inférieure du col & la poitrine sont rouges. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, les plumes scapulaires, le ventre, les jambes & les côtés sont verts. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont rouges: les moyennes & les grandes sont de la même couleur que le dos. Les grandes plumes de l'aile sont en-dessus vertes du côté extérieur, noi-

Magnitudine *Lorium Brasiliensem* antecellit. Caput, guttur, partem colli inferiorem & pectus vestiunt pennæ rubræ. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, venter, latera, crura, tectricesque caudæ superiores & inferiores viridis sunt coloris. Tectrices alarum superiores minimæ sunt rubræ: mediæ & majores dorso concolores. Remiges majores superne in latere exteriori virides, in interiori, sicut & subtus in utroque

que latere, nigricantes : minores viridi colore tinctæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus similiter viridibus. Rostrum, pedesque obscurè cinerei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Brazilia*.

râtres du côté intérieur ; & en-dessous elles sont noirâtres des deux côtés : les moyennes sont vertes. La queue est composée de douze plumes de cette dernière couleur. Le bec & les pieds sont d'un cendré obscur ; & les ongles noirâtres. On le trouve au *Brésil*.

25. LE PERROQUET A GORGE ROUGE DE LA JAMAÏQUE.

Psittacus major brevicaudus, viridis ; gutture & collo inferiore miniaceo ; rectricibus viridibus . . . *PSITTACUS JAMAÏCENSIS GUTTURE RUBRO.*

Psittacus minor, collo, seu torque miniaceo. *Sloane. Voy. of Jamaica. pag. 297. N°. IX.*

Psittacus minor, collo miniaceo. *Raj. Syn. Avi. pag. 181. N°. 8.*

An Xaxabes de Oviedo ? *Sloane. Raj.*

Les Anglois l'appellent COMMON PARROT OF JAMAICA. *Sloane. Raj.*

Psittacum Cayanensem magnitudine circiter æquat. Caput, collum superius, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, tectrices alarum superiores & inferiores, pectus, venter, latera, crura, tectricesque caudæ superiores & inferiores viridi colore tinguntur. Guttur & collum inferius miniacei sunt coloris. Remiges majores superne in latere exteriori virides, in interiori, sicut & subtus in utroque latere, nigricantes : minores dorso concolores. Duodecim rectricibus similiter viridibus

Il est à peu près de la grandeur du *Perroquet de Cayenne*. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion ; les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, celles du dessus & du dessous de la queue, la poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont verts. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un rouge vif. Les grandes plumes de l'aile sont en-dessus vertes du côté extérieur, noirâtres du côté intérieur ; & en-dessous elles sont noirâtres des deux côtés : les moyennes sont du même verd

que le dos. La queue est composée de douze plumes pareillement vertes. On n'a rien dit de la couleur du bec ni de celle des pieds. On le trouve à la Jamaïque.

cauda constat. De rostri, pedumque colore nulla mentio facta est. Habitat in Jamaica.

26. LE PERROQUET DE LA MARTINIQUE.

Psittacus major brevicaudus, viridis, pennis in apice fusco marginatis; medio ventre rubro mixto; syncipite albo; vertice cœruleo, rubris maculis vario; genis, gutture & collo inferiore coccineis; rectricibus lateralibus rubris, apice viridibus, binis utrinque extimis superne exterius cœrulescentibus PSITTACUS MARTINICANUS.

Perroquet à tête blanche. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXVI; avec une figure exacte Pl. 166.*

Les Anglois l'appellent WHITE-HEADED PARROT. Edwards.

Il est à peu près de la grandeur du précédent. Le synciput est blanc : cette couleur s'étend jusqu'aux yeux & au milieu du sommet de la tête; lequel est d'un beau bleu varié de quelques taches rouges : la couleur bleue descend jusque derrière les yeux, & là est variée de quelques taches d'un verd sombre. Les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un rouge vif. Les parties supérieures du col & du dos, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes (excepté les grandes les plus éloignées du corps, qui sont d'un beau bleu) & la poitrine sont

Magnitudine cum precedente circiter convenit. Synciput albicat : albedo autem ad oculos & capitis medium verticem usque protenditur. Vertex capitis eleganti tingitur cœruleo, quibusdam maculis rubris variegato : cœruleus color ponè oculos usque ducitur, ibique maculis quibusdam obscure viridibus variegatur. Genæ, guttur & collum inferius coccineo imbuuntur colore. Pars colli superior, sicut & dorsi suprema, pennæ scapulares, superiores alarum rectrices (exceptis tamen majoribus à corpore remotiori-

bus splendide cyaneis) & pectus viridis sunt coloris, quâlibet pennâ in apice fusco marginatâ. Dorsum infimum, uropygium, tectrices caudæ superiores & inferiores, pennæ alas subtus obtegentes, latera & crura eodem imbuuntur viridi, sed marginibus fuscis destituuntur pennæ. Venter viridis quidem, sed rubro mixtus. (Quorundam hujus speciei individuorum venter penitus rubet, sicut & margines alarum versus articulum carpo humano respondentem). Remiges majores sunt superne in latere interiore & apice nigricantes, in exteriori splendide cyaneæ; infernè verò penitus nigricantes: minores virides. Duodecim rectricibus cauda conflatur: binæ intermediae virides: tres utrinque sequentes ab ipsarum exortu versus tres quartas longitudinis partes usque rubræ, in reliqua longitudine virides: binæ utrinque extremæ tribus supra dictis concolores; ab illis tamen discrepant in eo quod superne, sed in latere exteriori tantum, cœrulescant. Rectrices intermediae lateralium longitudinem nonnihil excedunt. Oculos

vertes, chaque plume étant bordée de brun par le bout. La partie inférieure du dos, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des ailes, les jambes & les côtés sont du même verd, mais les plumes ne sont pas bordées de brun. Le ventre est d'un verd mêlé de rouge. (Quelques individus de cette espece ont le ventre tout-à-fait rouge, ainsi que le bord de l'aile vers le pli qui répond à celui du poignet). Les grandes plumes de l'aile sont en-dessus noirâtres du côté intérieur & à leur bout, d'un beau bleu du côté extérieur; & en-dessous elles sont tout-à-fait noirâtres; les moyennes sont vertes. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont vertes: les trois suivantes de chaque côté sont rouges depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur, le reste est verd: les deux plus extérieures de chaque côté sont colorées comme ces trois dernières, avec cette différence cependant qu'elles sont bleuâtres en-dessus du côté extérieur seulement. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau

nue & blanche : leur prunelle est noire ; & leur iris est de couleur de noisette sombre. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & blanche, dans laquelle sont les narines. Le bec est de couleur de chair pâle ou blanchâtre. Les pieds & les ongles sont d'un brun foncé. On le trouve à la Martinique, & en différens endroits de l'Amérique.

circumdat cutis nuda candida : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò obscurè avellanæ. Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda candida , in qua nares positæ sunt. Rostrum pallidè carneo colore tinctum sive candicans. Pedes , unguemque saturatè fusci. Habitat in Martinica , variisque Americæ locis.

** 27. LE PERROQUET A GORGE ROUGE DE LA MARTINIQUE.

Psittacus major brevicaudus, viridis, pennis in apice nigro marginatis; sincipite albo; collo inferiore dilutè rubro; pennarum marginibus albis; ventre obscurè purpureo; rectricibus quatuor utrinque extimis interiùs primâ medietate rubris, alterâ luteis, viridi-luteo terminatis, extimâ exterius cœruleâ *PSITTACUS MARTINICANUS GUTTURE RUBRO.*

Psittacus viridis, fronte albâ, collo rubro. *Frisch. hujus icon non satis accurata Tab. 46.*

Klein. Avi. pag. 25. N°. 9.

Psittacus viridis, capite albo. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 37. sp. 4.*

Psittacus viridis; albo capite. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. II. sp. 9.*

Psittacus major albicans, capite luteo. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 144.*

Psittacus leucocephalus. *Aldrov. Avi. Tom. 1. pag. 670. hujus icon non satis accurata pag. 673.*

Jonst. Avi. pag. 22. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XV.

Charlet. Exer. pag. 74. N°. 7.

Charlet. Onomast. pag. 67. N°. 7.

Psittacus leucocephalus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 75.*

Raj. Syn. Avi. pag. 31. N°. 5.

Raj. Syn. Avi. pag. 181. N°. 7.

Psittacus major. *Jonst. Avi. hujus icon ab Olina mutuata Tab. XIV.*

Pappagallo. *Olina. pag. 23, in qua hujus icon non satis accurata.*

Papagayos verdes que tienen un flecco de plumas blancas en el naci-

miento del pico, de Oviedo. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 297.*
N^o. VIII.

Perroquet de la Martinique. *Nouv. Voy. de l'Amér. Tom. II. pag. 157.*

Les François de la Guiane l'appellent PERROQUET D'ORENOCK. Larr.

Les Italiens, PAPPAGALLO. Olin.

Cum *Psittaco Amazonico* crassitie circiter convenit. Ipsi^{us} longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices cum sex lineis. Rostrum, tredecim lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices & sex lineas; pes octo lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & quinque lineas, intimus unum pollicem; posticorum extimus quindecim lineas, intimus novem lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & totidem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Synciput albicat: albedo autem ad capitis verticem medium usque & circa oculos protenditur. Guttur & partem colli inferiorem vestiunt pennæ dilutè rubræ, albo marginatæ,

Il est à peu près de la grosseur du *Perroquet Amazone*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces six lignes. Son bec, qui a treize lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche douze lignes & demie de long; sa queue quatre pouces six lignes; son pied huit lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'intérieur un pouce; l'extérieur de ceux de derrière quinze lignes, & l'intérieur neuf lignes. Il a deux pieds deux pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le synciput est blanc: cette couleur s'étend jusqu'au milieu du sommet de la tête & tout autour des yeux. La gorge & la partie inférieure du col sont couvertes de plumes d'un rouge clair; bordées de blanc. Le derrière de la tête, le dessus du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du

dessus des ailes (excepté les grandes les plus éloignées du corps), la poitrine & les côtés sont verts, chaque plume étant bordée de noir par le bout. Le ventre & le côté intérieur des jambes sont d'un pourpre obscur. Le côté extérieur des jambes est verd. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un verd clair & tirant un peu sur le jaune. Les petites du dessous des ailes sont vertes, excepté quelques-unes des plus petites vers l'origine de l'aile, qui sont d'un rouge vif : les grandes sont bleues. Les grandes du dessus de l'aile les plus éloignées du corps sont de cette dernière couleur, si l'on en excepte cependant leur côté intérieur, qui est noir à son origine. Les grandes plumes de l'aile sont en-dessus bleues du côté extérieur & noires du côté intérieur, en-dessous au contraire elles sont noires du côté extérieur & bleues du côté intérieur : les moyennes sont vertes en-dessus & d'un verd-bleu en-dessous. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont vertes : celle qui les suit immédiatement de chaque côté est de la même couleur du côté extérieur & jaune du côté intérieur, cette dernière couleur tirant un peu sur le verd

Capitis posterior pars, colum superius, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superiores alarum rectrices (exceptis tamen majoribus à corpore remotioribus), pectus & latera viridis sunt coloris, unaquaque pennâ in apice nigro marginatâ. Venter purpureo obscuro tingitur. Crura in latere interiore eodem sunt colore imbuta, in exteriori viridia. Pennæ caudam superne & infernè tegentes dilutè virides & nonnihil ad luteum inclinantes. Rectrices alarum inferiores minores virides, quibusdam tamen ex minimis versùs exortum alarum coccineis : majores cyaneæ. Majores alarum superiores à corpore remotiores similiter cyaneæ, attamen interiùs in exortu nigrae. Remiges majores superne in latere exteriori cyaneæ, in interiori nigrae, è contrario subtus in latere exteriori nigrae, in interiori cyaneæ : minores superne virides, infernè viridi-cœruleæ. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediae virides : utrinque proximè sequens in latere exteriori concolor, in interiori lutea, qui luteus color

versus rectricis apicem paululum ad viride vergit : quatuor utrinque extimæ in latere interiore ab ipsarum exortu mediam versus longitudinem usque rubræ, dein luteæ, viridi-luteo terminatæ ; in latere verò exteriore virides, utrinque tamen extrema exteriùs versus apicem usque cœrulea. Rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt. Oculos circumdat cutis nuda candida : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò avellaneæ. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda, ex albo ad incarnatum colorem inclinans, in quanares sunt collocatæ. Rostrum similiter ex albo ad incarnatum colorem vergens. Pedes carneo colore imbuti ; ungues verò grisei. Habitat in *Martinica, Guiana & Jamaica. Ex musæo Realmuriano.*

vers le bout de la plume : les quatre plus extérieures de chaque côté sont rouges du côté intérieur depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, ensuite elles sont jaunes, & terminées de verd-jaune ; mais du côté extérieur elles sont vertes, excepté cependant la plus extérieure de chaque côté, qui est bleue jusque vers son bout. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue & blanche : leur prunelle est noire ; & leur iris est de couleur de noisette. La bête du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue, d'un blanc tirant sur le couleur de chair, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est de la même couleur. Les pieds sont de couleur de chair ; & les ongles gris. On le trouve à *la Martinique, dans la Guiane & à la Jamaïque. Du cabinet de M. de Reaumur.*

**** 28. LE PERROQUET A TESTE BLEUE DE LA GUIANE.**

Psittacus major brevicaudus, viridis; pennis in collo superiore & dorso supremo nigricante, in pectore cœruleo-violaceo marginatis ; capite, gutture & collo inferiore cœruleo-violaceis ; reetricibus quatuor utrinque extimis interiùs primâ medietate rubris, alterâ viridibus, cœruleo superne terminatis, tribus extimis superne exteriùs cœruleo-violaceis . . . , PSITTACUS GUIANENSIS CYANOCEPHALOS,

Perroquet vert facé de bleu. *Edwards. Glanur. pag. 43. Chap. XX; avec une figure assez exacte Pl. 230.*

Les Anglois l'appellent BLUE-FACED GREEN PARROT. Edwards.

Il n'est guères plus gros qu'une *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces deux lignes. Son bec, qui a dix lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche neuf lignes & demie de long; sa queue deux pouces neuf lignes; son pied sept lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'intérieur neuf lignes; l'extérieur de ceux de derrière onze lignes, & l'intérieur sept lignes. Il a un pied huit pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure & les côtés de la tête, ainsi que la gorge, sont d'un très-beau bleu tirant sur le violet. L'occiput est couvert de plumes vertes, bordées de ce même bleu-violet. De chaque côté de la tête est une tache noirâtre, placée sur les oreilles. Les parties supérieures du col & du dos sont couvertes de plumes vertes, bordées de noirâtre. Celles qui couvrent la partie inférieure du

Crassitie Turturem non multum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & totidem lineas explet, & ad extremos ungues novem pollices cum lineis binis. Rostrum, decem cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque novem cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & novem lineas; pes septem cum semi lineas; digitorum anticorum extremus cum ungue quatuordecim lineas, intimus novem lineas; posticorum exterior undecim lineas, interior septem lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & octo pollicum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput superius & ad latera, & guttur elegantissimo imbuuntur cœruleo ad violaceum vergente. Occipitium vestiunt pennæ virides, eodem cœruleo-violaceo fimbriatæ. In utroque capitis latere macula extat nigricans, supra aures posita. Pennæ partem colli superiorem, sicut & dorsi supremam,

supremam, vestientes sunt virides, nigricante marginata. Quæ dorsum inferum & uropygium cooperiunt, superioresque caudæ teñtrices splendide virides, marginibus nigricantibus destituta. Partem colli inferiorem obtegentes cœruleo-violaceæ; quælibet tamen penna primum est obscure viridis, & ad latera aliquid rosei coloris admixtum habet; color autem roseus, sicut & viridis, dum pennæ aliæ aliis incumbunt, nullo modo est conspicuus. Pectus pennis vestitur viridibus, cœruleo-violaceo marginatis. Venter, latera & crura ex viridi ad luteum vergunt. Inferiores caudæ teñtrices sunt rubræ, minoribus cœruleo diluto, reliquis viridiluteo terminatis; color autem viridiluteus secundum cujusque pennæ scapum in acumen ascendit. Pennæ alas subtus obtegentes virides. Superiores alarum teñtrices minores viridiluteæ, & quasi aureo colore perlustratæ: majores, sicut & scapulares pennæ, virides, ad luteum nonnihil inclinantes. Remiges majores virides quidem, sed superne lateris interioris, subtus verò lateris ex-

Tom. IV,

dos & le croupion, ainsi que les couvertures du dessus de la queue, sont d'un verd brillant & sans bordures. La partie inférieure du col est d'un bleu-violet; chaque plume cependant est d'abord d'un verd obscur, & a un peu de couleur de rose sur ses côtés; mais ces couleurs ne paroissent pas lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. La poitrine est couverte de plumes vertes, bordées de bleu-violet. Le ventre, les côtés & les jambes sont d'un verd tirant sur le jaune. Les couvertures du dessous de la queue sont rouges, les plus petites étant terminées de bleu clair, & les autres de verd-jaune, cette dernière couleur remontant en pointe le long de la tige de chaque plume. Les couvertures du dessous des ailes sont vertes. Les petites du dessus sont d'un verd-jaune, & qui paroît comme doré: les grandes, ainsi que les plumes scapulaires, sont d'un verd tirant un peu sur le jaune. Les grandes plumes de l'aile sont vertes, mais elles ont en-dessus la plus grande partie de leur côté intérieur noir, & en-dessous c'est la plus grande partie de leur côté extérieur qui est de cette couleur: les moyennes sont vertes dessus & dessous, &

Ii

bordées intérieurement de noirâtre, mais en-dessus seulement. La queue est composée de douze plumes : les quatre du milieu sont vertes, & terminées en-dessus seulement par un peu de bleu : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est rouge du côté intérieur depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur ; le reste du côté intérieur & tout le côté extérieur sont verts, excepté le bout de la plume, qui est bleu, mais en-dessus seulement : les trois plus extérieures de chaque côté sont pareillement rouges du côté intérieur depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, le reste est verd, excepté le bout qui est bleu, mais en-dessus seulement ; tout le côté extérieur est en-dessus d'un beau bleu tirant sur le violet, & verd en-dessous. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue & couleur de chair : leur prunelle est noire ; & leur iris est d'un bel orangé. La bête du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & noirâtre, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est d'un cendré-noirâtre, le demi-bec supé-

terioris maximâ parte nigræ : minores superne & infernè virides, interiùs superne tantùm nigricante marginatæ. Duodecim rectricibus cauda constat : quatuor intermediæ virides, superne tantùm paucò cœruleo terminatæ : utrinque proximè sequens in latere inferiore ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque rubra, in reliqua lateris interioris & tota lateris exterioris longitudine viridis, excepto rectricis apice cœruleo, sed superne tantùm : tres utrinque extimæ similiter interiùs ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque rubræ, in reliqua longitudine virides, apice tamen superne cœruleo ; exteriùs verò superne eleganter cœruleo-violaceæ, infernè virides. Rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululùm antecellunt. Oculos circumdat cutis nuda carneo colore tincta : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò aurantiæ. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda nigricans, in qua nares positæ. Rostrum cinereo-nigricans ; mandibula tamen superior maculâ quadratâ pallidè rubrâ utrinque

insignitur. Pedes carneo colore imbuti ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Guiana* , variisque *Americæ* locis. *Ex museo Realmuriano.*

rieur étant marqué de chaque côté d'une tache quarrée d'un rouge pâle. Les pieds sont de couleur de chair ; & les ongles noirâtres. On le trouve dans la *Guiane* & dans différens en-

droits de l'*Amérique*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 29. LE PERROQUET A TESTE BLEUE DE LA MARTINIQUE.

Psittacus major brevicaudus , viridis , pennis in apice nigro marginatis ; syncipite albo ; vertice cinereo-cœruleo ; ventre rubris maculis vario ; rectrice extimâ exteriùs cœruleâ , interiùs rubra , luteo marginata , tribus proximis rubris , exteriùs viridi , interiùs luteo marginatis & luteo-viridi terminatis *PSITTACUS MARTINICANUS CYANOCEPHALOS.*

Cum *Columba* crassitie circiter convenit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & sex lineas æquat , & ad extremos ungues novem pollices & octo lineas. Rostrium , unum pollicem crassum , ab ipsius unco ad oris angulos usque undecim lineas longum est ; cauda quatuor pollices cum lineis binis ; pes septem cum semi lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue sexdecim cum semi lineas , intimus decem cum semi lineas ; posticorum extimus quindecim lineas , intimus octo lineas. Alis expansis , extremitates majorum remigum unius pedis & decem pollicum inter-

Il est à peu près de la grosseur d'un *Pigeon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces six lignes , & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces huit lignes. Son bec , qui a un pouce d'épaisseur , a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche onze lignes de long ; sa queue quatre pouces deux lignes ; son pied sept lignes & demie ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , seize lignes & demie , l'intérieur dix lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derriere quinze lignes , & l'intérieur huit lignes. Il a un pied dix pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'aux deux

tiers de la longueur de la queue. Le synciput est blanc. Le sommet de la tête est d'un cendré-bleu. Le reste de la tête, le col, le dos, les plumes scapulaires, les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, & la poitrine sont d'un beau verd, chaque plume étant bordée de noir par le bout. Le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les côtés sont verts & sans bordures aux plumes. Le ventre est varié de rouge & de verd. Les jambes sont d'un verd tirant sur le bleu. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd-jaune. Celles du dessous des ailes sont vertes. Le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, est blanc. Les plumes de l'aile bâtarde, ainsi que les grandes couvertures du dessus de l'aile les plus éloignées du corps, sont bleues, excepté leur côté intérieur, qui est noir vers son origine seulement. Les huit premières plumes de l'aile sont en-dessus bleues du côté extérieur & noires du côté intérieur, en-dessous elles sont noires du côté extérieur, & leur côté intérieur est d'un bleu-verd à son origine, & noir vers le bout, ces deux couleurs coupant obliquement chaque

vallo distant; alæ verò complicatæ duas circiter tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Synciput albicat. Vertex capitis est cinereo-cœruleus. Reliquum caput, collum, dorsum, pennæ scapulares, superiores alarum teñtrices minores, sicut & majores corpori viciniores, & pectus viridis sunt coloris, unaquaque pennâ in apice nigro marginatâ. Uropygium & superiores caudæ teñtrices, sicut & latera, sunt virides, pennis in apice nigro nequaquam marginatis. Venter ex rubro & viridi variegatur. Crura ex viridi-cœrulescunt. Inferiores caudæ teñtrices sunt viridi-luteæ. Pennæ alas subtus obtegentes virides. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, candidæ: Pennæ alam notham constituentes & superiores alarum teñtrices majores à corpore remotiores cœruleæ, attamen in latere interiore versùs ipsarum exortum nigræ. Remiges octo primores superne in latere exteriori cœruleæ, in interiore nigræ, infernè verò exterius nigræ, interiùs in exortu cœrileo-virides, in apice nigræ, duobus istis co-

loribus unamquamque pen-
nam obliquè dividitibus :
quatuor quæ sequuntur , à
nona scilicet ad duodeci-
mam usque inclusivè , su-
perne similiter in latere ex-
teriore cœruleæ , in inte-
riore nigræ , subtus autem
cœruleo - virides : tredecima
& decima - quarta su-
perne exteriùs virides , cum
pauco versùs ipsarum api-
cem cœruleo admixto , in-
teriùs nigræ , internè verò
cœruleo - virides : reliquæ
omnes similiter subtus cœ-
ruleo-virides , superne verò
virides , attamen in latere in-
teriore ad ipsarum exortum
nigricantes. Duodecim rec-
tricibus cauda conflatur :
binæ intermediæ virides :
utrinque proximè sequens in
latere exteriore concolor ,
in interiore ab ipsius exortu
mediam versùs longitudi-
nem usque lutea , cum pauco
secundùm scapi longitudi-
nem rubro admixto , à me-
dietate ad apicem viridis :
tres utrinque sequentes ab ip-
sarum exortu ad duas circiter
tercias longitudinis partes us-
que rubræ , exteriùs viridi ,
interiùs luteo marginatæ , in
reliqua longitudine in latere
exteriore virides , in latere
interiore luteo-virides : utrin-

plume : les quatre suivantes ,
sçavoir depuis la neuvième
jusqu'à la douzième inclusive-
ment , sont pareillement en-
dessus bleues du côté extérieur
& noires du côté intérieur , &
en-dessous elles sont d'un bleu-
verd : la treizième & la quator-
zième sont en-dessus vertes du
côté extérieur , ayant un peu
de bleu mêlé vers leur bout , &
noires du côté intérieur , & en-
dessous elles sont d'un bleu
verd : toutes les autres sont
aussi d'un bleu-verd en-des-
sous , mais en-dessus elles sont
vertes , excepté leur côté inté-
rieur , qui est noirâtre à son ori-
gine. La queue est composée
de douze plumes : les deux du
milieu sont vertes : celle qui les
suit immédiatement de chaque
côté , est de la même couleur
du côté extérieur ; son côté in-
térieur est jaune depuis l'origine
de la plume jusque vers la moi-
tié de sa longueur , avec un
peu de rouge tout le long de la
tige , & l'autre moitié est verte :
les trois suivantes de chaque cô-
té sont rouges depuis leur origi-
ne jusque vers les deux tiers de
leur longueur , ayant leur bord
extérieur verd & l'intérieur
jaune ; le reste de leur longueur
est verd du côté extérieur &
d'un jaune-verd du côté inté-
rieur : enfin la plus extérieure

de chaque côté est bleue dans toute l'étendue de son côté extérieur, tandis que son côté intérieur est rouge & bordé de jaune depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur, & d'un verd-jaune de là jusqu'à son bout. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue & blanche. La base du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue, de la même couleur, dans laquelle les narines sont placées. Le bec est blanc. Les pieds sont gris; & les ongles bruns. On le trouve à la Martinique. Du cabinet de M. de Reaumur.

que tandem extrema per totam longitudinem exterius cœrulea, interiùs vero ab ipsius exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes utque rubra, luteo marginata, in reliqua longitudine viridi-lutea. Rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululum superant. Oculos circumdat cutis nuda candida. Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda concolor, in qua nares sunt positæ. Rostrum candidum. Pedes grisei; ungues verò fusci. Habitat in *Martinica*. Ex museo *Realmuriano*.

30. LE PERROQUET A FRONT ROUGE DU BRÉSIL:

Psittacus major brevicaudus, viridis, infernè ad luteum vergens, superne pennis obscurè purpureo marginatis; capite anteriùs rubro; vertice viridi-flavicante; genis cœruleis; rectricibus lateralibus interiùs rubris, apice luteis, extremâ exterius cœruleâ, binis utrinque proximis exterius rubris....
PSITTACUS BRASILIENSIS FRONTE RUBRA.

Perroquet verd du Brésil. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXI; avec une figure exacte Pl. 161.*

Perroquet de la Dominique. *Nouv. Voy. de l'Amér. Tom. II. pag. 157. Les Anglois l'appellent BRASILIAN GREEN PARROT. Edwards.*

Il est plus grand que le *Perroquet cendré de Guinée*. Toute la partie antérieure de la tête, savoir le synciput, le tour du

Magnitudine *Psittacum Guineensem cinereum* antecellit. Capitis anterior pars tota, synciput scilicet, rostri

ambitus & guttur, eleganti rubro tingitur. Genæ infra & ponè oculos sunt splendide cœruleæ. Capitis vertex ex viridi flavicat. Pars colli superior, dorsum & pennæ scapulares sunt saturatiùs virides, pennis obscurè purpureo marginatis. Uropygium & superiores caudæ tectrices eodem imbuuntur viridi, sed nulla est in pennis margo purpurea. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ dilutè virides, ad luteum vergentes. Ex istis quæ caudam subtus obtegunt, aliæ sunt dilutissimè virides, aliæ luteæ. Superiores alarum tectrices minores dilutè virides : majores corpori finitimæ obscurè virides, luteo marginatæ : majores tandem à corpore remotiores cœruleæ. Alarum margines, ad articulum carpo humano respondentem, luteæ ; infra eundem articulum similiter luteæ, sed rubro mixtæ. Ex remigibus majoribus primores sunt nigricantes : quæ sequuntur, superne in latere exteriori cœruleæ, in interiori nigricantes, subtus verò in utroque latere nigricant : minores omnes virides, luteo sim-

bec & la gorge, est d'un beau rouge. Les joues au-dessous & derriere les yeux sont d'un beau bleu. Le sommet de la tête est d'un verd-jaunâtre. La partie supérieure du col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un verd plus foncé, chaque plume étant bordée d'un pourpre obscur. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont du même verd, mais les plumes ne sont pas bordées de pourpre. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un verd clair, tirant sur le jaune. Une partie des couvertures du dessous de la queue est d'un verd très-clair, les autres sont jaunes. Les petites du dessus des ailes sont d'un verd clair : les grandes les plus proches du corps sont d'un verd obscur, bordées de jaune ; & les grandes les plus éloignées du corps sont bleues. Le bord de l'aile, sur le pli qui répond à celui du poignet, est jaune ; & au-dessous de ce même pli il est d'un jaune mêlé de rouge. Les premières des grandes plumes de l'aile sont noirâtres : les suivantes sont en-dessus bleues du côté extérieur, noirâtres du côté intérieur, & en-dessous elles sont noirâtres des deux côtés ; toutes les

moyennes sont vertes & bordées de jaune. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont vertes & terminées de jaune : les deux qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont de la même couleur du côté extérieur ; mais leur côté intérieur est rouge & terminé de jaune : la quatrième & la cinquième sont rouges des deux côtés, & terminées de jaune : enfin la plus extérieure de chaque côté est colorée comme ces dernières du côté intérieur seulement, son côté extérieur est bleu en-dessus, verd en-dessous, & terminé de jaune dessus & dessous. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. La prunelle des yeux est noire ; leur iris est d'une couleur sombre ; & leurs paupières sont d'un cendré-clair. La bête du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & brune, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est de couleur de chair. Les pieds & les ongles sont d'un cendré-brun. On le trouve au *Brésil*.

** 31. LE PERROQUET AMAZONE.

Psittacus major brevicaudus, viridis ; syncipite cœruleo, ad violaceum inclinante ; vertice, genisque luteis ; reniigibus quinque intermediis exterius superne primâ medietate rubris ; rectricibus tribus utrinque extimis interiùs rubris, taniâ transversâ saturatè viridi notatis, apice viridi-luteis, quatuor

briatæ. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ virides, luteo terminatæ : binæ utrinque proximæ in latere exteriori concolores, in interiori rubræ, luteo terminatæ : quarta & quinta in utroque latere rubræ, apice luteæ : utrinque tandem extrema iisdem ac præcedentes coloribus picta, sed in latere interiori tantum, in exteriori verò superne cœrulea, subtus viridis, apice autem superne & infernè lutea. Rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt, Oculorum pupilla nigra ; ipsorum irides obscuræ ; palpebræ dilutè cinereæ. Basim mandibulæ superioris ambitus nuda fusca, in qua nares sunt collocatæ. Rostrum carneo colore imbutum. Pedes, unguesque cinereo-fusci. Habitat in *Brasilia*.

tuor utrinque extimis exterioribus rubrâ maculâ insignitis....

PSITTACUS AMAZONICUS.

Psittacus viridis, capite luteo, fronte cœruleâ. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 47.*

Psittacus viridis, capite croceo, fronte cyaneâ. *Klein. Avi. pag. 25. N°. 10.*

Psittaci majoris, seu mediæ magnitudinis Marcgravii prima species, Ajuru-Curau. *Willugh. Ornith. pag. 76.*

Ajuru-Curau, Psittaci prima species. *Marcgr. Hist. Br. pag. 205. Jonst. Avi. pag. 140.*

Ajuru-Curau. *Raj. Syn. Avi. pag. 32. N°. 1.*

Ajuru-Couri. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 556.*

Les Brâsiliens l'appellent AJURU-CURAU. *Marcgr. Jonst.*

Columbam Romanam crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem explet, & ad extremos ungues decem pollices & sex lineas. Rostrum, tredecim lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices; pes octo lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue septemdecim lineas, intimus unum pollicem; posteriorum exterior quindecim lineas, interior novem lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum unius pollicis & quatuor linearum; alæ verò complatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes

Tom. IV.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Pigeon Romain*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces six lignes. Son bec, qui a treize lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche douze lignes & demie de long; sa queue quatre pouces; son pied huit lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, dix-sept lignes, l'intérieur un pouce; l'extérieur de ceux de derrière quinze lignes, & l'intérieur neuf lignes. Il a deux pieds un pouce quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le synciput est d'un bleu tirant un peu sur le violet;

Kk,

cette couleur s'étend un peu de chaque côté au-dessus des yeux. Le sommet de la tête & les joues sont jaunes. La gorge est couverte de plumes jaunes, bordées d'un verd-bleuâtre. Le derrière de la tête, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes, celles du dessus de la queue, la poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont verds. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd tirant sur le jaune. Les petites du dessous des ailes sont vertes : les grandes sont d'un verd plus clair. Le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, est d'un jaune-orangé. Les huit premières plumes de l'aile sont en-dessus noires du côté intérieur, leur côté extérieur est verd depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son bout il est d'un bleu-violet; mais en-dessous elles sont noires du côté extérieur, & leur côté intérieur est d'un verd clair à son origine, & noir vers le bout, ces deux couleurs coupant obliquement chaque plume : la neuvième & la dixième sont pareillement en-dessus noires du côté intérieur, & ont leur côté extérieur verd depuis leur origine jusque vers

usque protendantur. Synciput ex cœruleo nonnihil ad violaceum inclinat : qui color cœruleo-violaceus utrinque supra oculos paululum extenditur. Vertex capitis & genæ luteo tinguntur colore. Guttur obtegunt pennæ luteæ, viridi - cœrulescente marginatæ. Capitis posterior pars, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superiores caudæ rectrices, pectus, venter, latera & crura viridis sunt coloris. Pennæ caudam infernè cooperientes ex viridi ad luteum inclinant. Inferiores alarum rectrices minores sunt virides : majores virides quidem, sed dilutiùs. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, luteo-aurantiæ. Remiges octo primores superne in latere interiore nigræ, in exteriori ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque virides, à medietate ad apicem cœruleo-violaceæ; subtùs verò exteriùs nigræ, interiùs in exortu dilutè virides, versùs apicem nigræ, duobus istis coloribus quamlibet pennam obliquè dividitibus : nona & decima similiter superne in

latere interiore nigræ, in exterioriore ab ipsarum exortu ad mediam circiter longitudinem usque virides, inde ad apicem cœruleo-violaceæ; subtus autem in utroque latere dilutè virides: quinque sequentes, ab undecima scilicet ad decimam-quintam usque inclusivè, superne in latere interiore nigræ, in exterioriore ab ipsarum exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque rubræ, in reliqua longitudine cœruleo-violaceæ, cum paucis viridi cœruleo-violaceum inter & rubrum colorem posito; infernè verò dilutè virides: decima-sexta similiter subtus dilutè viridis, superne verò interiùs nigra, exteriùs viridis, mediam versùs longitudinem maculâ rubrâ, & in apice maculâ cœruleo-violaceâ insignita: binæ quæ sequuntur, decima-septima scilicet & decima-octava, superne in latere exterioriore & apice virides, apice quidem maculâ cœruleo-violaceâ insignito, in latere interiore nigræ; subtus autem dilutè virides: reliquæ omnes superne virides, latere tamen interiore versùs remigis exortum nigricante, infernè dilutè virides. Cau-

la moitié de leur longueur, & de là jusqu'à leur bout d'un bleu-violet; mais en-dessous elles sont des deux côtés d'un verd clair: les cinq suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la quinzième inclusivement, sont en-dessus noires du côté intérieur, leur côté extérieur est rouge depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur, le reste est d'un bleu-violet, cette couleur étant séparée du rouge par un peu de verd; & en-dessous elles sont d'un verd clair: la seizième est pareillement en-dessous d'un verd clair; mais en-dessus elle est noire du côté intérieur, son côté extérieur est verd & marqué vers son milieu d'une tache rouge & à son bout d'une tache de bleu-violet: les deux suivantes, sçavoir la dix-septième & la dix-huitième, sont en-dessus vertes du côté extérieur & à leur bout, lequel est marqué d'une tache de bleu-violet, & noires du côté intérieur; mais en-dessous elles sont d'un verd clair: toutes les autres sont vertes en-dessus, excepté leur côté intérieur qui est noirâtre vers l'origine de la plume seulement, & d'un verd clair en-dessous. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont d'un verd foncé;

& terminées de verd tirant sur le jaune : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est d'un verd foncé jusque vers les deux tiers de sa longueur, le reste est d'un verd - jaune ; mais il y a sur le côté intérieur une tache rouge placée entre le verd foncé & le verd-jaune : la troisième est colorée comme cette dernière, avec cette différence seulement que la tache rouge qu'elle a sur son côté intérieur, est un peu plus grande, & qu'elle en a de plus une seconde de la même couleur, mais plus petite, sur son côté extérieur : les trois plus extérieures de chaque côté sont du côté extérieur d'un verd foncé depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, le reste est d'un verd - jaune, cette dernière couleur étant séparée du verd foncé par une tache rouge ; du côté intérieur elles sont rouges depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur, & d'un verd-jaune de là jusqu'à leur bout ; mais le rouge est traversé vers les deux tiers de la longueur de chaque plume par une large bande d'un verd très-foncé & presque noir : de plus vers l'origine de ces trois plumes le rouge du côté intérieur s'étend un peu sur le côté exté-

dam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediae saturatè virides, viridi ad luteum vergente terminatæ : utrinque proximè sequens ad duas circiter tertias longitudinis partes usque saturatè viridis, in reliqua longitudine viridi-lutea ; in latere tamen interiore macula extat rubra saturatè viridem inter & viridiluteum colorem posita : tertia præcedenti concolor, ab illa tamen discrepans in eo quod macula rubra, in latere interiore posita, sit paulò major, & alterâ insuper maculâ concolore, sed minori ; in latere exteriori prædita sit : tres utrinque extimæ exteriùs ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque saturatè virides, inde ad apicem viridi-luteæ, maculâ rubrâ viridiluteum inter & saturatè viridem colorem positâ, interius verò ab ipsarum exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque rubræ, in reliqua longitudine viridiluteæ ; in rubro autem colore versùs duas tertias cujuslibet rectricis longitudinis partes lata extat tænia transversa viridi saturatissimo & fermè nigro imbuta ;

versus exortum trium istarum rectricum color ruber à latere interiore ad latus exterius paululùm protenditur. Duodecim rectrices scapis donantur nigris. Rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt. Oculos circumdat cutis nuda cinereo-alba : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò aureæ. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda dilutè cinerea, in qua nares sunt positæ. Rostrum cinereum. Pedes cinereo - albi ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Amazonum* regione & *Brazilia*. *Ex museo Reaumuriano.*

rieur. Les tiges des douze plumes de la queue sont noires. Les plumes du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue, d'un gris-blanc : leur prunelle est noire ; & leur iris est de couleur d'or. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue, d'un cendré - clair, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est cendré. Les pieds sont d'un gris-blanc ; & les ongles noirâtres. On le trouve dans le pays des *Amazones* & au *Brazil*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

**** 32. LE PERROQUET AMAZONE A FRONT JAUNE.**

Psittacus major brevicaudus, viridis, colli pennis in apice nigro marginatis, cœruleo admixto ; syncipite pallidè flavo ; vertice, genisque luteis ; tæniâ supra oculos cœruleâ ; remigibus quatuor intermediis exterius superne primâ medietate rubris ; rectricibus tribus utrinque extimis interiùs rubris, tæniâ transversâ saturatè viridi notatis, apice viridiluteis, tribus utrinque extimæ proximis exterius rubrâ maculâ insignitis, extimâ exterius cœruleo-violaceâ
PSITTACUS AMAZONICUS FRONTE LUTEA.

Cum præcedente crassitie convenit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem æquat, & ad extremos un-

Il est de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces

huit lignes. Son bec, qui a douze lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche treize lignes de long; sa queue quatre pouces sept lignes; son pied huit lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, quinze lignes & demie, l'intérieur onze lignes; l'extérieur de ceux de derrière quatorze lignes, & l'intérieur huit lignes. Il a deux pieds un pouce de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le synciput est d'un jaune pâle. Le sommet de la tête & les joues sont d'un jaune plus foncé. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale bleue, qui part de la base du bec & s'étend au-dessus de l'œil. La gorge est couverte de plumes jaunes, terminées de bleu clair. Celles qui couvrent le derrière de la tête & le col, sont vertes, & bordées par le bout de noir, au-dessus duquel est un peu de bleu. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, celles du dessus de la queue, la poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont verts. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd

gues novem pollices & octo lineas. Rostrum, duodecim cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda quatuor pollices & septem lineas; pes octo lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue quindecim cum semi lineas, intimus undecim lineas; posteriorum extimus quatuordecim lineas, intimus octo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & pollicis unius intervallo distant; alæ verò complicatæ duas circiter tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Synciput pallidè flavet. Vertex capitis & genæ saturatori luteo tinguntur. In utroque capitis latere tania extat longitudinalis cœrulea, à basi rostri orta & supra oculum protensa. Guttur cooperiunt pennæ luteæ, dilutè cœruleo terminatæ. Quæ caput posterius & collum obtegunt, sunt virides, in apice nigro marginatæ, cum paucis super nigrum cœruleo mixto. Dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ virides. Scapulares, alas superne cooperientes, superioresque

caudæ testrices concolores. Pennæ caudam subtus obtegentes ex viridi ad luteum vergentes. Testrices alarum superiores minores virides : majores concolores , sed dilutiùs. Alarum margines , versùs articulum carpo humano respondentem , luteo-aurantiæ. Remiges sex primores superne in latere interiore nigræ , in exteriori ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque virides , à medietate ad apicem cœruleo-violacæ ; subtus verò exteriùs nigræ , interiùs in exortu dilutè virides , versùs apicem nigræ , duobus istis coloribus quamlibet pennam obliquè dividenti-bus : quatuor quæ sequuntur , à septima scilicet ad decimam usque inclusivè , superne in latere interiore nigræ , in exteriori ab ipsarum exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque rubræ , in reliqua longitudine cœruleo-violacæ , cum paucis viridi cœruleo-violaceum inter & rubrum colorem posito ; infernè verò in utroque latere dilutè virides : undecima & duodecima superne sex primoribus concolores , subtus autem dilutè virides ; tres sequen-

tirant sur le jaune. Les petites du dessous des ailes , sont vertes : les grandes sont d'un verd plus clair. Le bord de l'aile , vers le pli qui répond à celui du poignet , est d'un jaune-orangé. Les six premières plumes de l'aile sont en-dessus noires du côté intérieur , leur côté extérieur est verd depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur , & de là jusqu'à son bout il est d'un bleu-violet ; mais en-dessous elles sont noires du côté extérieur , & leur côté intérieur est d'un verd clair à son origine , & noir vers le bout , ces deux couleurs coupant obliquement chaque plume : les quatre suivantes , sçavoir depuis la septième jusqu'à la dixième inclusivement , sont en-dessus noires du côté intérieur , leur côté extérieur est rouge depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur , le reste est d'un bleu - violet , cette couleur étant séparée de rouge par un peu de verd ; & en-dessous elles sont des deux côtés d'un verd clair : l'onzième & la douzième sont colorées en-dessus comme les six premières ; mais en-dessous elles sont d'un verd clair : les trois suivantes , sçavoir depuis la treizième jusqu'à la quinzième inclusivement , sont

en-dessus noires du côté intérieur, vertes & terminées de bleu-violet du côté extérieur; & en-dessous elles sont d'un verd clair : toutes les autres sont vertes en-dessus, excepté leur côté intérieur, qui est noirâtre vers l'origine de la plume seulement, & d'un verd clair en-dessous. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un verd foncé, & terminées de verd tirant sur le jaune : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est d'un verd-foncé jusque vers les deux tiers de sa longueur, le reste est d'un verd-jaune; mais il y a sur le côté intérieur une tache rouge placée entre le verd foncé & le verd-jaune : la troisième est colorée comme cette dernière, avec cette différence seulement que la tache rouge qu'elle a sur son côté intérieur, est un peu plus grande, & qu'elle en a de plus une seconde de la même couleur, mais plus petite sur son côté extérieur : les deux qui suivent celle-ci, savoir la quatrième & la cinquième, sont du côté extérieur d'un verd foncé depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, le reste est d'un verd-jaune, cette dernière couleur étant séparée du verd foncé

tes, à decima-tertia scilicet ad decimam-quintam usque inclusivè, superne in latere interiore nigra, in exteriori virides, cœruleo-violaceo terminata, subtus verò dilutè virides : reliquæ omnes superne virides, latere tamen interiore versùs remigis exortum nigricante, infernè dilutè virides. Cauda duodecim conflatur rectricibus, quarum binæ intermediæ sunt saturatè virides, viridi ad luteum vergente terminatæ: utrinque proximè sequens ad duas circiter tertias longitudinis partes usque saturatè viridis, in reliqua longitudine viridi-lutea; in latere tamen interiore macula extat rubra saturatè viridem inter & viridi-luteum colorem posita : tertia præcedenti concolor, ab illa tamen discrepans in eo quod macula rubra, in latere interiore posita, sit paulò major, & alterâ insuper maculâ concolore, sed minori, in latere exteriori prædita sit : binæ sequentes, quarta scilicet & quinta, exterius ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque saturatè virides, inde ad apicem viridi-lutea, maculâ rubrâ viridi-luteum inter

inter & saturatè viridem colorem posita, interiùs verò ab ipsarum exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque rubræ, in reliqua longitudine viridi-luteæ; in rubro autem colore versùs duas tertias cujuslibet rectricis longitudinis partes lata extat tænia transversa viridi saturatissimo & fermè nigro imbuta; versùs exortum duarum istarum rectricum color ruber à latere interiore ad latus exterius paululùm protenditur: utrinque extrema duabus proximè præcedentibus concolor, sed in latere interiore tantùm, in exteriore autem ab ipsius exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque cœruleo-violacea, inde ad apicem viridi-lutea: tres insuper rectrices utrinque extremæ paululùm cœrulei diluti in apice admixtum habent. Duodecim rectrices scapis nigris præditæ sunt. Rectrices intermedia lateralium longitudinem paululùm superant. Oculos circumdat cutis nuda candicans: ipsorum pupilla est nigra; irides verò luteæ. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda ex albo flavicans, in

Tom. IV.

par une tache rouge; du côté intérieur elles sont rouges depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur, & d'un verd-jaune de là jusqu'à leur bout; mais le rouge est traversé vers les deux tiers de la longueur de chaque plume par une large bande d'un verd très-foncé & presque noir; de plus vers l'origine de ces deux plumes le rouge du côté intérieur s'étend un peu sur le côté extérieur: la plus extérieure de chaque côté est colorée comme ces deux dernières du côté intérieur seulement, mais son côté extérieur est d'un bleu-violet depuis son origine jusque vers les trois quarts de sa longueur, le reste étant d'un verd-jaune: les trois plumes les plus extérieures de chaque côté ont de plus un peu de bleu clair mêlé à leur bout. Les tiges des douze plumes de la queue sont noires. Les plumes du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue & blanchâtre: leur prunelle est noire; & leur iris est jaune. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue, d'un blanc-jaunâtre, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est jaunâtre à son origine, & cendré vers son

LI

bout. Les pieds sont d'un gris-blanc ; & les ongles noirâtres. On le trouve dans le pays des *Amazones* & au *Bresil*. Du cabinet de *M. l'Abbé Aubry*.

qua nares sunt positæ. Rostrum in exortu lutescens, in apice cinereum. Pedes cinereo-albi ; ungues verò nigricantes. Habirat in *Amazonum* regione & *Brasilia*. Ex museo *D. Aubry*.

** 33. LE PERROQUET AMAZONE A GORGE BLEUE.

Voyez Pl. XXV. Fig. 1.

Psittacus major brevicaudus, viridis, pennis in apice superne nigro, infernè cœrulescentē marginatis ; capite anteriùs & collo inferiore cinereo-cœruleis, ad violaceum vergentibus ; maculâ in summo pectore rubrâ ; remigibus quatuor intermediis exterius superne primâ medietate rubris ; rectricibus tribus utrinque extimis interiùs in exortu rubris, dein viridibus, apice viridi-luteis, extimâ superne in utroque latere cœruleo mixtâ . . . *PSITTACUS AMAZONICUS GUTTURE CÆRULEO*.

Il est aussi gros qu'une *Cornille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces six lignes. Son bec, qui a quinze lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche quinze lignes de long ; sa queue cinq pouces neuf lignes ; son pied dix lignes ; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'intérieur treize lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière un pouce six lignes, & l'inté-

Cum *Cornice* crassitie convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices æquat, & ad extremos ungues undecim pollices & sex lineas. Rostrum, quindecim cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos quindecim lineas longum est ; cauda quinque pollices cum novem lineis ; pes decem lineas ; digitorum anteriorum extimus cum ungue unum pollicem & novem lineas, intimus tredecim cum semi lineas ; postico-

rum exterior unum pollicem & sex lineas , interior decem cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & sex pollicum ; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Capitis anterior pars, guttur & collum inferius pennis vestiuntur cinereo-cœruleis , ad violaceum vergentibus , splendido viridi marginatis. Quæ reliquum caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium obtegunt, sunt virides, in apice nigricante marginatæ. Scapulares minores concolores. Superiores caudæ rectrices viridi-flavican-tes. In summo pectore majuscula extat macula rubra. Pectus & ventrem cooperiunt pennæ virides, in apice cœrulescente marginatæ. Quæ latera obtegunt, eodem viridi imbutæ, sed in apice nigro fimbriatæ. Crura similiter vestiunt pennæ virides, pennis calcaneum cooperientibus cœruleo marginatis. Rectrices caudæ inferiores sunt viridi-luteæ. Alarum minores superiores & inferiores, sicut & majores su-

rieur dix lignes & demie. Il a deux pieds six pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La partie antérieure de la tête, la gorge & le dessous du col sont d'un cendré-bleu tirant sur le violet, chaque plume étant bordée d'un verd brillant. Le reste de la tête, le dessus du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes vertes, bordées de noirâtre par le bout. Les petites plumes scapulaires sont de la même couleur. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd-jaunâtre. Au haut de la poitrine est une grande tache rouge. La poitrine & le ventre sont couverts de plumes vertes, bordées de bleuâtre par le bout. Celles qui couvrent les côtés, sont du même verd, mais leur bout est bordé de noir. Les jambes sont aussi couvertes de plumes vertes, celles qui couvrent le talon, étant bordées de bleu. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd-jaune. Les petites du dessus & du dessous des aîles, ainsi que les grandes du dessus les plus proches du corps, & les grandes plumes scapulaires sont vertes : les grandes couvertures du dessous des aîles sont d'un verd

plus foncé : les grandes du dessus les plus éloignées du corps sont aussi d'un verd foncé, mais elles sont noires dans leur milieu. La première des plumes de l'aile est noire : les neuf suivantes, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la dixième inclusivement, sont en-dessus noires du côté intérieur, leur côté extérieur est d'un verd foncé depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, ensuite il est d'un violet très-foncé, & enfin terminé de noir, cette dernière couleur occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus éloignée du corps ; mais en-dessous elles sont noires du côté extérieur, & leur côté intérieur est d'un verd-bleu à l'origine de la plume, & noir vers le bout, ces deux couleurs coupant obliquement chaque plume : les trois suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la treizième inclusivement, sont en-dessus noires du côté intérieur, leur côté extérieur est rouge depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, ensuite il est d'un violet très-foncé, & enfin terminé de noir ; & en-dessous elles sont d'un verd-bleu : la quatorzième est pareillement en-dessous d'un verd-bleu, & en-dessus noire du côté inté-

rieures corpori finitimæ, & scapulares majores virides : teñtrices alarum inferiores majores viridi saturatione imbutæ : superiores majores à corpore remotiores viridi saturato similiter tinctæ, at tamen in medio nigra. Remix prima est nigra : novem quæ sequuntur, à secunda scilicet ad decimam usque inclusivè, superne in latere interiore nigra, in latere exteriori ab ipsarum exortu mediani versus longitudinem usque saturatè virides, dein saturatissimo violaceo tinctæ, & tandem nigro terminatæ, nigro quidem eò majus spatium occupante, quò remix fit à corpore remotior ; infernè verò exterius nigra, interiùs in exortu viridi-cœruleæ, versus apicem nigra, duobus istis coloribus unamquamque pennam obliquè dividuntibus : tres sequentes ab undecima scilicet ad decimam tertiam inclusivè, superne in latere interiore nigra, in exteriori ab ipsarum exortu mediani versus longitudinem usque rubra, dein saturatissimè violaceæ, denique nigro terminatæ ; subtus verò viridi-cœruleæ : decima-quarta similiter infernè viridi-cœru-

lea, superne in latere interiore nigra; in latere verò exteriori in exortu rubra, dehinc viridis, tandem saturatè violacea & nigro terminata: ex sequentibus tres, à decima-quinta scilicet ad decimam-septimam usque inclusivè, superne exterius virides, interiùs nigrae, in apice saturatè violaceae, subtus autem viridi-cœruleae: decima-octava & decimanona superne in latere exteriori & apice virides, in interiore nigrae, cum paucò versùs apicem violaceo saturato; infernè viridi-cœruleae: reliquae omnes subtus viridi-cœruleae, superne virides, ad latus tamen interius versùs ipsarum exortum nigrae, nigro quidem colore eò minus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediae virides, viridi-lutescente terminatae: binæ utrinque proximae in latere exteriori virides, viridi-luteo terminatae, in interiore in exortu nigricantes, dein virides, & tandem apice viridi-luteae: quarta & quinta similiter exterius virides, viridi-luteo terminatae, interiùs verò in exortu

rieur; mais son côté extérieur est rouge à son origine, ensuite verd, & enfin d'un violet foncé & terminé de noir: les trois suivantes, sçavoir depuis la quinzième jusqu'à la dix-septième inclusivement, sont en-dessus vertes du côté extérieur, noires du côté intérieur, & terminées de violet foncé, & en-dessous elles sont d'un verd-bleu: la dix-huitième & la dix-neuvième sont en-dessus vertes du côté extérieur & à leur bout, noires du côté intérieur, avec un peu de violet foncé vers le bout; & en-dessous elles sont d'un verd-bleu: toutes les autres sont d'un verd-bleu en-dessous, & vertes en-dessus, excepté du côté intérieur vers leur origine, où elles sont noires, cette couleur occupant d'autant moins d'espace, que la plume est plus proche du corps. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont vertes, & terminées de verd-jaunâtre: les deux qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont du côté extérieur vertes & terminées de verd-jaune, leur côté intérieur est noirâtre à son origine, ensuite verd, & enfin terminé de verd-jaune: la quatrième & la cinquième sont pareillement du côté extérieur vertes & ter-

minées de verd-jaune, mais leur côté intérieur est rouge à son origine, ensuite verd, & terminé de verd-jaune : la plus extérieure de chaque côté est colorée comme ces deux dernières, avec cette différence seulement qu'en-dessus son verd est mêlé d'un peu de bleu. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue, d'un cendré clair. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue, de la même couleur, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est blanchâtre à son origine, & noirâtre à son bout. Les pieds sont gris; & les ongles noirs. On le trouve au *Mexique* & au *Brésil*. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

rubra, dehinc virides, & tandem apice viridi-lutea: utrinque extrema duabus præcedentibus concolor, ab illis tamen discrepans in eo quod superne aliquid cœrulei viridi sit admixtum. Rectrices intermedia lateralium longitudinem nonnihil superant. Oculos circumdat cutis nuda dilute cinerea. Basim mandibula superioris similiter ambit cutis nuda concolor, in qua nares collocatae sunt. Rostrum in exortu candicans, in apice nigricans. Pedes grisei; ungues verò nigri. Habitat in *Mexico* & *Brasilia*. Ex museo D. Aubry.

34. LE PERROQUET AMAZONE A BEC VARIÉ.

Psittacus major brevicaudus, viridis, infernè ad luteum vergens; vertice luteo; remigibus quibusdam intermediis exterius superne in medio rubris; rectricibus quatuor utrinque extremis in exortu exterius viridibus, interiùs luteis, dein rubris, versùs apicem viridibus, apice luteis . . .
PSITTACUS AMAZONICUS POIKILORYNCHOS.

Psittacus poikilorinchos. Aldrov. Avi. Tom. 1. pag. 670. hujus icon satis accurata pag. 671.
Jonst. Avi. pag. 22. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XIV.
Charlet. Exer. pag. 74. N^o. 5.
Charlet. Onomazt. pag. 67. N^o. 5.

Plittacus poikilorynchos Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 74.*

Raj. Syn. Avi. pag. 30. N°. 3.

Cum *Gallina* crassitie convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & sex pollices æquat. Pedes habet unum pollicem longos. Vertex capitis luteo tingitur colore. Reliquum caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ testrices sunt virides. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crura & testrices caudæ inferiores virides quidem, sed ad luteum vergentes. Remiges alarum majores sunt superne in latere interiore nigræ, in exteriori ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque virides, à medietate ad apicem cœruleo-violacæ; subtus verò penitus nigræ : quæ sequuntur, superne in latere interiore nigræ, in exteriori verò primum in ipsarum exortu virides, deinde rubræ, dehinc rursus virides, postremum apice ipso partim violaceo, partim nigro vicissim variegatæ, infernè penitus nigræ : reliquæ omnes totæ luteæ.

Il est de la grosseur d'une Poule. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix-huit pouces. Ses pieds ont un pouce de long. Le sommet de la tête est jaune. Le reste de la tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont verts. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd tirant sur le jaune. Les grandes plumes de l'aile sont noires en-dessus du côté intérieur, leur côté extérieur est verd depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & de-là jusqu'à leur bout d'un bleu-violet ; & en-dessous elles sont tout-à-fait noires : les suivantes sont en-dessus noires du côté intérieur, tandis que leur côté extérieur est d'abord verd à l'origine de la plume, ensuite rouge, après quoi il est encore verd, & enfin varié à son bout de violet & de noir ; mais en-dessous elles sont tout-à-fait noires : toutes les

autres sont entièrement jaunes. La queue est composée de douze plumes : les quatre du milieu sont vertes, & terminées de jaune : les quatre plus extérieures de chaque côté sont à leur origine vertes du côté extérieur, & jaunes du côté intérieur ; ensuite elles sont rouges, après quoi elles redeviennent vertes, & sont terminées de jaune. Le demi-bec supérieur est en sa partie supérieure d'un verd tirant sur le bleu, ses côtés sont de couleur d'ochre, & vers son extrémité est une bande transversale blanche : le demi-bec inférieur est jaunâtre dans son milieu, & toute sa circonférence est de couleur de plomb. Les pieds sont de cette dernière couleur ; & les ongles noirâtres. J'ignore en quel endroit on le trouve.

Caudam componunt duodecim rectrices : quatuor intermedia virides, luteo terminata : quatuor utrinque extrema in exortu exterius virides, interius lutea, dein rubra, versus apicem virides, apice tamen lutea. Mandibula superior in superiore parte ex viridi ad caeruleum inclinans, ad latera colore ochrae imbuta, & versus ipsius extremitatem tantâ transversâ candidâ insignita : inferior in medio lutescens, in tota circumferentia plumbeo colore tincta. Pedes similiter plumbei coloris ; ungues verò nigricantes. In quo loco habitat, penitus me latet.

** 35. LE PERROQUET AMAZONE DU BRÉSIL :

Voyez Pl. XXVI. Fig. 1.

Psittacus major brevicaudus, viridis, infernè ad luteum vergens, colli pennis in apice nigro marginatis ; vertice luteo ; remigibus quinque intermediis exterius superne primâ medietate rubris ; rectricibus quatuor utrinque extremis interius primâ medietate rubris, dein saturatè viridibus, apice luteo-viridibus, rubro mixtis . . . *PSITTACUS AMAZONICUS BRASILIENSIS*.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Pigeon Romain*. Sa Crassitie *Columbam Romanam* circiter aequat. Ipsi longitudo

longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & decem lineas explet, & ad extremos ungues decem pollices & septem lineas. Rostrum, quod quatuordecim lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda quatuor pollices & novem lineas; pes decem lineas; digitorum anteriorum exterior cum ungue sexdecim cum semi lineas, interior unum pollicem; posteriorum extimus quindecim lineas, intimus novem lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum unius pollicis & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Vertex capitis luteo tingitur. Reliquum caput, guttur & collum vestiunt pennæ virides, in apice nigro marginatæ. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ rectrices sunt virides. Pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices ex viridi ad luteum vergunt. Pennæ alas subtus obtegentes viridis sunt coloris. Alarum margines, in-

Tom. IV.

longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces sept lignes. Son bec, qui a quatorze lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche treize lignes de long; sa queue quatre pouces neuf lignes; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, seize lignes & demie, l'intérieur un pouce; l'extérieur de ceux de derrière quinze lignes, & l'intérieur neuf lignes. Il a deux pieds un pouce six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est jaune. Le reste de la tête, la gorge & le col sont couverts de plumes vertes, bordées de noir par le bout. Le dos & le croupion sont verts. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd tirant sur le jaune. Les couvertures du dessous des ailes sont vertes. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est varié de

M m

verd-jaune & de rouge. Les plus petites couvertures du dessus des ailes, sçavoir celles qui couvrent le pli de l'aîle qui répond à celui du poignet, sont d'un beau rouge : toutes les autres sont vertes. Les huit premières plumes de l'aîle sont en-dessus noires du côté intérieur, leur côté extérieur est verd depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son bout il est d'un bleu-violet ; mais en-dessous elles sont noires du côté extérieur, & leur côté intérieur est d'un verd clair à son origine, & noir vers le bout, ces deux couleurs coupant obliquement chaque plume : la neuvième & la dixième sont pareillement en-dessus noires du côté intérieur, & ont leur côté extérieur verd depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & de là jusqu'à leur bout d'un bleu-violet ; mais en-dessous elles sont des deux côtés d'un verd clair : les cinq suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la quinzième inclusivement, sont en-dessus noires du côté intérieur, leur côté extérieur est rouge depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur, le reste est d'un bleu-violet, cette couleur étant séparée du rouge par un peu

fra articulum carpo humano respondentem, viridi-luteo & rubro variegantur. Tectrices alarum superiores minimæ, eæ scilicet quæ alarum articulum carpo humano respondentem obtegunt, eleganti rubro imbuuntur : reliquæ omnes sunt virides. Remiges octo primores superne in latere interiore nigra, in exteriori ab ipsarum exortu mediam versus longitudinem usque virides, à medietate ad apicem cœruleo-violaceæ ; subtus verò exteriori nigra, interiori in exortu dilutè virides, versus apicem nigra, duobus istis coloribus quamlibet pennam obliquè dividitibus : nona & decima similiter superne in latere interiore nigra, in exteriori ab ipsarum exortu ad mediam circiter longitudinem usque virides, inde ad apicem cœruleo-violaceæ ; subtus autem in utroque latere dilutè virides : quinque sequentes, ab undecima scilicet ad decimam quintam usque inclusivè, superne in latere interiore nigra, in exteriori ab ipsarum exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque rubra, in reliqua longitudine cœruleo-violaceæ, cum

pauco viridi cœruleo-violaceum inter & rubrum colorem posito, infernè dilutè virides: decima-sexta similiter subtus dilutè viridis, superne verò interiùs nigra, exteriùs viridis, mediam versùs longitudinem maculâ rubrâ, & in apice maculâ cœruleo-violaceâ insignita: binæ quæ sequuntur, decima-septima scilicet & decima-octava, superne in latere exteriore & apice virides, apice quidem maculâ cœruleo-violaceâ notato, in latere interiore nigra; subtus autem dilutè virides: reliquæ omnes superne virides, latere tamen interiore versùs remigis exortum nigricante, infernè dilutè virides. Duodecim reſtrictibus cauda constat: binæ intermediæ saturatè virides, in apice nonnihil ad luteum inclinantes: utrinque proximè sequens ab ipsius exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque pariter saturatè viridis, in reliqua longitudine viridi-lutea: quatuor utrinque extimæ in latere exteriore ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque virides, inde ad apicem viridi-luteæ; in latere verò interiore in

de verd; & en-dessous elles sont d'un verd clair: la seizième est pareillement en-dessous d'un verd clair; mais en-dessus elle est noire du côté intérieur, son côté extérieur est verd, & marqué vers son milieu d'une tache rouge & à son bout d'une tache de bleu-violet: les deux suivantes, sçavoir la dix-septième & la dix-huitième, sont en-dessus vertes du côté extérieur & à leur bout, lequel est marqué d'une tache de bleu-violet, & noires du côté intérieur; mais en-dessous elles sont d'un verd clair: toutes les autres sont vertes en-dessus, excepté leur côté intérieur, qui est noirâtre vers l'origine de la plume seulement, & d'un verd clair en-dessous. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont d'un verd foncé, tirant un peu sur le jaune au bout de chaque plume: celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est aussi d'un verd foncé depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur, le reste est d'un verd-jaune: les quatre plus extérieures de chaque côté sont vertes du côté extérieur depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, le reste étant d'un verd-jaune; mais leur côté intérieur est rouge à

l'origine de la plume, ensuite d'un verd foncé, & terminé de jaune-vert, lequel est mêlé d'un peu de rouge près de l'endroit où finit le verd foncé : chacune de ces quatre plumes a d'autant plus de rouge qu'elle est plus extérieure. Les tiges des douze plumes de la queue sont noires. Les plumes du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue & blanchâtre : leur prunelle est noire ; & leur iris est jaune. La base du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue, de couleur de chair, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est cendré, excepté la base du demi-bec supérieur, qui est de couleur de rose. Les pieds sont d'un gris-blanc ; & les ongles noirâtres. On le trouve dans le pays des *Amazones* & au *Bresil*. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

exortu rubræ, dein saturatè virides, & tandem apice luteo virides; qui color luteo-viridis paululùm rubri admixtum habet eo in loco in quo definit color saturatè viridis: in istis quatuor rectricibus color ruber eò majus spatium occupat, quò rectrix fit exterior. Duodecim rectrices scapis donantur nigris. Rectrices intermedix lateralium longitudinem paululùm excedunt. Oculos circumdat cutis nuda candicans: ipsorum pupilla est nigra; irides verò luteæ. Basin mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda carneo colore imbuta, in qua nares sunt positæ. Rostrum cinereum, exceptâ mandibulæ superioris basi roseâ. Pedes cinereo-albi; ungues verò nigricantes. Habitat in *Amazonum* regione & *Brasilia*. *Ex museo D. Aubry.*

**** 36. LE PERROQUET AMAZONE DE LA JAMAÏQUE.**

Psittacus major brevicaudus, viridis, infernè ad luteum vergens, superne pennis in apice nigro marginatis; syncipite cœruleo-beryllino; vertice pallidè flavo; genis & gutture luteis; remigibus quinque intermediis exterius superne primâ medietate rubris; rectricibus quatuor utrinque extimis interiorius primâ medietate rubris, luteo marginatis, alterâ viridibus, luteo terminatis . . . **PSITTACUS AMAZONICUS JAMAICENSIS.**

Psittacus medius viridis, luteo quandoque varius, angulis alarum rubris. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 472.*

Psittacus viridis, alarum costâ superne rubente. *Aldrov. Avi pag. 668. hujus icon non satis accurata pag. 669.*

Jonst. Avi. pag. 22. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XIV, sub titulo, Psittacus viridis.

Charlet. Exer. pag. 74. N° 4.

Charlet. Onomazt. pag. 66. N° 4.

Psittacus viridis, alarum costâ superne rubente Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 74. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVI, sub titulo, Psittacus mediæ magnitudinis.*

Raj. Syn. Avi. pag. 30. N° 2.

Raj. Syn. Avi. pag. 181. N° 6.

Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 297. N° VII.

Psittacus viridis, alarum costâ superne rubente Jonstoni. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. II. sp. 5.*

Psittacus major, viridis, alarum costâ superne rubente. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 144.*

Perroquet de la riviere des Amazones. *Nouv. Voy. de l'Amér. Tom. II. pag. 159.*

Les Anglois l'appellent COMMON PARROT. *Willugh. MAIN-PARROT. Browne.*

Les François de la Guiane PERROQUET AMAZONNE. *Barr.*

Cum præcedente crassitie convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duodecim pollices & quatuor lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices cum lineis binis. Rostrum, quatuordecim lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda quatuor pollices & decem lineas; pes octo lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & sex lineas, intimus duodecim cum semi li-

Il est de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces deux lignes. Son bec, qui a quatorze lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche treize lignes de long; sa queue quatre pouces dix lignes; son pied huit lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce six lignes, l'intérieur douze lignes & demie; l'extérieur de ceux de derriere quinze lignes & de-

mie, & l'intérieur neuf lignes & demie. Il a deux pieds un pouce six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le synciput est d'un bleu d'Aigue-marine : cette couleur s'étend un peu de chaque côté au-dessus des yeux. Le sommet de la tête est d'un jaune pâle. Les joues & la gorge sont d'un jaune plus foncé : cette couleur descend un peu sur la partie inférieure du col. Le derrière de la tête, le col, la partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un beau verd, chaque plume étant bordée de noir par le bout. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont du même verd, mais les plumes ne sont point bordées de noir. La poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un verd tirant sur le jaune. Le haut des jambes est verd; & le bas en est jaune. Les petites couvertures du dessous des ailes sont d'un verd tirant sur le jaune : les grandes sont d'un verd clair. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est varié de jaune & de rouge. Les plus

neas; posticorum extimus quindecim cum semi lineas, intimus novem cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum unius pollicis & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Synciput colore imbuatur cœruleo-beryllino : qui color supra oculos paululum utrinque protenditur. Vertex capitis est pallidè luteus. Genæ & guttur saturatiore tinguntur luteo : qui color supra collum inferius paululum extenditur. Capitis posterior pars, collum, pars dorsi suprema & scapulares pennæ sunt virides, quâlibet pennâ in apice nigro marginatâ. Dorsum infimum, uropygium, superioresque caudæ teatrices eodem viridi imbuuntur, sed pennæ marginibus nigris destituuntur. Pectus, venter, latera & teatrices caudæ inferiores ex viridi ad luteum vergunt. Crura in suprema parte viridia, in parte infima lutea. Teatrices alarum inferiores minores ex viridi ad luteum inclinantes : majores dilutè virides. Alarum margines,

infra articulum carpo humano respondentem, luteo & rubro variæ. Tectrices alarum superiores minimæ, istæ scilicet quæ articulum carpo humano respondentem obtegunt, eleganter rubræ: reliquæ omnes virides. Remiges octo primores superne in latere interiore nigræ, in exteriori ab ipsarum exortu mediam versus longitudinem usque virides, à medietate ad apicem cœruleo-violaceæ; subtus verò exterius nigræ, interiùs in exortu dilutè virides, versus apicem nigræ, duobus istis coloribus quamlibet pennam obliquè dividitibus: nona & decima similiter superne in latere interiore nigræ, in exteriori ab ipsarum exortu ad mediam circiter longitudinem usque virides, inde ad apicem cœruleo-violaceæ; subtus autem in utroque latere dilutè virides: quinque sequentes, ab undecima scilicet ad decimamquintam usque inclusivè, superne in latere interiore nigræ, in exteriori ab ipsarum exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque rubræ, in reliqua longitudine cœruleo-violaceæ, cum pauco viridi cœruleo-

petites couvertures du dessous des aîles, sçavoir celles qui couvrent le pli de l'aîle qui répond à celui du poignet, sont d'un beau rouge: toutes les autres sont vertes. Les huit premières plumes de l'aîle sont en-dessus noires du côté intérieur, leur côté extérieur est verd depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son bout il est d'un bleu-violet; mais en-dessous elles sont noires du côté extérieur, & leur côté intérieur est d'un verd clair à son origine, & noir vers le bout, ces deux couleurs coupant obliquement chaque plume: la neuvième & la dixième sont pareillement en-dessus noires du côté intérieur, & ont leur côté extérieur verd depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & de-là jusqu'à leur bout d'un bleu-violet; mais en-dessous elles sont des deux côtés d'un verd clair: les cinq suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la quinzième inclusivement, sont en-dessus noires du côté intérieur, leur côté extérieur est rouge depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur, le reste est d'un bleu-violet, cette couleur étant séparée du rouge par un peu de verd; mais en-

deffous elles font d'un verd clair : la feizième est pareillement en - deffous d'un verd clair ; mais en-deffus elle est noire du côté intérieur, son côté extérieur est verd, & marqué vers son milieu d'une tache rouge & à son bout d'une tache de bleu-violet : les deux suivantes, fçavoir la dix-septième & la dix-huitième, font en-deffus vertes du côté extérieur & à leur bout, lequel est marqué d'une tache de bleu-violet, & noires du côté intérieur ; mais en deffous elles font d'un verd clair : toutes les autres font vertes en-deffus, excepté leur côté intérieur, qui est noirâtre vers l'origine de la plume seulement, & d'un verd clair en-deffous. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu font d'un verd qui tire un peu sur le jaune au bout de chaque plume : celle qui les fuit immédiatement de chaque côté, est verte & terminée de jaune : les quatre plus extérieures de chaque côté font de la même couleur du côté extérieur ; mais leur côté intérieur est à leur origine rouge & bordé de jaune, ensuite il est verd & terminé de jaune : dans chacune de ces plumes le rouge s'étend d'autant plus loin vers son extrémité, qu'elle est plus exté-

violaceum inter & rubrum colorem posito, infernè dilutè virides : decima - sexta similiter subtus dilutè viridis, superne verò interiùs nigra, exteriùs viridis, mediam versùs longitudinem maculâ rubrâ, & in apice maculâ cœruleo-violaceâ insignita : binæ quæ sequuntur, decima - septima scilicet & decima - octava, superne in latere exteriore & apice virides, apice quidem maculâ cœruleo-violaceâ notato, in latere interiore nigræ ; subtus autem dilutè virides ; reliquæ omnes superne virides, latere tamen interiore versùs remigis exortum nigricante, infernè dilutè virides. Caudam componunt duodecim rectrices : binæ intermediae virides, in apice nonnihil ad luteum inclinantes : utrinque proximè sequens viridis, apice lutea : quatuor utrinque extremae in latere exteriore concolores ; in interiore vero in exortu rubræ, luteo marginatæ, deinde virides, & tandem luteo terminatæ : in qualibet ex istis rectricibus color ruber eò magis versùs ipsius apicem protenditur, quò rectrix exterior fit. In tribus rectricibus utrinque extremae

timæ vicinioribus color ruber ab interiore latere ad latus exterius quoque nonnihil extenditur. Duodecim rectrices scapis nigris præditæ sunt. Rectrices intermedia lateralium longitudinem paululum superant. Oculos circumdat cutis nuda candida : ipsorum pupilla est nigra : irides verò rubescentes. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda cinerea, in qua nares sitæ sunt. Mandibula superior in exortu rubra, in medio cinereo-cœrulea, apice nigra; mandibula inferior candida. Pedes cinereo-albi; ungues verò nigricantes. Habitat in *Jamaica, Guiana, Amazonum regione & Brasilia. Ex museo Realmuriano.*

rieure. Dans les trois plumes les plus proches de la plus extérieure de chaque côté le rouge s'étend aussi un peu sur le côté extérieur. Les tiges des douze plumes de la queue sont noires. Les plumes du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue & blanche : leur prunelle est noire : & leur iris est rougeâtre. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & cendrée, dans laquelle sont placées les narines. Le demi-bec supérieur est rouge à son origine, d'un cendré-bleu dans son milieu, & noir à son bout; le demi-bec inférieur est blanc. Les pieds sont d'un gris-blanc; & les ongles noirâtres. On le trouve à la *Jamaïque*, dans la *Guiane*, dans le pays des *Amazones* & au *Brésil*. Du cabinet de *M. de Reaumur*.

** 37. LE PERROQUET AMAZONE VARIÉ;

Voyez Pl. XXVI. Fig. 2.

Pittacus major brevicaudus, viridis, infernè ad luteum vergens, pennis in apice nigro marginatis; collo superiore & dorso supremo luteo & rubro variis; syncipite cœruleo-beryllino; vertice pallidè flavo; genis & gutture luteis; remigibus quinque intermediis exterius superne primâ medietate rubris; rectricibus quatuor utrinque extimis interioribus
Tom. IV. Nn

primâ medietate rubris , luteo marginatis , alterâ luteo-
viridibus , taniâ transversâ saturatè viridi notatis , extimâ
exteriùs cœruleo marginatâ PSITTACUS AMAZONICUS
VARIUS.

Psittacus major viridis , maculis luteis & rubris. *Frisch. hujus icon ac-
curata Tab. 49.*

Psittacus viridis major , maculis rubris luteisque , fronte cœruleâ.
Klein. Avi. pag. 25. N°. 12.

Psittaci secunda species. *Marcgr. Hist. Br. pag. 205.*
Jonst. Avi. pag. 140.

Psittaci majoris , seu mediæ magnitudinis Marcgravii secunda species.
Willugh. Ornith. pag. 76.

Raj. Syn. Avi. pag. 33. N°. 2.

Grand Perroquet verd des Indes Occidentales. *Edwards. Tom. IV.
pag. CLXII; avec une figure exacte Pl. 162.*

Les Anglois l'appellent GREAT GREEN PARROT FROM THE WEST-INDIES.
Edwards.

Il est de la même grosseur
que les deux précédens. Sa lon-
gueur depuis le bout du bec
jusqu'à celui de la queue est de
douze pouces neuf lignes , &
jusqu'à celui des ongles de dix
pouces six lignes. Son bec , qui
a treize lignes & demie d'épais-
seur , a depuis son crochet
jusqu'aux coins de la bouche
douze lignes & demie de long ;
sa queue quatre pouces neuf
lignes ; son pied dix lignes ; le
doigt extérieur de devant , joint
avec l'ongle , seize lignes , l'in-
térieur onze lignes ; l'exté-
rieur de ceux de derriere quin-
ze lignes & demie , & l'in-
térieur neuf lignes. Il a deux
pieds un pouce de vol ; & ses
aîles , lorsqu'elles sont pliées ,

Crassitie duos præceden-
tes æmulatur. Ipsius longi-
tudo ab apice rostri ad cau-
dam extremam duodecim
pollices & novem lineas ex-
plet , & ad extremos ungues
decem pollices & sex lineas.
Rostrum , quod tredecim
cum semi lineas crassum , ab
ipsius unco ad oris angulos
usque duodecim cum semi
lineas longum est ; cauda
quatuor pollices cum no-
vem lineis ; pes decem li-
neas ; digitorum anticorum
extimus cum ungue sexde-
cim lineas , intimus unde-
cim lineas ; posticorum ex-
terior quindecim cum semi
lineas , interior novem li-
neas. Ab extremo ad extre-

mum alarum extensarum distantia est duorum pedum & pollicis unius; alæ verò complicatæ duas circiter tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Synciput colore tingitur cœruleo - beryllino. Vertex capitis est pallidè luteus, pauco cœruleo variegatus. Genæ & guttur luteæ: color autem luteus supra collum inferius paululùm extenditur. Caput posterius, pars colli superior & dorsi suprema viridi & luteo variegantur, luteo quidem aliquid rubri admixtum habente, & pennis insuper in apice viridibus, nigro marginatis. Pennæ scapulares sunt virides, in apice nigro fimbriatæ. Dorsum infimum, uropygium, superioresque caudæ rectrices eodem viridi tinctæ, pennis autem marginibus nigris destitutis. Partem colli inferiorem, pectus, ventrem & latera vestiunt pennæ virides, nonnihil ad luteum vergentes, in apice nigro marginatæ. Crura exterius viridi, interius luteo colore imbuta. Rectrices caudæ inferiores, sicut & alarum inferiores minores, ex viridi ad luteum inclinantes: alarum inferiores majores dilutè virides. Su-

s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le synciput est d'un bleu d'Aigue-marine. Le sommet de la tête est d'un jaune pâle, varié d'un peu de bleu. Les joues & la gorge sont jaunes: cette couleur descend un peu sur la partie inférieure du col. La partie postérieure de la tête, & les parties supérieures du col & du dos sont variées de verd & de jaune, cette dernière couleur étant mêlée d'un peu de rouge, & l'extrémité de chaque plume étant verte & bordée de noir. Les plumes scapulaires sont vertes, & bordées de noir par le bout. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont du même verd, mais les plumes ne sont point bordées de noir. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les côtés sont couverts de plumes d'un verd tirant un peu sur le jaune, & dont l'extrémité est bordée de noir. Les jambes sont vertes du côté extérieur, & jaunes du côté intérieur. Les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessous des aîles sont d'un verd tirant sur le jaune: les grandes du dessous des aîles sont d'un verd clair. Les plus petites couvertures du

dessus des ailes, sçavoir celles qui couvrent le pli de l'aîle qui répond à celui du poignet, sont d'un beau rouge, quelques-unes étant terminées de jaune, & le tout étant mêlé de quelques plumes vertes : les moyennes sont variées de verd & de jaune : & les plus grandes sont tout-à-fait vertes. Les huit premières plumes de l'aîle sont en-dessus noires du côté intérieur, leur côté extérieur est verd depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son bout il est d'un bleu-violet ; mais en-dessous elles sont noires du côté extérieur, & leur côté intérieur est d'un verd clair à son origine, & noir vers le bout, ces deux couleurs coupant obliquement chaque plume : la neuvième & la dixième sont pareillement en-dessus noires du côté intérieur, & ont leur côté extérieur verd depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & de là jusqu'à leur bout d'un bleu violet ; mais en-dessous elles sont des deux côtés d'un verd-clair : les cinq suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la quinzième inclusivement, sont en-dessus noires du côté intérieur, leur côté extérieur est rouge depuis leur origine jusque vers

periores alarum tectrices minimæ, istæ scilicet quæ alarum articulum carpo humano respondentem obtegunt, eleganter rubræ, quibusdam luteo terminatis, & plumulis quibusdam viridibus intermixtis : minores viridi & luteo variegatæ : majores penitus virides. Remiges octo primores superne in latere interiore nigræ, in exteriori ab ipsarum exortu mediani versus longitudinem usque virides, à medietate ad apicem cœruleo-violaceæ ; subtus verò exterius nigræ, interius in exortu dilutè virides, versus apicem nigræ, duobus istis coloribus quamlibet pennam obliquè dividitibus : nona & decima similiter superne in latere interiore nigræ, in exteriori ab ipsarum exortu ad mediani circiter longitudinem usque virides, inde ad apicem cœruleo-violaceæ ; subtus autem in utroque latere dilutè virides : quinque sequentes, ab undecima scilicet ad decimam-quintam usque inclusivè, superne in latere interiore nigræ, in exteriori ab ipsarum exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque rubræ, in reliqua longitudine cœruleo-

violaceæ, cum pauco viridi
cœruleo-violaceum inter &
rubrum colorem posito; in-
fernè dilutè virides: decima-
sexta similiter subtus dilutè
viridis, superne verò inte-
riùs nigra, exteriùs viridis,
mediam versùs longitudi-
nem maculâ rubrâ, & in
apice maculâ cœruleo-vio-
laceâ insignita: binæ quæ se-
quuntur, decima-septima
scilicet & decima-octava,
superne in latere exteriori
& apice virides, apice qui-
dem maculâ cœruleo-vio-
laceâ notato, in latere in-
teriori nigra; subtus autem
dilutè virides: reliquæ om-
nes superne virides, latere
tamen interiori versùs remi-
gis exortum nigricante, in-
fernè dilutè virides. Cauda
duodecim conflatur rectri-
cibus, quarum binæ inter-
mediæ saturatè virides, in
apice nonnihil ad luteum in-
clinantes: utrinque proxima
ab ipsius exortu ad duas cir-
citer tertias longitudinis par-
tes usque pariter saturatè vi-
ridis, in reliqua longitudine
viridi-lutea: tres utrinque
sequentes in latere exteriori
concolores, in interiori ab
ipfarum exortu mediam ver-
sùs longitudinem usque ru-
bræ, luteo marginatæ, à

les trois quarts de leur lon-
gueur, le reste est d'un bleu-
violet, cette couleur étant sé-
parée de rouge par un peu de
verd; mais en-dessous elles sont
d'un verd clair: la seizième est
pareillement en-dessous d'un
verd clair; mais en dessus elle
est noire du côté intérieur, son
côté extérieur est verd & mar-
qué vers son milieu d'une tache
rouge & à son bout d'une tache
de bleu-violet: les deux suivan-
tes, sçavoir la dix-septième &
la dix-huitième, sont en-dessus
vertes du côté extérieur & à
leur bout, lequel est marqué
d'une tache de bleu-violet,
& noires du côté intérieur;
mais en-dessous elles sont d'un
verd clair: toutes les autres
sont vertes en-dessus, excepté
leur côté intérieur, qui est noi-
râtre vers l'origine de la plume
seulement, & d'un verd clair
en-dessous. La queue est com-
posée de douze plumes: les
deux du milieu sont d'un verd
foncé, tirant un peu sur le
jaune au bout de chaque plu-
me: celle qui les suit immédia-
tement de chaque côté, est
aussi d'un verd foncé depuis
son origine jusque vers les deux
tiers de sa longueur, le reste est
d'un verd-jaune: les trois sui-
vantes de chaque côté sont de
la même couleur du côté exté-

rieur ; mais leur côté intérieur est rouge & bordé de jaune depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur , & de là jusqu'à leur bout il est d'un jaune-verd & marqué d'une large bande transversale d'un verd foncé, qui sépare le jaune-verd d'avec le rouge : enfin la plus extérieure de chaque côté est colorée comme ces trois dernières , avec cette différence seulement qu'elle est bordée extérieurement de bleu foncé depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur , & de bleu plus clair depuis les deux tiers de sa longueur jusqu'à son bout. Les tiges des douze plumes de la queue sont noires. Les plumes du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue & blanche : leur prunelle est noire ; & leur iris d'un bel orangé. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue, d'un cendré foncé, dans laquelle les narines sont placées. Le bec est cendré. Les pieds sont d'un gris-blanc ; & les ongles noirâtres. On le trouve dans le pays des *Amazones* & au *Brésil*. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

medietate ad apicem luteo-virides , latâ notatâ taniâ transversâ saturatè viridi , luteo-viridem inter & rubrum colorem positâ: utrinque tandem extrema tribus nuper descriptis concolor , ab illis tamen discrepans in eo quod sit ab ipsius exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque exteriùs saturato cœruleo marginata , & inde ad apicem exteriùs cœruleo dilutiori simbrata. Duodecim rectrices scapis donantur nigris. Rectrices intermediae laterales paululùm longitudine superant. Oculos circumdat cutis nuda candida : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò eleganter aurantiæ. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda saturatè cinerea , in qua nares collocantur. Rostrum cinereum. Pedes cinereo-albi : ungues verò nigricantes. Habitat in *Amazonum* regione & *Brasilia*. Ex museo D. Aubry.

** 38. LE PERROQUET AMAZONE A GORGE JAUNE.

Psittacus major brevicaudus, viridis, superne pennis in apice nigro marginatis; syncipite cinereo-albo; vertice, genis, gutture & collo inferiore luteis; remigibus quatuor intermediis exterius superne primâ medietate rubris; rectricibus quatuor utrinque extimis primâ medietate rubris, exterius viridi-luteo marginatis, alterâ viridi-luteis, interioribus maculâ saturatè viridi notatis, extimâ exterius dilutè cœruleâ *PSITTACUS AMAZONICUS GUTTURE LUTEO.*

Psittacus viridis alius, capite luteo. *Frisch. hujus icon satis accurata Tab. 48.*

Psittacus viridis, capite, humeris & femoribus luteis. *Klein. Avi. pag. 25. N°. II.*

Præcedentes crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices æquat, & ad extremos ungues decem pollices & totidem lineas. Rostrum, quatuordecim lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices & novem lineas; pes decem lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & sex lineas, intimus tredecim lineas; posticorum extimus sexdecim cum semi lineas, intimus octo cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum

Il est à peu près de la grosseur des précédens. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces dix lignes. Son bec, qui a quatorze lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche douze lignes & demie de long; sa queue quatre pouces neuf lignes; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce six lignes, l'intérieur treize lignes; l'extérieur de ceux de derrière seize lignes & demie, & l'intérieur huit lignes & demie. Il a deux pieds un pouce de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux

deux tiers de la longueur de la queue. Le synciput est d'un gris-blanc. Le sommet de la tête, les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont jaunes ; l'origine de chaque plume est cependant de couleur de rose, mais qui ne paroît pas lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. L'occiput est d'un verd mêlé d'un peu de jaune. La partie supérieure & les côtés du col, la partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un beau verd, chaque plume étant bordée de noir par le bout. La partie inférieure du dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, la poitrine, le ventre & les côtés sont du même verd, mais les plumes ne sont point bordées de noir. Les jambes sont jaunes. Les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessous des aîles sont d'un verd tirant sur le jaune : les grandes du dessous des aîles sont d'un verd clair. Le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, est jaune. Les plus petites couvertures du dessus des aîles les plus proches du corps sont rouges & bordées de jaune ; les plus petites les plus éloignées du corps sont tout-à-fait jaunes : les moyennes & les

& unius pollicis ; alæ verò complicatæ duas circiter tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Synciput ex cinereo albet. Vertex capitis, genæ, guttur & pars colli inferior luteo tinguntur colore ; quælibet tamen penna est in exortu roseo colore tincta, qui color, dum pennæ aliæ aliis incumbunt, nullo modo est conspicuus. Occiput viride, pauco luteo mixtum. Collum in parte superiore & ad latera, dorso suprema pars & pennæ scapulares sunt virides, pennæ in apice nigro marginatis. Dorsum infimum, uropygium, superiores caudæ tectrices, pectus, ventrem & latera tingit idem color viridis, sed pennæ marginibus destituuntur nigris. Crura sunt lutea. Inferiores caudæ tectrices, sicut & alarum inferiores minores ; ex viridi ad luteum inclinantes : majores alarum inferiores dilutè virides. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, luteæ. Tectrices alarum superiores minimæ corpori finitimæ rubræ, luteo fimbriatæ ; minimæ à corpore remotiores penitus luteæ : mediæ, majoresque virides. Remiges sex primores

res superne in latere interiore nigra, in exteriori ab ipsarum exortu mediam versus longitudinem usque virides, à medietate ad apicem cœruleo-violaceæ; subtus verò exteriori nigra, interiori in exortu dilutè virides, versus apicem nigra, duobus istis coloribus quamlibet pennam obliquè dividenti-bus: quatuor quæ sequuntur, à septima scilicet ad decimam usque inclusivè, superne in latere interiore nigra, in exteriori ab ipsarum exortu ad tres circiter quartas longitudinis partes usque rubra, in reliqua longitudine cœruleo-violaceæ, cum pauco viridi cœruleo-violaceum inter & rubrum colorem posito; infernè verò in utroque latere dilutè virides: undecima & duodecima superne sex primoribus concolores, subtus autem dilutè virides: tres sequentes, à decima-tertia scilicet ad decimam-quintam usque inclusivè, superne in latere interiore nigra, in exteriori virides, cœruleo-violaceo terminatæ, subtus verò dilutè virides: reliquæ omnes superne virides, latere tamen interiore versus remigis exortum nigricante, infernè

grandes sont vertes. Les six premières plumes de l'aile sont en-dessus noires du côté intérieur, leur côté extérieur est verd depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son bout il est d'un bleu-violet; mais en-dessous elles sont noires du côté extérieur, & leur côté intérieur est d'un verd clair à son origine, & noir vers le bout, ces deux couleurs coupant obliquement chaque plume: les quatre suivantes, savoir depuis la septième jusqu'à la dixième inclusivement, sont en-dessus noires du côté intérieur, leur côté extérieur est rouge depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur, le reste est d'un bleu-violet, cette couleur étant séparée du rouge par un peu de verd; & en-dessous elles sont des deux côtés d'un verd clair: l'onzième & la douzième sont colorées en-dessus comme les six premières; mais en-dessous elle sont d'un verd clair: les trois suivantes, savoir depuis la treizième jusqu'à la quinzième inclusivement, sont en-dessus noires du côté intérieur, vertes & terminées de bleu-violet du côté extérieur; & en-dessous elles sont d'un verd clair: toutes les autres sont

vertes en-dessus , excepté leur côté intérieur , qui est noirâtre vers l'origine de la plume seulement , & d'un verd clair en-dessous. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un verd qui tire un peu sur le jaune au bout de chaque plume : celle qui les suit immédiatement de chaque côté , est verte & terminée de verd-jaune : les trois suivantes de chaque côté sont rouges & bordées extérieurement de verd-jaune depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur , le reste est d'un verd-jaune , & marqué du côté intérieur d'une grande tache d'un verd foncé , qui sépare le verd-jaune d'avec le rouge : la plus extérieure de chaque côté est colorée de même que ces trois dernières , mais du côté intérieur seulement , & son côté extérieur est d'un bleu clair. Les tiges des douze plumes de la queue sont noires. Les plumes du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue & blanchâtre : leur prunelle est noire ; & leur iris est jaune. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue , d'un gris-blanc , dans laquelle les narines sont placées. Le bec est blanchâtre. Les pieds sont d'un gris-blanc ; & les ongles cendrés. On le trouve dans le pays des *Amazones* & au *Brazil*. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

dilutè virides. Caudam componunt duodecim rectrices , quarum binæ intermediæ virides , in apice nonnihil ad luteum vergentes : utrinque proxima viridis , viridi-luteo terminata : tres utrinque sequentes ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque rubræ , exterius viridiluteo marginatæ , in reliqua longitudine viridiluteæ , in latere interiore majusculâ notatæ maculâ saturatè viridi , viridi-luteum inter & rubrum positâ : utrinque extrema tribus novissimè descriptis concolor , sed in latere interiore tantum , in exteriori verò dilutè cœrulea. Duodecim rectrices scapis nigris præditæ sunt. Rectrices intermediæ lateralium longitudinem nonnihil excedunt. Oculos circumdat cutis nuda candicans : ipsorum pupilla est nigra ; irides autem luteæ. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda cinereo-alba , in qua nares sitæ sunt. Rostrum candicans. Pedes cinereo-albi ; ungues verò cinerei. Habitat in *Amazonum* regione & *Brazilia*. Ex musæo D. Aubry.

** 39. LE PERROQUET DE LA CHINE.

Psittacus major brevicaudus, viridis; lateribus & testricibus alarum inferioribus rubris; marginibus alarum cœruleis; testricibus superne viridibus, subtus nigricantibus, apice subtus fusco-flavicante *PSITTACUS SINENSIS.*

Perroquet rouge & vert de la Chine. *Edwards. Glanur. pag. 44. Chap. XXI; avec une figure exacte Pl. 231.*

Les Anglois l'appellent GREEN AND RED PARROT FROM CHINA. Edwards.

Crassitie mediocrem Galinam æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices cum tribus lineis. Rostrum, quindecim cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda quinque pollices & novem lineas; pes decem lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & novem lineas, intimus tredecim cum semi lineas; posticorum exterior octodecim lineas, interior decem cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & sex pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ duas circiter tertias longitudinis caudæ partes at-

Il est de la grosseur d'une Poule de moyenne taille. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces trois lignes. Son bec, qui a quinze lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche quinze lignes de long; sa queue cinq pouces neuf lignes; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'intérieur treize lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière dix-huit lignes, & l'intérieur dix lignes & demie. Il a deux pieds six pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du

dessus de la queue, la poitrine & le ventre sont d'un très-beau verd. Les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd moins brillant. Les côtés sont rouges. Les couvertures du dessous de l'aile sont de la même couleur. Le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, est d'un beau bleu. Les petites couvertures du dessus des ailes, & les grandes les plus proches du corps sont du même verd que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un beau bleu. Les grandes plumes de l'aile sont en-dessus de cette dernière couleur du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur ; mais en-dessous elles sont noirâtres des deux côtés : les moyennes sont pareillement noirâtres en-dessous, & en-dessus elles sont du même verd que le dos. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes des ailes ; il faut cependant en excepter leur extrémité, qui est en-dessous d'un brun-jaunâtre. Les plumes de la tête s'étendent jusqu'à l'origine du bec & jusqu'aux yeux, qui ne sont point entourés, comme dans la plupart des autres espèces, d'une peau nue. L'iris des yeux est d'un orangé vif. Le demi-bec

tingunt. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superiores caudæ rectrices, pectus & venter elegantissimo viridi imbuuntur. Crura, inferioresque caudæ rectrices viridi quidem, sed non ita splendido, tinguntur. Latera sunt rubra. Pennæ alas subtus obtegentes concolores. Alarum margines, versum articulum carpo humano respondentem, splendidè cœruleæ. Rectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur viridi ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores sunt splendidè cœruleæ. Remiges majores superne in latere exteriori concolores, in interiori nigricantes ; subtus verò in utroque latere nigricant : minores similiter subtus nigricantes, superne autem eodem ac dorsum viridi tinctæ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores ; attamen in apice subtus ex fusco flavicant. Pennæ caput vestientes ad exortum rostri & oculos usque protenduntur ; basim autem rostri & oculos non circumdat cutis nuda, sicut in plerif-

que aliis speciebus evenit. Oculorum irides vividè aurantiæ. Mandibula superior in exortu rubra, versùs apicem ad flavum inclinans : mandibula inferior nigra. Pedes, unguisque simili nigro tincti. Habitat in Sina & Amboinensi Insula, unde missus ad D. Comitem de Bentinck, qui D. de Reaumur dono dedit.

supérieur est rouge à son origine, & tire sur le jaune vers son bout : le demi-bec inférieur est noir. Les pieds & les ongles sont de cette dernière couleur. On le trouve à la Chine & dans l'Isle d'Amboine, d'où il a été envoyé à M. le Comte de Bentinck, qui en a fait présent à M. de Reaumur.

40. LE PERROQUET D'AMÉRIQUE.

Psittacus major brevicaudus, viridis, superne saturatius, infernè dilutius; syncipite coccineo; vertice cœruleo; genis aurantiis; marginibus alarum luteis; remigibus intermediis exterius primâ medietate rubris; rectricibus superne obscurè viridibus, infernè viridi-flavicantibus.... PSITTACUS AMERICANUS.

Plus petit Perroquet verd. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXIV; avec une figure exacte Pl. 164.*

Les Anglois l'appellent LESSER GREEN PARROT. *Edwards.*

Columbam magnitudine circiter æquat. Synciput coccineo tingitur colore. Vertex capitis est cœruleus. Genæ aurantiæ. Reliquum caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, superiores caudæ rectrices & scapulares pennæ sunt saturatè virides. Guttur, collum inferius, pectus, venter supremus, latera & crura viridi dilutiore tinguntur. Venter

Il est à peu près de la grandeur d'un Pigeon. Le synciput est d'un rouge vif. Le sommet de la tête est bleu. Les joues sont orangées. Le reste de la tête, le dessus du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un verd assez foncé. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre, les côtés & les jambes sont d'un verd plus

clair. Le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd très-clair & tirant sur le jaune. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même verd que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont bleues. L'aîle bâtarde est de la même couleur. Le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, est jaune. Les premières grandes plumes de l'aîle sont noirâtres ; elles ont seulement un peu de bleu en-dessus sur leur côté extérieur : les suivantes sont rouges en-dessus du côté extérieur depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & bleues de là jusqu'à leur bout ; leur côté intérieur est noirâtre, ainsi que tout le dessous : les moyennes sont vertes. La queue est composée de douze plumes d'un verd sombre en-dessus & d'un verd-jaunâtre en-dessous. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales. La prunelle des yeux est noire : leur iris est d'une belle couleur d'or ; & les paupières sont blanches. La bête du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & blanche, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est blanchâtre, excepté le bout

imus & penna caudam subtus obtegentes sunt dilutissimè virides & ad luteum incli-nantes. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori viciniore, eodem imbuuntur viridi ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores sunt cœruleæ. Ala notha eodem colore imbuta. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, luteæ. Remiges majores primores nigricant ; superne tantùm in latere exteriore pauco imbuuntur cœruleo : quæ sequuntur, sunt superne exteriùs ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque rubræ, à medietate ad apicem cœruleæ ; interiùs, sicut & subtus in utroque latere, nigricantes : minores virides. Cauda duodecim conflatur rectricibus superne obscurè viridibus, infernè viridi-flavican-tibus. Intermediæ lateraliùm longitudinem paululùm excedunt. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides eleganti aureo colore tinctæ ; palpebræ candidæ. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda candida, in qua nares sunt positæ. Rostrum candicans, excepto unci

apice & duarum mandibularum marginibus fuscis. Pedes plumbeo colore imbuti; ungues verò fusci. Habitat in America.

de son crochet & les bords des deux mandibules, qui sont bruns. Les pieds sont de couleur de plomb; & les ongles bruns. On le trouve en Amérique.

** 41. LE PERROQUET DE L'ISLE DE LUÇON.

Voyez Pl. XXII. Fig. 2.

Psittacus major brevicaudus, viridis, ad luteum vergens; occipitio, dorso infimo & uropygio viridi-cœruleis; tectricibus alarum superioribus minimis nigris, cœruleo & viridi variis, mediis viridi-cœruleis, dilutè rufo marginatis; rectricibus superne viridibus, infernè flavicantibus PSITTACUS LUCIONENSIS.

Les Habitans de l'Isle de Luçon l'appellent KILAKIL.

Cum *Columba domestica* crassitie convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & totidem lineas. Rostrum, quod quindecim lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda quatuor pollices cum novem lineis; pes septem cum semi lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue tredecim cum semi lineas, intimus novem cum semi lineas; posticorum exterior duodecim cum semi lineas, inte-

Il est de la grosseur du *Pigeon domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces neuf lignes. Son bec, qui a quinze lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche un pouce de long; sa queue quatre pouces neuf lignes; son pied sept lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, treize lignes & demie, l'intérieur neuf lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière douze lignes & demie, & l'intérieur sept lignes. Il a un pied neuf pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'il est en vol, ont une

qu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le synciput est verd, ainsi que les joues. L'occiput est d'un verd-bleu. La gorge, le col, la partie supérieure du dos, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un verd tirant sur le jaune. La partie inférieure du dos & le croupion sont d'un verd-bleu. Les couvertures du dessus de la queue sont vertes. Les plumes scapulaires sont de la même couleur; elles ont cependant un peu de bleu vers leur bout, & sont bordées d'un verd tirant sur le jaune. Les plus petites couvertures du dessus des ailes, sçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, sont noires, & variées de bleu & de verd: les moyennes sont d'un verd-bleu dans leur milieu, & bordées d'un roux clair: les grandes les plus proches du corps sont d'un verd-bleu, bordées d'un verd tirant sur le jaune: enfin les grandes les plus éloignées du corps sont d'un verd foncé, & terminées de bleu. Les plumes de l'aile sont d'un cendré-brun en-dessous; mais en-dessus les grandes sont d'un verd foncé, ayant

rior septem lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis novem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ duas tertias longitudinis caudæ partes non attingunt. Synciput & genæ sunt virides. Occipitium viridicœruleum. Guttur, collum, dorsum supremum; pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ teñtrices & pennæ alas subtus obtegentes ex viridi ad luteum vergunt. Dorsum infimum & uropygium sunt viridicœrulea. Superiores caudæ teñtrices virides. Pennæ scapulares concolores; attamen pauco versùs ipsarum apicem cœruleo imbuuntur, & viridi ad luteum vergente sunt marginatæ. Superiores alarum teñtrices minimæ; istæ scilicet quæ articulum carpo humano respondentem vestiunt, nigræ, cœruleo & viridi variegatæ: mediæ in ipsarum medio viridicœruleæ, dilutè rufo marginatæ: majores corpori viciniore viridicœruleæ, viridi ad luteum inclinante fimbriatæ: majores tandem à corpore remotiores saturatè virides, cœruleo terminatæ. Remiges alarum sunt subtus

subtus cinereo - fuscæ ; superne verò majores saturatè virides , attamen in ipsarum lateris interioris maximâ parte fuscæ , & ad margines exteriores ad luteum vergentes : minores ex viridi ad luteum inclinantes , oris exterioribus ad luteum magis adhuc vergentibus. Remix prima valdè brevis est : tertia & quarta reliquas omnes longitudine superant. Caudam componunt duodecim rectrices superne virides , infernè flavicantes. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis unius pollicis longitudine cedentem. Basin mandibulæ superioris ambit cutis nuda rubescens , in qua nares sitæ sunt. Rostrum coccineum , attamen in unci apice candicans. Pedes cinerei ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Lucionensi Insula* , ex *Philippensibus* una , unde in *musæum D. Aubry* missus est.

une grande partie de leur côté intérieur brun , & leur bord extérieur tirant sur le jaune : les moyennes sont d'un verd tirant sur le jaune , leur bord extérieur approchant encore plus de cette dernière couleur. La première des plumes de l'aile est extrêmement courte : la troisième & la quatrième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes vertes en-dessus & jaunâtres en-dessous. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est plus courte d'un pouce que les deux du milieu. La bête du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & rougeâtre ; dans laquelle sont placées les narines. Le bec est d'un rouge vif , excepté le bout de son crochet , qui est blanchâtre. Les pieds sont cendrés ; & les ongles noirâtres. On le trouve dans l'*Isle de Luçon* l'une des *Philippines* , d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry* , qui le conserve dans son cabinet.

42. LE PERROQUET A POITRINE BLANCHE DU MEXIQUE.

Psittacus major brevicaudus , superne viridis , infernè albus ; capite superiore nigro ; maculâ infra oculos viridi ; genis &

collo inferiore luteis ; collo superiore & imo ventre aurantiis ; rectricibus viridibus . . . PSITTACUS MEXICANUS PECTORE ALBO.

Perroquet à poitrine blanche. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXIX; avec une figure exacte Pl. 169.*

Les Anglois l'appellent WHITE-BREASTED PARROT. Edwards.

Il est à peu près de la grosseur d'une *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces six lignes. Son bec, qui a neuf lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche neuf lignes de long ; sa queue deux pouces neuf lignes ; son pied six lignes ; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'intérieur neuf lignes ; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes & demie, & l'intérieur six lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est noire. De chaque côté de la tête est une tache longitudinale verte, qui part des coins de la bouche, & passe au-dessous des yeux. Les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont jaunes. Le dessus du col est orangé. Le dos, le croupion,

Turturæ crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem novem pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & sex lineas. Rostrum, novem cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque novem lineas longum est ; cauda duos pollices cum novem lineis ; pes sex lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue undecim cum semi lineas, intimus novem lineas ; posticorum extimus decem cum semi lineas, intimus sex lineas. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Capitis superior pars nigra est. In utroque capitis latere longitudinalis extat macula viridis, ab oris angulis orta, & infra oculos ducta. Genas, guttur & partem colli inferiorem vestiunt pennæ luteæ. Collum superius aurantio tin-

gitur colore. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudæ rectrices sunt eleganter virides. Pectus & venter supremus albescent. Venter imus, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices aurantii sunt coloris. Remiges majores superne exterius cœruleæ, interiùs nigricantes, subtus verò in utroque latere nigricant : ex minoribus primores virides, exterius flavicante marginatæ : reliquæ omnes penitus virides. Duodecim rectricibus eleganter viridibus cauda conflatur. Intermediæ laterales paululum longitudine superant. Oculorum pupilla est nigra : ipsorum irides saturatè avellaneæ ; palpebræ carneo colore tinctæ. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda concolor, in qua nares sunt collocatæ. Rostrum carneo imbutum colore, ad basim quidem dilutiore, & deinde sensim atque sensim, versùs ipsius uncum procedendo, obscuriore. Pedes cinereofusci ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Mexico* & *Caracarum* regione.

les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un beau verd. La poitrine & le haut du ventre sont blancs. Le bas-ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont orangés. Les grandes plumes de l'aile sont en-dessus bleues du côté extérieur, noirâtres du côté intérieur, & en-dessous elles sont noirâtres des deux côtés : les premières des moyennes sont vertes, & bordées extérieurement de jaunâtre : les autres sont tout - à - fait vertes. La queue est composée de douze plumes d'un beau verd. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales. La prunelle des yeux est noire : leur iris est d'une couleur de noisette foncée ; & les paupières sont de couleur de chair. La bête du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue de la même couleur, dans laquelle les narines sont placées. Le bec est de couleur de chair clair à sa bête, & qui devient de plus en plus obscur en approchant de son crochet. Les pieds sont d'un cendré - brun ; & les ongles noirâtres. On le trouve au *Mexique* & dans le pays des *Caraques*.

** 43. LE PERROQUET VARIÉ DES INDES.

Psittacus major brevicaudus, superne viridis, infernè pennis purpureis, cœruleo marginatis, vestitus; capite fusco, pennis in medio dilutionibus; collo pectori concolore; rectricibus subtus nigro-cœrulescentibus, superne viridibus, lateralibus apice saturatè cœruleis . . . *PSITTACUS VARIUS INDICUS*.

Psittacus elegans. Clus. exot. Auduar. pag. 365, in qua hujus icon satis accurata.

Euf. Nieremb. pag. 226, in qua hujus icon à Clusio mutuata.

Psittacus elegans Clusii. Raj. Syn. Avi. pag. 32. N°. 11.

Perroquet à tête de Faucon. Edwards. Tom. IV. pag. CLXV; avec une figure exacte. Pl. 165.

Les Anglois l'appellent HAWK-HEADED PARROT. Edwards.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Pigeon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces six lignes. Son bec, qui a un pouce d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche onze lignes de long; sa queue cinq pouces trois lignes; son pied sept lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, seize lignes, l'intérieur dix lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière quatorze lignes & demie, & l'intérieur huit lignes. Il a un pied neuf pouces trois lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas

Columbam crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos unguis novem pollices & sex lineas. Rostrum, quod unum pollicem crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda quinque pollices cum tribus lineis; pes septem lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue sexdecim lineas, intimus decem cum semi lineas; posteriorum extimus quatuordecim cum semi lineas, intimus octo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis novem

pollicum & trium linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, genas & guttur vestiunt pennæ fuscæ, taniâ longitudinali colore dilutiorè tinctâ in medio donatæ. Quæ collum, pectus & ventrem obtegunt, sunt eleganter purpureæ, splendido cœruleo marginatæ. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne obtegunt, superioresque caudæ rectrices sunt eleganter virides. Crura & rectrices caudæ inferiores dilutè virides. Latera & rectrices alarum inferiores minores viridi-flavicantes: majores nigro-cœrulescentes. Alarum remiges subtus eodem colore imbutæ; superne verò majores sunt in latere interiore nigra, in exteriorè virides, excepto apice obscurè cœruleo: minores eleganter virides. Caudam componunt duodecim rectrices subtus nigro-cœrulescentes, superne virides, laterales tamen omnes apice saturatè cœruleæ. Oculos circumdat cutis nuda nigricans: ipsorum pupilla est nigra; irides verò luteæ. Basim mandibulæ superioris similiter ambit

tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, les joues & la gorge sont couvertes de plumes brunes, qui ont chacune dans leur milieu une bande longitudinale d'une couleur plus claire. Celles qui couvrent le col, la poitrine & le ventre, sont d'un beau pourpre, & bordées d'un très-beau bleu. Le dos & le croupion sont d'un beau verd. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. Les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd clair. Les côtés & les petites couvertures du dessous des ailes sont d'un verd-jau-nâtre: les grandes sont d'un noir-bleuâtre. Les plumes de l'aile sont en-dessous de cette dernière couleur; mais en-dessus les grandes sont noires du côté intérieur, & vertes du côté extérieur, excepté leur bout, qui est d'un bleu obscur: les moyennes sont d'un beau verd. La queue est composée de douze plumes d'un noir-bleuâtre en-dessous, & vertes en-dessus, excepté le bout de toutes les latérales, qui est d'un bleu foncé. Les yeux sont entourés d'une peau nue & noirâtre: leur prunelle est noire;

& leur iris est jaune. La b  se du demi-bec sup  rieur est aussi entour  e d'une peau nue & noir  tre, dans laquelle les narines sont plac  es. Le bec est noir  tre. Les pieds & les ongles sont d'un noir  tre tirant sur la couleur de plomb. Lorsqu'on l'irrite, il redresse les plumes de son col dans une direction verticale; ce qui lui forme autour de la t  te une tr  s-belle couronne. On le trouve aux *Indes Orientales*, d'o   il fut apport   en 1754    *Madame la Marquise de Pompadour*, qui l'a actuellement vivant chez elle.

cutis nuda nigricans, in quibus nares sunt posit  e. Rostrum nigricat. Pedes, unguesque ex nigricante ad plumbeum colorem vergunt. Dum irascitur, colli pennas verticaliter erigit; qu   penn  , sic erect  e, elegantissimam coronam caput cingentem efformant. Habitat in *India Orientali*, unde anno 1754 allatus est ad *D. de Pompadour*, apud quam nunc vivus extat.

44. LE PERROQUET DE LA GUADALOUPE.

Psittacus major brevicaudus, superne viridis, infern   cinereo-c  rulescens; capite & collo cinereo-c  rulescentibus; viridi & nigro variegatis; rectricibus viridibus . . . ,
PSITTACUS AQUARUM LUPIARUM INSUL  E.

Perroquet de la Guadeloupe. *Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 250; avec une mauvaise figure pag. 246. N  . 8.*
Nouv. Voy. de l'Am  r. Tom. II. pag. 157.

Il est    peu pr  s de la grosseur du pr  c  dent. La t  te, la gorge & le col sont d'un cendr  -bleu  tre, vari   de verd & de noir. Le dos, & le croupion sont verds. Les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont de la m  me couleur. La poitrine, le ventre, les c  t  s,

Pr  cedentem crassitie circiter   mulatur. Caput, guttur & collum ex cinereo c  rulescunt, viridique & nigro variegantur. Dorsum & uropygium sunt viridia. Superiores caud  e t  ctrices & scapulares penn  e concolores. P  ctus, venter, latera, crura, inferioresque caud  e t  c-

trices cinereo - cœrulescentes. Alæ sunt virides, luteo & rubro variegatæ. Duodecim rectricibus viridibus cauda constat. Habitat in *Aquarum Lupiarum Insula.*

les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré-bleuâtre. Les ailes sont vertes, & variées de jaune & de rouge. La queue est composée de douze plumes vertes. On le trouve à *la Guadalupe.*

45. LE PERROQUET DE LA NOUVELLE ESPAGNE.

Psittacus major brevicaudus, superne viridi - fuscescens, infernè cinereo-fuscescens; gutture cœruleo; collo superiore & uropygio viridescentibus; rectricibus caudæ inferioribus rubris; rectricibus subtus viridi-fuscescentibus, superne viridibus, binis utrinque extimis exterius superne cœruleis *PSITTACUS NOVÆ HISPANIÆ.*

Perroquet brunâtre. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXVII; avec une figure exacte Pl. 167.*

Les Anglois l'appellent *DUSKY PARROT. Edwards.*

Cum præcedentibus crassitie & magnitudine circiter convenit. Vertex capitis, dorsum & pennæ scapulares ex viridi fuscescunt. Genæ, collum superius & uropygium viridescunt. Guttur est eleganter cœruleum. Pars colli inferior, pectus, venter, latera & crura sunt cinereo-fuscescentes. Inferiores caudæ rectrices eleganti rubro imbutæ. Pennæ caudam superne cooperientes & superiores alarum rectrices virides. Remiges majores concolores: minores similiter virides, sed ex istis cor-

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur des précédens. Le sommet de la tête, le dos & les plumes scapulaires sont d'un verd-brunâtre. Les joues, la partie supérieure du col & le croupion sont verdâtres. La gorge est d'un beau bleu. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un cendré-blunâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau rouge: celles du dessus de la queue & celles du dessus des ailes sont vertes. Les grandes plumes de l'aile sont de cette dernière couleur: les

moyennes sont pareillement vertes ; mais de ces dernières les plus proches du corps sont bordées de jaune. La queue est composée de douze plumes d'un verd-brunâtre en-dessous ; mais en-dessus elles sont vertes , excepté le côté extérieur des deux plus extérieures de chaque côté , qui est bleu. Celles du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Les yeux sont entourés d'une peau nue , d'un gris - blanc : leur prunelle est noire ; & leur iris est d'une couleur de noisette obscure. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & noirâtre , dans laquelle sont placées les narines. Le bec est jaune à sa bête , noir dans le milieu de la mandibule supérieure ; tout le reste est d'un beau rouge. Les pieds sont de couleur de plomb ; & les ongles noirs. On le trouve dans la *Nouvelle Espagne*.

pori viciniore luteo sunt marginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices subtus viridi-fuscescentes , superne verò virides ; attamen binæ utrinque extremæ sunt superne in latere exteriori cœruleæ. Rectrices intermedie lateralium longitudinem paululum antecellunt. Oculos circumdat cutis nuda cinereo-alba : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò obscurè avellaneæ. Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda nigricans , in qua nares collocantur. Rostrum basi luteum , in medio superioris mandibulæ nigrum , in reliquis coccineum. Pedes plumbeo colore imbuti ; ungues verò nigri. Habitat in *Nova Hispania*.

46. LE PERROQUET BLEU DE LA GUIANE.

Psittacus major brevicaudus , cœruleus ; ventre viridi ; vertice , lateribus & uropygio luteis ; remigibus , rectricibusque roseis *PSITTACUS GUIANENSIS CÆRULEUS*.

Psittacus versicolor seu erythrocyanos. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 675. hujus icon non satis accurata pag. 674.*

Psittacus versicolor seu erythrocyanus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 75.*

Raj. Syn. Avi. pag. 31. N°. 6.

Psittacus

Plittacus erythrocyanus. Jonst. Avi. pag. 22. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XV.

Plittacus violaceus. Barr. Ornith. Class. III. Gen. II. sp. 10.

Plittacus major violaceus. Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 144.

Les François de la Guiane l'appellent PERROQUET VIOLET. Barr.

Les Indiens de la Guiane, KIANKIA. Barr.

Præcedentem crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem circiter pollices explet. Caput, guttur, collum & pectus cœrulea sunt; vertex tamen capitis maculâ luteâ insignis est. Dorsi suprema pars est dilutè cœrulea. Dorsum infimum, uropygium & latera sunt lutea. Venter, tectricesque caudæ superiores & inferiores viridis sunt coloris. Crura ex viridi albicant. Pennæ scapulares & superiores alarum tectrices viridi, luteo & roseo colore promiscuè tinguntur. Remiges roseo colore imbuuntur. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Oculos circumdat cutis nuda albicans; ipsorum pupilla est nigra; irides verò fuscæ. Rostrum subnigrum. Pedes cinerei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Guiana*.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces. La tête, la gorge & le col, ainsi que la poitrine, sont d'un beau bleu; il y a cependant une tache jaune sur le sommet de la tête. La partie supérieure du dos est d'un bleu clair. La partie inférieure du dos, le croupion & les côtés sont jaunes. Le ventre est verd. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les jambes sont d'un verd-blanchâtre. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont variées de verd, de jaune & de couleur de rose mêlés confusément ensemble. Les plumes de l'aile sont de couleur de rose. La queue est composée de douze plumes de cette dernière couleur. Les yeux sont entourés d'une peau nue & blanchâtre: leur prunelle est noire, & leur iris est d'un joli brun. Le bec & les ongles sont noirâtres; & les pieds cendrés. On le trouve dans la *Guiane*.

** 47. LE PERROQUET JAUNE.

Psittacus major brevicaudus, luteus; marginibus alarum & remigibus majoribus exterius in medio rubris; rectricibus quatuor utrinque extimis interioribus primâ medietate rubris, alterâ pallidè luteis *PSITTACUS LUTEUS*.

Il est à peu près de la grosseur du *Perroquet Amazone*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces six lignes. Son bec, qui a onze lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche dix lignes & demie de long; sa queue quatre pouces; son pied huit lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, dix-sept lignes, l'intérieur un pouce; l'extérieur de ceux de derrière quinze lignes, & l'intérieur neuf lignes. Il a deux pieds un pouce de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Tout son corps, savoir la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes, est d'un beau jaune. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus

Cum *Psittaco Amazonico* crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem circiter explet, & ad extremos ungues decem pollices & sex lineas. Rostrum, quod undecim cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque decem cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices; pes octo lineas; digitorum anticorum exterior cum ungue septemdecim lineas, interior unum pollicem; posticorum extimus quindecim lineas, intimus novem lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & pollicis unius; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Per universum corpus, caput scilicet, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crura, eleganter lu-

teo imbuitur. Pennæ scapulares, alas superne vestientes & superiores caudæ tectrices concolores. Pennæ caudam subtus obtegentes, inferioresque alarum tectrices pallidiori luteo tinguntur. Margines alarum, versùs articulum carpo humano respondentem, sunt splendide rubræ. Remiges binæ tresve primores luteæ, sed in latere interiore pallidiùs quàm in exteriori : reliquæ omnes majores exteriùs rubræ, at tamen in exortu & apice luteæ ; interiùs verò valdè pallidè luteæ : minores omnes eodem imbutæ luteo ac dorsum ipsum tingitur. Duodecim rectricibus cauda constat : quatuor intermediæ luteæ : quatuor utrinque extremæ in latere exteriori concolores, in interiore ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque rubræ, à medietate ad apicem pallidè luteæ. Rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt. Oculorum pupilla est nigra : ipsorum irides sicut & palpebræ, rubræ. Basin mandibulæ superioris ambit cutis nuda candida, in qua nares sitæ sunt. Rostrum, pedes, unguesque candidi. Habitat

de la queue sont de la même couleur. Celles du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un jaune plus pâle. Le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, est d'un beau rouge. Les deux ou trois premières plumes de l'aîle sont d'un jaune beaucoup plus pâle du côté intérieur que du côté extérieur : toutes les autres grandes sont rouges du côté extérieur, excepté à leur origine & à leur bout, où elles sont jaunes ; leur côté intérieur est d'un jaune fort pâle : toutes les moyennes sont du même jaune que le dos. La queue est composée de douze plumes : les quatre du milieu sont jaunes : les quatre plus extérieures de chaque côté sont de la même couleur du côté extérieur ; leur côté intérieur est rouge depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & le reste est d'un jaune pâle. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. La prunelle des yeux est noire : leur iris est rouge, ainsi que les paupieres. La bâte du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & blanche, dans laquelle sont placées les narines. Le bec, les pieds & les ongles sont blancs. Je crois qu'on le trouve au

Mexique ou au Brésil. Je l'ai vu vivant à Paris.

forſan in *Mexico* aut *Braſilia*. Speciem iſtam *Parifius* vivam obſervavi.

48. LE PERROQUET JAUNE DE CUBA.

Psittacus major brevicaudus, luteus, ſuperne pennis in apice rubro marginatis; gutture, collo inferiore & ventre coccineis; remigibus majoribus albis; reſtrictibus lateralibus primâ medietate rubris *PSITTACUS LUTEUS INSULÆ CUBÆ*.

Psittacus medio minor, pectore & ventre rubello miſcellis, vertice albo. *Browne. Nat. Hiſt. of Jamaic. pag. 473.*

Psittacus Paradifi ex Cuba. Klein. Avi. pag. 25. No. 18.

Perroquet du Paradis de Cuba. Cateſb. Tom. I. pag. 10; avec une figure affez exacte Pl. 10.

Les Anglois l'appellent CUBA PARROT. Browne. PARROT OF PARADISE OF CUBA. Cateſb.

Il eſt un peu moins gros que le *Perroquet cendré de Guinée*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ douze pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de dix pouces neuf lignes. Son bec, qui a onze lignes & demie d'épaiſſeur, a depuis ſon crochet juſqu'aux coins de la bouche dix lignes de long; ſa queue quatre pouces trois lignes; ſon pied huit lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'intérieur treize lignes; l'extérieur de ceux de derrière quinze lignes, & l'intérieur neuf lignes & demie. Ses aîles,

Psittaco Guineenſi cinereo nonnihil craſſitie cedit. Ipiuſus longitudo à roſtri apice ad caudæ extremitatem duodecim pollices & ſex circiter lineas æquat, & ad extremos unguis decem pollices & novem lineas. Roſtrum, undecim cum ſemi lineas craſſum, ab ipſius unco ad oris angulos uſque decem lineas longum eſt; cauda quatuor pollices cum tribus lineis; pes octo lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & quinque lineas, intimus tredecim lineas; poſticorum extimus quindecim lineas, in-

timus novem cum semi lineas. Alæ complicatæ duas circiter tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Caput, collum superius & ad latera, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne obtegunt, superioresque caudæ rectrices lucido tinguntur luteo, quâlibet pennâ, præsertim in dorso & uropygio, apice rubro marginatâ. Guttur, pars colli inferior & venter coccineo colore imbuuntur. Pectus, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices sunt luteæ. Remiges majores albæ : minores luteo imbutæ. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ luteæ : laterales omnes ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque eleganter rubræ, in reliqua longitudine luteæ. Oculorum pupilla est nigra; ipsorum irides rubræ. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda candida, in qua nares sunt positæ. Rostrum, pedes, unguesque albi. Habitat in *Insula Cuba.*

lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure & les côtés du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un jaune vif, chaque plume, sur-tout celles du dos & du croupion, étant bordée de rouge par le bout. La gorge, la partie inférieure du col & le ventre sont d'un rouge vif. La poitrine, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont jaunes. Les grandes plumes de l'aile sont blanches : les moyennes sont jaunes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont jaunes : toutes les latérales sont d'un beau rouge depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur; le reste est jaune. La prunelle des yeux est noire; & leur iris est rouge. La bête du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & blanchie, dans laquelle sont placées les narines. Le bec, les pieds & les ongles sont blancs. On le trouve dans l'*Isle de Cuba.*

** 49. LE PERROQUET CENDRÉ DE GUINÉE.

Psittacus major brevicaudus, cinereus, oris pennarum in capite, collo & corpore inferiore cinereo-albis; uropygio & imo ventre cinereo-albis, oris pennarum cinereis; oculorum ambitu nudo, candido, furfuraceo; rectricibus coccineis *PSITTACUS GUINEENSIS CINEREUS*.

Psittacus medius, cinereo-cœrulescens, caudâ rubrâ. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 472.*

Psittacus cinereus, cum cauda rubra. *Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 51.*

Psittacus cinereus, caudâ rubrâ. *Klein. Avi. pag. 25. N° 13.*

Psittacus cinereus, seu subcœruleus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 675. hujus icon non satis accurata pag. 676.*

Psittacus cinereus, seu subcœruleus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 76. Raj. Syn. Avi. pag. 31. N° 7.*

Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 297. N° X.

Psittacus cinereus. Jonst. Avi. pag. 23. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XV.

Charlet. Exer. pag. 74. N° 8.

Charlet. Onomast. pag. 67. N° 8.

Psittacus cinereus Jonstoni. Barr. Ornith. Class. III. Gen. II. sp. 2.

Perroquet couleur de Frelne. *Alb. Tom. I. pag. 12; avec une figure mal coloriée Pl. 12.*

Grand Papegaut. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 297, dans laquelle il y a une mauvaise figure.*

Papegay grand, Perroquet grand. *Bel. Portr. Ois. pag. 73 a, dans laquelle est la même figure.*

Les Italiens l'appellent PAPAGALLO. *Bel.*

Les Anglois, ASH-COLOURED PARROT. *Charlet. GUINEA PARROT. Browne.*

Il est de la grosseur d'un *Pigeon Romain*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces neuf lignes. Son bec, qui a onze lignes & demie d'épaisseur, a depuis son cro-

Crassitie Columbæ Romanæ æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem explet, & ad extremos ungues decem pollices & novem lineas. Rostrum, quod undecim cum semi lineas

crassum, ab ipsius unco ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda quatuor pollices & tres lineas; pes decem lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue unum pollicem & octo lineas, intimus quatuordecim lineas; posteriorum extimus unum pollicem & quinque cum semi lineas, intimus novem cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & quatuor pollicum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput, guttur, collum, pectus & ventrem supremum vestiunt pennæ cineræ, cinereo-albo marginatæ: quæ pennæ in superiore capitis parte ita sunt exiguæ, ut nil ferè cinerei appareat. Dorsum supremum, pennæ scapulares, alarumque teatrices superiores & inferiores sunt cineræ. Dorsum infimum, uropygium, teatrices caudæ superiores minores, imus venter, latera & crura cinereo-albo tinguntur colore, in imo ventre saturatiore quàm in reliquis prædictis partibus, quâlibet insuper pennâ cinereo marginatâ; qui cinereus color, pro vario ad

chet jusqu'aux coins de la bouche quinze lignes de long; sa queue quatre pouces trois lignes; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes, l'intérieur quatorze lignes; l'extérieur de ceux de derrière un pouce cinq lignes & demie, & l'intérieur neuf lignes & demie. Il a deux pieds quatre pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont plîées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine & le haut du ventre sont couverts de plumes cendrées, bordées de gris-blanc: ces plumes sont si petites sur la partie supérieure de la tête, qu'il ne paroît presque point de cendré. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires, & les couvertures du dessus & du dessous des aîles sont cendrées. La partie inférieure du dos, le croupion, les petites couvertures du dessus de la queue, le bas-ventre, les côtés & les jambes sont d'un gris-blanc plus foncé sur le bas-ventre qu'ailleurs, chaque plume étant bordée d'un cendré qui, vu dans un certain jour, paroît violet. Toutes les couvertures du dessous de la queue, ainsi que les grandes du dessus, sont d'un fort beau rou-

ge. Les grandes plumes de l'aile sont d'un cendré-noirâtre : les moyennes sont du même cendré que la partie supérieure du dos & les plumes scapulaires. La queue est composée de douze plumes d'un rouge très-vif, & dont les tiges sont noirâtres : elles sont toutes d'égale longueur, arrondies par le bout, & cependant se terminent dans leur milieu par une petite pointe. Les yeux sont entourés d'une peau blanche, dégarnie de plumes & couverte seulement d'une poussière farineuse : leur prunelle est noire ; & leur iris est jaunâtre. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue, blanche & couverte d'une poussière farineuse, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est noir. Les pieds sont cendrés ; & les ongles noirâtres. On le trouve en *Guinée* & à la *Jamaïque*. Du cabinet de M. de Reaumur.

lucem objectu, videtur violaceus. Omnes caudæ rectrices inferiores, sicut & majores superiores, sunt coccineæ. Remiges majores cinereo-nigricantes : minores eodem imbutæ cinereo ac dorsum supremum & scapulares ipsæ tinguntur. Caudam componunt duodecim rectrices splendide coccineæ, scapis nigricantibus præditæ, omnes aequalem longitudinem obtinentes ; apice rotundatæ, attamen in medio exiguo mucrone terminatæ. Oculos circumdat cutis candida, plumis denudata, pulvere tantum furfuraceo obsita : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò flavicantes. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda candida, pulvere furfuraceo aspersa, in quanares sitæ sunt. Rostrum nigrum. Pedes cinerei ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Guinea* & *Jamaica*. Ex museo Realmuriano.

A. LE PERROQUET DE GUINÉE A AISLES ROUGES ;

Psittacus Guineensis alis rubris.

Perroquet de Guinée. *Nouv. Voy. de l'Amér. Tom. II. pag. 160.*

Il ne diffère du précédent qu'en ce que ses ailes sont

A præcedente discrepat tantum alis rubro maxime variegatis.

variegatis. In reliquis omnibus cum illo perfectè convenit. variées de beaucoup de rouge. Du reste il lui ressemble parfaitement.

**** B. LE PERROQUET DE GUINÉE VARIÉ DE ROUGE.**

Psittacus Guineensis rubro varius.

Perroquet rouge & cendré. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXIII; avec une figure exacte Pl. 163.*

Les Anglois l'appellent ASH-COLOUR'D AND RED PARROT. Edwards.

Magnitudine & crassitie præcedentem adæquat : ab illo solummodo differt colore per universum corpus & supra alas cinereo & rubro variegato. Duodecim rectrices sunt penitus coccineæ. Varietatem istam *Lutetiæ Parisiorum* vivam observavi. Il est de la même grandeur & de la même grosseur que le précédent : il en diffère seulement par sa couleur, qui est variée par tout le corps & sur les ailes de cendré & de rouge. Les douze plumes de la queue sont tout-à-fait rouges. Je l'ai vu vivant à *Paris*.

50. LE PERROQUET CENDRÉ DU BRÉSIL:

Psittacus major brevicaudus, in toto corpore cinereo-subcœrulescens . . . PSITTACUS BRASILIENSIS CINEREUS,

Maracana Brasiliensibus (prima). Marcgr. Hist. Br. pag. 207.

Jonst. Avi. pag. 142.

Maracana Brasiliensibus (prima) Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 73.

Raj. Syn. Avi. pag. 29. N°. 4.

Les Brasiiliens l'appellent MARACANA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Magnitudine præcedentem antecellit. Per universum corpus pennis vestitur ex cinereo subcœrulescentibus. Remiges & rectrices concolores. Habitat in *Brasilia*. Il est plus grand que le précédent. Tout son corps est couvert de plumes d'un cendré-bleuâtre. Les plumes de l'aile & celles de la queue sont de la même couleur. On le trouve au *Brésil*.

Tom. IV.

R_r

** 51. LE PERROQUET BRUN.

Psittacus major brevicaudus, in toto corpore cinereo-fuscus.
 *PSITTACUS FUSCUS.*

Il est un peu moins gros que le *Perroquet cendré de Guinée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces neuf lignes. Son bec, qui a onze lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche dix lignes de long; sa queue cinq pouces six lignes; son pied neuf lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce six lignes, l'intérieur treize lignes; l'extérieur de ceux de derrière seize lignes, & l'intérieur huit lignes & demie. Il a deux pieds deux pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un cendré-brun. Les couvertures du dessus & du dessous des ailes, celles du dessus & du dessous de la queue, & les plumes de l'aîle sont de la même couleur. La queue est composée de douze plumes du mê-

Psittaco Guineensi cinereo nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices & novem lineas. Rostrum, quod undecim lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque decem lineas longum est; cauda quinque pollices cum sex lineis; pes novem lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & sex lineas, intimus tredecim lineas; posteriorum exterior sexdecim lineas, interior octo cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum totidem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ duas tertias longitudinis caudæ partes non attingunt. In toto corpore pennis vestitur cinereo-fuscis. Quæ alas superne & infernè cooperiunt, testricesque caudæ superiores & inferiores, sicut & remiges, concolores,

Caudam componunt duodecim rectrices eodem cinereo-fusco imbutæ ac reliquum corpus ipsum tingitur. Oculos circumdat cutis nuda fusca : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò griseæ. Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda griseo-fusca , in qua nares sunt positæ. Rostrum , pedes , unguisque griseo-fusci. In qua regione habitat prorsus ignoro. Speciem istam *Parisis* vivam observavi.

me cendré-brun que le reste du corps. Les yeux sont entourés d'une peau nue & brune : leur prunelle est noire ; & leur iris est d'un joli gris. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue , d'un gris-brun , dans laquelle sont placées les narines. Le bec , les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. Je ne sçais de quel pays il vient. Je l'ai vu vivant à *Paris*.

** 52. LE PERROQUET MASCARIN.

Psittacus major brevicaudus , saturatè cinereus ; capite & collo superioribus dilutè cinereis ; taniâ circa basim rostrî nigrâ ; oculorum ambitu nudo , coccineo ; rectricibus saturatè cinereis , lateralibus in exortu candidis
PSITTACUS MASCARINUS.

Psittacum Guineensem cinereum paululùm crassitie superat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices & sex lineas explet , & ad extremos ungues duodecim pollices & tres lineas. Rostrum , sexdecim lineas crassum , ab ipsius unco ad oris angulos quindecim lineas longum est ; cauda quatuor pollices & sex lineas ; pes undecim lineas ; digitorum

Il est un peu plus gros que le *Perroquet cendré de Guinée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces six lignes ; & jusqu'à celui des ongles de douze pouces trois lignes. Son bec , qui a seize lignes d'épaisseur , a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche quinze lignes de long ; sa queue quatre pouces six lignes ; son pied onze lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec

Rr ij

l'ongle, un pouce dix lignes, l'intérieur quinze lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière un pouce sept lignes & demie, & l'intérieur onze lignes. Il a deux pieds quatre pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La bête du bec est entourée de plumes noires, qui forment une bande de cinq ou six lignes de largeur. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un cendré clair. Le dos, le croupion, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont d'un cendré très-foncé. Les plumes de l'aîle sont de la même couleur. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont aussi d'un cendré très-foncé: toutes les latérales sont de la même couleur, excepté qu'elles ont un peu de blanc à leur origine. Les yeux sont entourés d'une peau nue, d'un rouge vif: leur prunelle est noire; & leur iris est rouge. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & rouge, dans la-

anticorum exterior cum ungue unum pollicem & decem lineas, interior quindecim cum semi lineas; posteriorum extimus unum pollicem & septem cum semi lineas, intimus undecim lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & quatuor pollicum; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes pertingunt. Basim rostri ambiunt pennæ nigræ, tæniæ quinque sexve lineas latæ efficientes. Partes capitis & colli superiores sunt dilutè cinereæ. Dorsum, uropygium, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ saturatissimè cinereæ. Scapulares, alas superne & inferne cooperientes, rectrices caudæ superiores & inferiores, alarumque remiges eodem colore imbutæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus, quarum binæ intermediae sunt quoque saturatissimè cinereæ: laterales omnes concolores, attamen in exortu pauco candido notatæ. Oculos circumdat cutis nuda coccinea: ipsorum pupilla est nigra; irides verò rubræ. Basim mandibulæ superioris

Similiter ambit cutis nuda rubra, in qua nares sitæ sunt. Rostrum quoque rubrum. Pedes pallido colore carneo imbuti; ungues verò griseofusci. In qua regione habitat prorsus me latet. Speciem istam *Parisiis* vivam observavi.

quelle les narines sont placées. Le bec est pareillement rouge. Les pieds sont de couleur de chair pâle; & les ongles sont d'un gris-brun. J'ignore dans quel pays on le trouve. Je l'ai vu vivant à *Paris*.

** 53. LE PERROQUET NOIR DE MADAGASCAR:

Psittacus major brevicaudus, nigro-cœrulescens; oculorum ambitu candicante; remigibus cinereo-fuscis, exterius ad viride vergentibus; rectricibus superne nigro-cœrulescentibus, subtus penitus nigris PSITTACUS MADAGASCARIENSIS NIGER.

Psittacus ex nigro cœruleus, rostro brevissimo. Klein. Avi. pag. 25. No. 23.

Perroquet noir de Madagascar. *Edwards. Tom. I. pag. V; avec une figure exacte Pl. 5.*

Crassitie *Psittacum fuscum* æmulatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tredecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices & novem lineas. Rostrum, quod undecim cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque decem lineas longum est; cauda quinque pollices cum sex lineis; pes novem lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & sex lineas, inti-

Il est de la même grosseur que le *Perroquet brun*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces neuf lignes. Son bec, qui a onze lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche dix lignes de long; sa queue cinq pouces six lignes; son pied neuf lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce six lignes, l'intérieur treize lignes; l'extérieur de

ceux de derrière seize lignes , & l'intérieur huit lignes & demie. Il a deux pieds deux pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête , la gorge , le col & tout le corps dessus & dessous sont d'un noir tirant sur le bleu. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue , & les petites du dessous des ailes sont de la même couleur : les grandes du dessous des ailes sont noirâtres. Les petites couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos , mais plus brillante : les grandes sont d'un cendré-brun tirant sur le verd. Les plumes de l'aile sont de la même couleur en-dessus , mais du côté extérieur seulement ; leur côté intérieur , ainsi que tout le dessous , est d'un cendré-brun. (Celui qu'*Edwards* a décrit , avoit dans chaque aile trois ou quatre plumes blanches). La queue est composée de douze plumes d'un noir tirant sur le bleu en-dessus , & tout-à-fait noires en-dessous. Les yeux sont entourés d'une peau nue & blanchâtre : leur prunelle est noire ; & leur iris d'une couleur brune. La bête du demi-bec supérieur est aussi

mus tredecim lineas ; posticorum extimus sexdecim lineas , intimus octo cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum totidem pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes non pertingunt. Caput , guttur , collum , universumque corpus superne & infernè ex nigro cœrulescunt. Pennæ caudam superne & infernè cooperientes , alarumque rectrices inferiores minores concolores : majores alarum inferiores nigricantes. Superiores alarum rectrices minores eodem ac dorsum imbuuntur colore , sed lucidiore : majores ex cinereo-fusco & ad viride vergunt. Remiges superne eodem colore tinctæ , sed exterius tantum ; interiùs autem , sicut & subtus in utroque latere , sunt cinereo-fuscæ. (In illo ab *Edwardo* descripto in utraque ala tres quatuorve remiges erant candidæ). Cauda duodecim constat rectricibus superne nigro-cœrulescentibus , subtus penitus nigris. Oculos circumdat cutis nuda candicans : ipsorum pupilla est ni-

gra; irides verò fuscæ. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda ex albo ad carneum colorem nonnihil inclinans, in qua nares collocantur. Rostrum quoque ex albo ad carneum colorem paululum vergens. Pedes obscuro colore carneo imbuti; ungues verò nigri. Habitat in *Madagascaria*. Speciem istam *Lutetia Parisiorum* vivam observavi.

entourée d'une peau nue, d'un blanc tirant un peu sur le couleur de chair, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est de la même couleur que cette peau. Les pieds sont de couleur de chair sombre; & les ongles noirs. On le trouve à *Madagascar*. Je l'ai vu vivant à *Paris*.

** 54. LA PERRUCHE.

Psittacus minor longicaudus, dilutè viridis, ad flavum inclinans; oris remigum flavicantibus; rectricibus binis intermediis viridi-cœruleis, duabus utrinque proximis exteriùs & apice viridi-cœruleis, interiùs viridi-luteis, tribus utrinque extimis viridi-luteis *PSITTACA*.

Psittacus minor macrouros totus viridis. Aldrov. Avi. Tom. 1. pag. 678. hujus icon non satis accurata pag. 680.

Psittacus minor macrouros totus viridis Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 77.

Raj. Syn. Avi. pag. 33. N°. 2.

Raj. Syn. Avi. pag. 181. N°. 6.

Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 297. N°. XI.

Psittacus minor macrouros totus viridis. Jonst. Avi. pag. 23.

Psittacus minor viridis, caudâ productâ. Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 472.

Psittacus pumilio viridis longicaudus. Barr. Ornith. Class. III. Gen II. sp. 11.

Psittacus viridis minor. Schwenck. Avi. Sil. pag. 343.

Psittacus torquatus macrouros minor. Charlet. Exer. pag. 74. N°. 12. Charlet. Onomazt. pag. 67. N°. 12.

Psittaci minoris Marcgravii prima species. Willugh. Ornith. pag. 78.

Tui prima species. Marcgr. Hist. Br. pag. 206.

Jonst. Avi. pag. 141.

Tui Brasiliensibus prima species. Raj. Syn. Avi. pag. 34. N°. 1.

Paxaritos totos verdes de Oviedo. *Sloane.*

Perruche verte à longue queue. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXXV ; avec une figure exacte Pl. 175.*

Perroquet verd , ou à la longue queue. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 73 b , dans laquelle il y a une figure peu exacte.*

Petit Perroquet verd à la queue longue. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 298 ; dans laquelle est la même figure.*

Perrique. *Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 251.*

Perrique du Brésil. *Nouv. Voy. de l'Amér. Tom. II. pag. 161.*

Les Italiens l'appellent PAROCHINO. Aldrov. Willugh.

Les Allemands , GREUNER PAPEGEX. Schwenck.

Les Anglois , SMALL GREEN LONG-TAILED PARROT. Browne. LONG-TAILED GREEN PARRAKEET. Edwards.

Les Brasiiliens , TUI. Maregr. Jonst. Willugh. Raj.

On l'appelle à S. Domingue , SCINCIALO. Aldrov. Willugh.

Elle est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces. Son bec, qui a neuf lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche huit lignes de long ; sa queue sept pouces ; son pied six lignes ; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'intérieur sept lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes & demie, & l'intérieur six lignes. Elle a seize pouces six lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapu-

Merulam crassitie circiter adæquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices. Rostrum, quod novem lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque octo lineas longum est ; cauda septem pollices ; pes sex lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue undecim cum semi lineas ; intimus septem cum semi lineas ; posticorum extimus novem cum semi lineas ; intimus sex lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum sexdecim pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad tertiam longitudinis caudæ partem usque

que protenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem & crura vestiunt pennæ dilutè virides, nonnihil ad flavum inclinantes. Scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ testrices concolores. Pennæ caudam subtus obtegentes, testrices alarum inferiores minores & latera sunt viridiluteæ. Testrices alarum inferiores majores à corpore remotiores cinereæ; majores corpori finitimæ luteæ. Remiges subtus cinereæ, superne saturatè virides, attamen in latere interiore maximâ parte saturatè cinereæ, & scapis nigris præditæ, marginibus insuper tam exterioribus quàm interioribus flavicantibus donatæ : ex istis tamen excipiendæ sunt corpori viciniore eodem ac dorsum viridi imbutæ, & in latere interiore maximâ parte luteæ. Remix prima brevissima est : quarta reliquas omnes longitudine superat. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ virides quidem, sed versùs ipsarum extremitatem procedendo magis atque magis ad cœruleum vergentes : binæ utrinque sequentes

Tom. IV.

laïres, les couvertures du dessus des aîles, celles du dessus de la queue, la poitrine, le ventre & les jambes sont d'un verd clair, tirant tant soit peu sur le jaune. Les couvertures du dessous de la queue, les petites du dessous des aîles & les côtés sont d'un verd-jaune. Les grandes couvertures du dessous des aîles les plus éloignées du corps sont cendrées : les plus proches du corps sont jaunes. Les plumes de l'aîle sont cendrées en-dessous ; elles sont en-dessus d'un verd foncé, ayant une grande partie de leur côté intérieur d'un cendré foncé, & leur tige noire ; de plus elles sont bordées extérieurement & intérieurement de jaunâtre : il faut cependant excepter les plus proches du corps, qui sont du même verd que le dos, & ont une grande partie de leur côté intérieur jaune. La première des plumes de l'aîle est extrêmement courte : la quatrième est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un verd qui tire d'autant plus sur le bleu, qu'il approche plus du bout de la plume : les deux suivantes de chaque côté sont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & leur côté intérieur est

Sf

d'un verd-jaune : les trois plus extérieures de chaque côté sont dans toute leur étendue de cette dernière couleur, qui tire cependant un peu plus sur le verd du côté extérieur, & un peu plus sur le jaune du côté intérieur. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues d'un pouce neuf lignes que celle qui les suit immédiatement de chaque côté : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de cinq pouces que les deux du milieu. Les yeux sont entourés d'une peau nue, de couleur de chair : leur prunelle est noire ; & leur iris est d'un bel orangé. La bête du demi-bec supérieur est pareillement entourée d'une peau nue, de couleur de chair, dans laquelle sont placées les narines. Le demi-bec supérieur est d'un rouge de sang à son origine, & noir vers son crochet : le demi-bec inférieur est entièrement de cette dernière couleur. Les pieds & les ongles sont de couleur de chair. On la trouve en différens endroits de l'Amérique. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

in latere exteriori & apice concolores, in latere interiori viridi-luteæ : tres utrinque extremæ per totam longitudinem viridi-luteæ ; qui tamen color exterius paulò magis ad viride, interius paulò magis ad luteum vergit. Binæ rectrices intermediae utrinque proximè sequentem unius pollicis & novem linearum longitudine superant : laterales omnes gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis quinque pollicum longitudine cedentem. Oculos circumdat cutis nuda carneo colore imbuta : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò eleganter aurantiæ. Basim mandibulae superioris pariter ambit cutis nuda carneo colore tincta, in qua nares sunt positæ. Mandibula superior in exortu sanguineo colore perfusa, versùs ipsius uncum nigra ; mandibula inferior penitus nigra. Pedes, unguesque carneo colore imbuti. Habitat in variis Americæ regionibus. *Ex museo Reaumuriano.*

** 55. LA PERRUCHE A COLLIER.

Psittacus minor longicaudus, dilutè viridis, ad flavum inclinans; gutture nigro; torque roseo; rectricibus binis intermediis viridi-cœruleis, duabus utrinque proximis exterius & apice viridi-cœruleis, interius viridi-luteis, tribus utrinque extimis viridi-luteis *PSITTACA TORQUATA*.

Psittacus viridis, torque miniaceo. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 343.*

Psittacus torquatus macrouros Antiquorum. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 678. hujus icon minùs accurata pag. 679.

Psittacus torquatus macrouros Antiquorum Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 77. hujus icon ab Olina mutuata Tab. XVI, sub titulo, Psittacus minor macrouros.

Raj. Syn. Avi. pag. 33. N°. 1.

Psittacus torquatus macrouros. Jonst. Avi. pag. 23. hujus icon ab Olina mutuata Tab. XIV, sub titulo, Psittacus minor.

Charlet. Exer. pag. 74. N°. 10.

Charlet. Onomazt. pag. 67. N°. 10.

Psittacus torquatus, minor, macrouros Jonstoni. Barr. Ornith. Class. III. Gen. II. sp. 3.

Perrocchetto. Olina. pag. 24, in qua hujus icon accurata.

Les Italiens l'appellent PERROCCHETTO; PERROCCHETTO. Olina.

Les Allemands, GREUN-GEELER PAPAGEY. Schwenck.

Les Anglois, PEROCHEETO. Willugh.

Les François de la Guiane, PERRICHE A COLLIER NOIR. Barr.

Crassitie præcedentem paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindécim pollices & lineas binas æquat, & ad extremos ungues septem pollices & sex lineas. Rostrum, quod decem lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda novem pollices cum sex lineis; pes sex li-

Elle est un peu plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces deux lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces six lignes. Son bec, qui a dix lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche neuf lignes de long; sa queue neuf pouces six lignes; son pied six lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec

l'ongle, douze lignes & demie, l'intérieur huit lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes & demie, & l'intérieur six lignes & demie. Elle a seize pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent que jusqu'à deux pouces au-delà de l'origine de la queue. La tête, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes, celles du dessus de la queue, la poitrine, le ventre & les jambes sont d'un verd clair, tirant tant soit peu sur le jaune. Les couvertures du dessous de la queue, les petites du dessous des ailes & les côtés sont d'un verd-jaune. Les grandes couvertures du dessous des ailes les plus éloignées du corps sont cendrées; les plus proches du corps sont jaunes. L'occiput est mêlé d'une très-légère teinte de violet clair, qui s'étend un peu sur les côtés du col. Au-dessous de ce violet clair est une étroite bande de couleur de rose, qui entoure le col, & forme une espece de collier. La gorge est noire: cette couleur s'étend en enhaut de chaque côté du demi-bec inférieur, & va en en-bas joindre le collier. Les plumes de l'aile sont cendrées en-dessous; elles sont en-dessus d'un verd

neas; digitorum anticorum extimus cum ungue duodecim cum semi lineas, intimus octo cum semi lineas; posticorum exterior decem cum semi lineas, interior sex cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est sexdecim pollicum; alæ verò complicatæ ad duos tantum pollices ultra caudæ exortum protenduntur. Caput, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt; superiores caudæ rectrices; pectus, venter & crura ex dilute viridi nonnihil ad flavum inclinant. Latera, pennæ caudam subtus obtegentes & rectrices alarum inferiores minores sunt viridiluteæ. Inferiores alarum rectrices majores à corpore remotiores cineræ; corpori viciniore luteæ. In occipito aliquid admiscetur violacei diluti, supra colli latera paululum extensi. Infra quem violaceum colorem dilutum stricta extat tania roseo colore tincta, collum ambiens, & torquem quodammodo efficiens. Guttur nigrum est: nigredo autem sursum in utroque mandibulæ inferioris latere protenditur, &

insuper deorsum torquem pertingit. Alarum remiges sunt subtus cinereæ, superne saturatè virides, attamen in latere interiore maximâ parte saturatè cinereæ, & scapulis nigris præditæ : ex istis excipiendæ sunt corpori finitimæ eodem imbutæ viridi ac dorsum ipsum tingitur, & interiùs maximâ parte luteæ. (Aliquot hujus speciei individua observavi quibusdam remigibus majoribus luteis donata: varietas est). Remix prima valdè brevis est : secunda omnium longissima. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ virides quidem, sed versùs ipsarum extremitatem procedendo, magis atque magis ad cœruleum vergentes : binæ utrinque proximæ in latere exteriori & apice concolores, in latere interiore viridi-luteæ : tres utrinque extimæ per totam longitudinem viridi-luteæ ; qui tamen color interiùs paulò magis ad viride, interiùs paulò magis ad luteum inclinât. Binæ rectrices intermediæ utrinque proximè sequentem trium pollicum & sex linearum longitudine antecellunt : laterales omnes gradatim longitudine

foncé, ayant une grande partie de leur côté intérieur d'un cendré foncé, & leur tige noire : il faut cependant excepter les plus proches du corps, qui sont du même verd que le dos, & ont une grande partie de leur côté intérieur jaune. (J'ai vu quelques individus de cette espece qui avoient quelques-unes des grandes plumes de l'aile jaunes : c'est une variété). La première des plumes de l'aile est extrêmement courte : la seconde est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un verd qui tire d'autant plus sur le bleu, qu'il approche plus du bout de la plume : les deux suivantes de chaque côté sont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & leur côté intérieur est d'un verd-jaune : les trois plus extérieures de chaque côté sont dans toute leur étendue de cette dernière couleur, qui tire cependant un peu plus sur le verd du côté extérieur, & un peu plus sur le jaune du côté intérieur. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues de trois pouces six lignes que celle qui les suit immédiatement de chaque côté : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par

degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de sept pouces que les deux du milieu. Les yeux sont entourés d'une peau nue, de couleur de chair : leur prunelle est noire ; & leur iris est jaune. La bâte du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue, de couleur de chair, dans laquelle sont placées les narines. Le demi-bec supérieur est d'un rouge de sang à son origine, & noir vers son crochet : le demi-bec inférieur est entièrement de cette dernière couleur. Les pieds sont cendrés ; & les ongles d'un gris-brun. On la trouve, comme la précédente, en différens endroits de l'Amérique. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis septem pollicum longitudine cedentem. Oculos circumdat cutis nuda carneo colore imbuta : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò luteæ. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda carneo colore tincta, in qua nares collocantur. Mandibula superior in exortu sanguineo colore imbuta, versùs ipsius uncum nigra : mandibula inferior penitus nigra. Pedes cinerei ; ungues verò griseo-fusci. Habitat, ut præcedens, in variis Americæ regionibus. *Ex museo Realmuriano.*

56. LA PERRUCHE A COLLIER DES INDES.

Psittacus minor longicaudus, dilutè viridis, ad flavum inclinans ; vertice viridi-cœrulescente ; torque purpureo ; gutture nigro ; collo inferiore & pectore roseis ; rectricibus dilutè viridibus, ad flavum inclinantibus *PSITTACA INDICA TORQUATA.*

Perroquet à collier des Indes Orientales. *Alb. Tom. II. pag. 12 ; avec une figure peu exacte Pl. 18.*

Les Anglois l'appellent BRACELET PARRAKEET FROM EAST INDIA. *Alb.*

Elle est de près du double plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue

Crassitie ferè duplâ præcedentem antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pe-

dem & quinque circiter pollices æquat. Caudam habet octo ferè pollices longam. Vertex capitis ex viridi cœrulescit. Caput ad latera sive genæ viridi dilutius tinguntur. Infra occipitium tænia extat purpurea, utrinque protensa, collum cingens, & torquem quodammodo efficiens. Guttur nigrum est : nigredo autem utrinque protenditur, & tæniæ purpureæ, torquem efficientis, extremitates attingit. Pars colli inferior & pectus pallido imbuuntur roseo. Collum superius, dorsum, uropygium, venter, latera, crura, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores ex dilutè viridi ad flavum inclinant. Remiges concolores. Caudam componunt duodecim rectrices similiter ex dilutè viridi ad flavum vergentes. Binæ intermediae, in acumen desinentes, lateralium longitudinem multum excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Oculos circumdat cutis nuda obscurè fusca : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò eleganter lu-

est d'environ un pied cinq pouces. Sa queue a près de huit pouces de long. Le sommet de la tête est d'un verd-bleuâtre. Les côtés de la tête ou les joues sont d'un verd plus clair. Au-dessous de l'occiput est une bande pourpre, qui s'étend de chaque côté autour du col, & forme une espece de collier. La gorge est noire : cette couleur s'étend des deux côtés, & va joindre les extrémités de la bande pourpre, qui forme le collier. La partie inférieure du col & la poitrine sont de couleur de rose pâle. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, le ventre, les côtés, les jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont d'un verd clair & tirant sur le jaune. Les plumes de l'aile sont de la même couleur. La queue est composée de douze plumes, qui sont pareillement d'un verd clair, tirant sur le jaune. Les deux du milieu, qui se terminent en pointe, sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont entourés d'une peau nue, d'un brun

sombre : leur prunelle est noire ; & leur iris d'un beau jaune. Le demi-bec supérieur est orangé , & l'inférieur est noir. Les pieds sont d'un cendré clair ; & les ongles noirs. On la trouve aux *Indes Orientales*.

teæ. Mandibula superior aurantia , inferior nigra. Pedes dilutè cinerei ; ungues verò nigri. Habitat in *India Orientali*.

** 57. LA PERRUCHE A COLLIER DE L'ISLE DE BOURBON:

Voyez Pl. XXVII. Fig. 1.

Psittacus minor longicaudus, viridis, infernè ad flavum inclinans ; torquæ roseo ; taniâ transversâ sub gutture luteâ , ad colli latera nigrâ ; rectricibus superne viridibus , subtus cinereo-flavis. . . . *PSITTACA BORBONICA TORQUATA*.

Elle est à peu près de la grosseur d'une *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces six lignes , & jusqu'à celui des ongles de huit pouces quatre lignes. Son bec , qui a dix lignes d'épaisseur , a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche neuf lignes de long ; sa queue sept pouces trois lignes ; son pied neuf lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , treize lignes , l'intérieur neuf lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière un pouce , & l'intérieur sept lignes & demie. Elle a un pied huit pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu

Cum *Turture* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices & sex lineas æquat , & ad extremos ungues octo pollices & quatuor lineas. Rostrum , quod decem lineas crassum , ab ipsius unco ad oris angulos usque novem lineas longum est ; cauda septem pollices cum tribus lineis ; pes novem lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue tredecim lineas , intimus novem cum semi lineas ; posticorum exterior unum pollicem , interior septem cum semi lineas. Alis expansis , extremitates majorum remigum

remigum unius pedis octo pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput, collum, dorsum, uropygium, superiores caudæ tectrices, scapulares pennas & pectus tingit color viridis. Infra occipitium stricta extat tania roseo colore imbuta, utrinque circa collum ducta, quæ versùs guttur procedendo fit latior, & quodammodo torquem efformat, supra quem viridi aliquid admiscetur cœrulei. Sub gutture tania adest transversa lutea, cujus binæ extremitates torquis rosei extremitates pertingunt. Supra torquem, ad latera colli tantum, stricta extat tania nigra, quæ in utroque gutturis latere reflexa, ad mandibulam inferiorem usque protenditur. Venter, latera, crura, inferioresque caudæ tectrices ex viridi ad flavum inclinant. Tectrices alarum inferiores minores sunt luteo-virides : majores dilutè cineræ. Superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbutæ viridi ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore re-

Tom. IV.

au-delà du tiers de la longueur de la queue. La tête, le col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, les plumes scapulaires & la poitrine sont d'un beau verd. Au-dessous de l'occiput est une étroite bande de couleur de rose, qui s'étend de chaque côté autour du col, devient plus large en approchant vers la gorge, & forme une espece de collier, au-dessus duquel le verd est mêlé d'un peu de bleu. Sous la gorge est une bande transversale jaune, dont les deux bouts joignent ceux du collier couleur de rose. Au-dessus de ce collier, sur les côtés du col seulement, il y a une étroite bande noire, qui se recourbe de chaque côté de la gorge, & remonte jusqu'au demi-bec inférieur. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd tirant sur le jaune. Les petites couvertures du dessous des aîles sont d'un jaune-verd : les grandes sont d'un cendré clair. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même verd que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un verd foncé. Les plumes de l'aîle sont cendrées en-dessous ; mais en-dessus elles sont du côté exté-

T t

rieur & à leur bout d'un verd plus foncé que celui du dos; leur côté intérieur est d'un cendré-noirâtre, & leur tige est noire. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-jaune en-dessous & vertes en-dessus : elles ont aussi leur tige noire. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de trois pouces neuf lignes que les deux du milieu. Le demi-bec supérieur est d'un rouge vif, excepté le bout de son crochet, qui est noirâtre : le demi-bec inférieur est d'un rouge obscur à sa base, & noirâtre vers son bout. Les pieds sont d'un cendré tirant sur la couleur de plomb; & les ongles noirâtres. On la trouve dans l'*Iste de Bourbon*. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

motiores saturatè virides. Remiges subtus cinereæ, superne verò in latere exteriori & apice viridi quàm in dorso saturatiore tinctæ; in latere autem interiore cinereo - nigricantes, & scapis nigris præditæ. Cauda duodecim constat rectricibus subtus cinereo - flavis, superne viridibus, quæ scapis similiter donantur nigris. Binæ intermediae lateralium longitudinem excedunt, laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis trium pollicum & novem linearum longitudine cedentem. Mandibula superior coccinea, excepto unci apice nigricante : mandibula inferior ad basin obscurè rubra, versùs apicem nigricans. Pedes ex cinereo ad plumbeum colorem vergentes; ungues verò nigricantes. Habitat in *Borbonica Insula*. Ex museo D. Aubry.

58. LA PERRUCHE DE LA GUADALOUPE.

Psittacus minor longicaudus, in toto corpore viridis; rostro, pedibusque candidis. *PSITTACA AQUARUM LUPIARUM INSULÆ.*

Ajuru-Catinga Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 207.

Jonst. Avi. pag. 142.

Willugh. Ornith. pag. 76.

Ajuru-Catinga. *Raj. Syn. Avi. pag. 33. N° 6.*

Ajuru-Apara Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 207.*

Jonst. Avi. pag. 142.

Willugh. Ornith. pag. 76.

Ajuru-Apara. *Raj. Syn. Avi. pag. 33. N° 7.*

Perrique de la Guadeloupe. *Nouv. Voy. de l'Amér. Tom. II. pag. 161.*

Les Brasiliens l'appellent AJURU-CATINGA; AJURU-APARA. *Marcgr.*

Jonst. Willugh.

Magnitudine *Pullum Gal-
linaceum* mediocrem adæ-
quat. Per universum cor-
pus vestitur pennis viridi-
bus. Alarum remiges eo-
dem imbuuntur colore. Cau-
dam habet longam duode-
cim conflatam rectricibus si-
militer viridibus, quarum
binæ intermediæ lateralium
longitudinem excedunt; la-
terales autem gradatim lon-
gitudine minuuntur ad utrin-
que extimam usque brevio-
rem. Oculos circumdat cutis
nuda candida : ipsorum pu-
pilla est nigra; irides verò
rubræ. Basim mandibulæ su-
perioris similiter ambit cutis
nuda candida, in qua nares
collocantur. Rostrum, pe-
des, unguisque candidi. Ha-
bitat in *Brasilia & Aquarum
Lupiarum Insula.*

Elle est de la grosseur d'un
Poulet de moyenne taille. Tout
son corps est couvert de plu-
mes vertes. Celles des ailes sont
de la même couleur. Sa queue,
qui est assez longue, est com-
posée de douze plumes du mê-
me verd, dont les deux du mi-
lieu sont plus longues que les
latérales, qui vont toutes en
diminuant de longueur par de-
grés jusqu'à la plus extérieure
de chaque côté, qui est la plus
courte. Les yeux sont entourés
d'une peau nue & blanche : leur
prunelle est noire; & leur iris
rouge. La bête du demi-bec
supérieur est pareillement en-
tourée d'une peau nue & blan-
che, dans laquelle sont placées
les narines. Le bec, les pieds
& les ongles sont blancs. On la
trouve au *Brésil* & à la *Gua-
daloupe.*

** 59. LA PERRUCHE DE LA GUIANE.

Voyez Pl. XXVIII. Fig. 1.

Psittacus minor longicaudus, viridis, superne saturatiùs, in-
fernè dilutiùs; genis rubro maculatis; calcaneis rubro cir-

T t ij

cumdati; tectricibus alarum inferioribus minoribus coccineis, majoribus luteis; tectricibus superne saturatè viridibus, infernè obscurè luteis. . . . PSITTACA GUIANENSIS.

Elle est à peu près de la grosseur de la *Perruche à collier de l'Isle de Bourbon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec, qui a un pouce d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche dix lignes & demie de long; sa queue six pouces trois lignes; son pied huit lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce, l'intérieur neuf lignes; l'extérieur de ceux de derrière onze lignes, & l'intérieur six lignes & demie. Elle a un pied sept pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un verd assez foncé: les grandes couvertures du dessus des ailes sont de plus bordées intérieurement d'un gris-jaunâtre. La gorge, la partie inférieure

Crassitie *Psittacam Bourbonicam torquatam* circiter æmulatur. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem duodecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices. Rostrum, unum pollicem crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque decem cum semi lineas longum est; cauda sex pollices & tres lineas; pes octo lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem, intimus novem lineas; posticorum extimus undecim lineas, intimus sex cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & septem pollicum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ tectrices viridi saturatè tinguntur: superiores insuper alarum tectrices majores marginibus donantur interioribus griseo-flavicantibus.

Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & testrices caudæ inferiores dilutiores imbuuntur viridi. Genas variegant plumulæ quædam rubræ, totidem maculas concolores efficientes. Pennæ calcaneum ambientes sunt in exortu luteæ, versùs apicem rubræ, ita tamen ut color ruber solus sit conspicuus, & annulum circa calcaneum efficiat. Testrices alarum inferiores minores sunt coccineæ: majores eleganter luteæ. Remiges subtus obscurè luteæ, versùs apicem nigricante marginatæ; remix prima oris exterioribus nigricantibus quoque donatur; superne verò remiges eodem imbuuntur viridi ac dorsum ipsum tingitur, & interiùs griseo-flavicante marginantur, exceptis tamen tribus corpori finitimis marginibus griseo-flavicantibus destitutis. Omnium insuper remigum, tribus corpori vicinioribus exceptis, scapi nigricant. Caudam componunt duodecim rectrices subtus obscurè luteæ, superne saturatè virides, scapis nigris præditæ. Binæ intermediæ lateralium longitudinem excedunt; laterales autem gra-

du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd plus clair. Chaque joue est variée de quelques petites plumes rouges, qui forment autant de taches de cette couleur. Les plumes qui entourent le talon, sont jaunes à leur origine & rouges vers leur bout, mais de façon qu'il n'y a que cette dernière couleur qui paroisse, laquelle forme un anneau autour du talon. Les petites couvertures du dessous des aîles sont d'un rouge vif: les grandes sont d'un beau jaune. Les plumes de l'aîle sont en-dessous d'un jaune obscur, & bordées de noirâtre vers le bout; la première de toutes est aussi bordée extérieurement de cette couleur; mais en-dessus elles sont du même verd que le dos, & bordées intérieurement de gris-jaunâtre, excepté les trois plus proches du corps, qui n'ont pas cette bordure. De plus la tige de toutes les plumes de l'aîle, excepté celle des trois plus proches du corps, est noirâtre. La queue est composée de douze plumes d'un jaune obscur en-dessous, d'un verd assez foncé en-dessus, & dont la tige est noire. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes

en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de trois pouces que les deux du milieu. La bête du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & blanchâtre, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est pareillement blanchâtre, excepté le bout de son crochet, qui est cendré. Les pieds sont gris; & les ongles noirâtres. On la trouve dans la *Guiane*. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

datim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis trium pollicum longitudine cedentem. Basim mandibulae superioris ambit cutis nuda candicans, in qua nares sunt positae. Rostrum similiter candicans, excepto unci apice cinereo. Pedes grisei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Guiana*. *Ex museo D. de Bandeville.*

** 60. LA PERRUCHE DE CAYENNE.

Voyez Pl. XXVII. Fig. 2.

Psittacus minor longicaudus, viridis, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; remigibus intermediis candidis, superne exteriùs & apice luteo adumbratis, sequentibus interiùs candidis, luteo adumbratis, exteriùs & apice luteis; rectricibus viridibus, interiùs flavicante marginatis PSITTACA CAYANENSIS.

Elle n'est pas plus grosse qu'un *Etourneau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces trois lignes. Son bec, qui a sept lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche neuf lignes de long; la queue trois pouces six lignes;

Sturnum crassitie non antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices & tres lineas. Rostrum, quod septem cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda

tres pollices cum sex lineis ; pes sex cum femi lineas ; digitorum anticorum exterior cum ungue novem cum femi lineas , interior septem cum femi lineas ; posticorum extimus novem lineas , intimus quinque lineas. Alis expansis , extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput , pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ caudam superne cooperientes , scapulares , alarumque teñtrices superiores sunt virides. Guttur , collum inferius , pectus , venter , latera , crura , pennæ caudam subtus obtegentes , teñtricesque alarum inferiores minores viridi dilutiore tinguntur. Inferiores alarum teñtrices majores corpori viciniore ex albo ad sulphureum colorem inclinant : majores à corpore remotiores ex dilutè viridi nonnihil ad cœruleum vergunt. Teñtrices alarum superiores majores corpori finitimæ sunt in exortu & in latere interiore candidæ , in latere exteriori & apice luteæ : majores à corpore remotiores viridicœruleæ. Remiges quinque

son pied six lignes & demie ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , neuf lignes & demie , l'intérieur sept lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes , & l'intérieur cinq lignes. Elle a quatorze pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête , la partie supérieure du col , le dos & le croupion sont verts. Les couvertures du dessus de la queue , les petites du dessus des ailes & les plumes scapulaires sont de la même couleur. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessous des ailes , sont d'un verd plus clair. Les grandes couvertures du dessous des ailes les plus proches du corps sont d'un blanc tirant sur la couleur de soufre : & les grandes les plus éloignées du corps sont d'un verd clair , tirant un peu sur le bleu. Les grandes couvertures du dessus des ailes les plus proches du corps sont blanches à leur origine & du côté intérieur , jaunes du côté extérieur & à leur bout : mais les grandes les plus éloignées du corps sont d'un verd-bleu. Les cinq premières plumes de l'aile

sont en-dessus du côté extérieur & à leur bout d'un verd mêlé d'une légère teinte de bleu, & du côté intérieur noirâtres & bordées de blanc; mais en-dessous elles sont d'un verd tirant sur le bleu clair, excepté tout le long de leur tige, où elles sont noirâtres : les sept suivantes, sçavoir depuis la sixième jusqu'à la douzième inclusivement, sont blanches, cette couleur étant mêlée en-dessus du côté extérieur & au bout de la plume seulement d'une très-légère teinte de jaune : toutes les autres (excepté les quatre plus proches du corps) sont jaunes du côté extérieur & à leur bout, & leur côté intérieur est d'un blanc mêlé d'une très-légère teinte de jaune : enfin les quatre plus proches du corps sont vertes. La première des plumes de l'aîle est très-courte : la seconde est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes vertes, & bordées intérieurement de jaunâtre. Ces plumes deviennent de plus en plus étroites en approchant de leur bout. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. La

primores superne in latere exteriori & apice virides, cœruleo adumbratæ, in latere interiore nigricantes; albo marginatæ; subtus vero ex viridi ad cœruleum dilutum inclinantes, attamen secundum ipsarum scapi longitudinem nigricantes : septem quæ sequuntur, à sexta scilicet ad duodecimam usque inclusivè, candidæ, superne in latere exteriori & apice tantum luteo adumbratæ : reliquæ omnes (quatuor corpori vicinioribus exceptis) exterius & apice luteæ, interiùs candidæ, luteo adumbratæ : quatuor tandem corpori finitimæ virides. Remix prima valdè brevis est : secunda reliquas omnes longitudine superat. Caudam componunt duodecim rectrices virides, interiùs flavicante marginatæ. Rectrices autem sensim atque sensim, versùs ipsarum extremitatem procedendo, fiunt strictiores. Binæ intermediæ lateralium longitudinem excedunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda candicans, in qua nares sunt positæ. Rostrum similiter

Similiter candicat. Pedes, unguesque sunt grisei. Habitat in *Cayana*. Ex *musæo Realmuriano*.

bâse du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & blanchâtre, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est pareillement blanchâtre. Les pieds & les ongles sont gris. On la trouve à *Cayenne*. Du cabinet de *M. de Reaumur*.

61. LA PERRUCHE DU BRÉSIL.

Psittacus minor longicaudus, viridis, superne saturatiùs, infernè dilutiùs & ad flavum inclinans; vertice vividè aurantio; collo inferiore viridi-flavicante, rubro obscuro mixto; remigibus intermediis superne exterius cœruleis; rectricibus superne saturatè viridibus, infernè obscurè viridi-luteis.
 *PSITTACA BRASILIENSIS*.

Perruche couronnée d'or. *Edwards. Glanur. pag. 50. Chap. XXV; avec une figure exacte Pl. 235.*

Les Anglois l'appellent *GOLDEN-CROWNED PARRAKEET*. *Edwards.*

Cum *Psittaca torquata* crassitie circiter convenit; sed caudâ multò breviori donatur. Capitis verticem tingit color vividè aurantius. Reliquum caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ rectrices sunt eleganter saturatè virides. Guttur & collum inferius ex viridi flavicant, & aliquid rubri obscuri admixtum habent. Pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes ex dilutè
Tom. IV.

Elle est à peu près de la grosseur de la *Perruche à collier*; mais elle a la queue beaucoup plus courte. Le sommet de la tête est d'un orangé vif. Le reste de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un beau verd foncé. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un verd-jaunâtre, mêlé de rouge terni. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont
 V u

d'un verd clair, tirant sur le jaune. Les petites couvertures du dessus des ailes, les grandes les plus éloignées du corps & les plus proches du corps sont du même verd que le dos : les grandes intermédiaires sont de la même couleur du côté intérieur, & bleues du côté extérieur. Toutes les plumes de l'aile sont en-dessous d'un verd-jaune sombre, & en-dessus d'un beau verd foncé, excepté le côté extérieur de celles qui occupent le milieu, qui est bleu : cette couleur répond à la même couleur des couvertures, ce qui forme sur chaque aile une large bande longitudinale bleue. La queue est composée de douze plumes d'un beau verd foncé en-dessus, d'un verd-jaune sombre en dessous, toutes finissant en pointe. Les deux du milieu sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont entourés d'une peau nue, de couleur de chair bleuâtre : leur prunelle est noire; & leur iris est d'un orangé très-vif. La base du demi-bec supérieur est pareillement entourée d'une peau nue, de couleur de chair bleuâtre, dans laquelle sont placées les nari-

viridi ad flavum inclinant. Teſtrices alarum superiores minores, sicut & majores tam corpori finitimæ quàm à corpore remotiores, eodem imbuuntur viridi ac dorsum ipsum tingitur : majores intermedia in latere interiore concolores, in exteriori cœruleæ. Remiges omnes infernè obscurè viridi-luteæ, superne eleganter saturatè virides, attamen intermedia sunt exterius cœruleæ; qui color cœruleus eodem in teſtricibus colori respondet, unde in utraque ala lata efformatur tænia longitudinalis cœrulea. Caudam componunt duodecim reſtrices superne eleganter saturatè virides, infernè obscurè viridi-luteæ, omnes in acumen desinentes. Binæ intermedia lateralium longitudinem multum excedunt : laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque reliquis omnibus longitudine cedentem. Oculos circumdat cutis nuda ex colore carneo cœrulescens : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò vividissimè aurantiæ. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda ex colore carneo cœrulescens, in qua na-

res collocantur. Rostrum nigrum. Pedes rubescentes; ungues verò nigricantes. Habitat in *Brasilia*.
 nes. Le bec est noir. Les pieds sont rougeâtres; & les ongles noirâtres. On la trouve au *Brésil*.

62. LA PERRUCHE A FRONT ROUGE DU BRÉSIL.

Psittacus minor longicaudus, viridis, superne saturatiùs, infernè dilutiùs & ad flavum inclinans; syncipite coccineo; vertice coeruleo; rectricibus superne saturatè viridibus, subtus viridi-fuscescentibus PSITTACA BRASILIENSIS FRONTE RUBRA.

Perruche à tête rouge & bleue. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXXVI; avec une figure exacte Pl. 176.*
Les Anglois l'appellent RED AND BLUE-HEADED PARRAKEET. Edwards.

Psittacæ vulgari paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem circiter pollices æquat, & ad extremos ungues quinque pollices & tres lineas. Rostrum, quod septem lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque sex cum semi lineas longum est; cauda sex pollices; pes quatuor lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue octo lineas, intimus quinque lineas; posticorum exterior sex cum semi lineas, interior quatuor lineas. Alæ complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Synciput coccineo tingitur colore. Vertex capitis ele-

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que la *Perruche ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces trois lignes. Son bec, qui a sept lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche six lignes & demie de long; sa queue six pouces; son pied quatre lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, huit lignes, l'intérieur cinq lignes; l'extérieur de ceux de derrière six lignes & demie, & l'intérieur quatre lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Le synciput est d'un rouge vif. Le sommet de la tête est d'un beau bleu;

qui s'adoucit peu à peu en approchant de l'occiput. Le derrière & les côtés de la tête, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd foncé. La gorge, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd plus clair, & tirant sur le jaune. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont bleues. Les grandes plumes de l'aile sont en-dessus de cette dernière couleur du côté extérieur & à leur bout, leur côté intérieur, ainsi que tout le dessous, est d'un cendré obscur : les moyennes sont du même verd que le dos. La queue est composée de douze plumes d'un verd foncé en-dessus, & d'un verd-brunâtre en-dessous. Les deux du milieu sont plus longues de sept lignes que celle qui les suit immédiatement de chaque côté : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de trois pouces huit lignes que les deux du milieu. Les yeux sont en-

ganti imbuitor cœruleo, qui color sensim atque sensim, versus occipitium procedendo, fit dilutior. Caput posterius & ad latera, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & rectrices caudæ superiores sunt saturatè virides. Guttur, pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices dilutius virides, & ad flavum inclinantes. Rectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, dorso concolores : majores à corpore remotiores cœuleæ. Remiges majores superne in latere exteriori & apice cœruleo similiter tinctæ, in latere interiori, sicut & subtus in utroque latere, obscurè cinereæ : minores eodem imbuuntur viridi ac dorsum ipsum tingitur. Cauda duodecim conflatur rectricibus superne saturatè viridibus, subtus viridi-fuscescentibus. Binæ intermediæ utrinque proximè sequentem septem linearum longitudine excedunt : laterales omnes gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis trium pollicum & octo linearum longitudine cedentem. Ocu-

Ios circumdat cutis nuda aurantia : ipforum pupilla est nigra ; irides verò luteo-aurantiæ. Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda dilutè cinerea, in qua nares positæ sunt. Mandibula superior ex dilutè cinereo candicans : inferior colore nonnihil obscuriore tincta. Pedes, unguisque ex cinereo-candicante ad carneum colorem vergentes. Habitat in *Brasilia*.

tourés d'une peau nue & orangée : leur prunelle est noire ; & leur iris est d'un jaune-orangé. La lase du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue, d'un cendré clair, dans laquelle les narines sont placées. Le demi-bec supérieur est d'un cendré clair & blanchâtre : l'inférieur est d'une couleur un peu plus obscure. Les pieds & les ongles sont d'un cendré-blanchâtre, tirant sur le couleur de chair. On la trouve au *Brésil*.

63. LA PERRUCHE DES INDES.

Psittacus minor longicaudus, viridis, superne saturatiùs, infernè dilutiùs & ad flavum inclinans ; gutture coccineo ; rectricibus alarum superioribus rubescentibus ; rectricibus saturatè viridibus *PSITTACA INDICA*.

Petite Perruche à l'aîle rouge. *Edwards. Glanur. pag. 53. Chap. XXVI ; avec une figure exacte Pl. 236.*

Les Anglois l'appellent *LITTLE RED-WINGED PARRAKEET*. *Edwards.*

Crassitie Alaudam cristatam non multùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem octo pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos unguis quinque pollices & tres lineas. Rostrum, quod sex lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos quinque lineas longum est ; cauda quatuor pollices & sex lineas ; pes quatuor li-

Elle n'est guères plus grosse qu'une *Alouette hupée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces trois lignes. Son bec, qui a six lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche cinq lignes de long ; sa queue quatre pouces six lignes ; son pied quatre lignes ; le doigt.

extérieur de devant , joint avec l'ongle , huit lignes , l'intérieur cinq lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière six lignes & demie , & l'intérieur quatre lignes. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'au quart de la longueur de la queue. La tête , le col , le dos , le croupion , les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un verd foncé. La gorge est d'un beau rouge vif. La poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un verd clair , & tirant sur le jaune. Le bord de l'aîle est verd. Les couvertures du dessus des aîles sont rougeâtres. Les plumes de l'aîle sont d'un verd foncé. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que le dos. Les deux du milieu sont beaucoup plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte de toutes. Les yeux sont entourés d'une peau nue & blanchâtre : leur prunelle est noire ; & leur iris est d'une couleur de noisette très-foncée. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée

neas ; digitorum anticorum extimus cum ungue octo lineas , intimus quinque cum semi lineas ; posticorum exterior sex cum semi lineas , interior quatuor lineas. Alae complicatae ad quartam circiter longitudinis caudae partem usque protenduntur. Caput , collum , dorsum , uropygium , superiores caudae tectrices & scapulares pennas tingit color saturatè viridis. Guttur colore imbitur coccineo. Pectus , venter , latera , crura , inferiores caudae tectrices & pennae alas subtus obtegentes ex dilutè viridi ad flavum inclinant. Alarum margines sunt virides. Superiores alarum tectrices rubescentes. Remiges saturatè virides. Cauda duodecim constat rectricibus dorso concoloribus. Binæ intermediae lateralium longitudinem multum excedunt ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque reliquis omnibus longitudine cedentem. Oculos circumdat cutis nuda candicans : ipsorum pupilla est nigra ; irides autem saturatissimè avelanæ. Basim mandibulae superioris pariter ambit cutis nuda candicans , in qua na-

res sitæ sunt. Rostrum, pedes, unguisque colore imbuuntur pallidè carneo. Habitat in *India Orientali*. d'une peau nue & blanchâtre, dans laquelle sont placées les narines. Le bec, les pieds & les ongles sont de couleur de chair pâle. On la trouve aux *Indes Orientales*.

** 64. LA PERRUCHE DE GINGI.

Voyez Pl. XXIX. Fig. 1.

Psittacus minor longicaudus, viridis, infernè ad flavum inclinans; paucò rubro obscuro in dorso mixto; gutture & collo inferiore nonnihil ad cinereum vergentibus; rectricibus alarum superioribus minoribus corpori finitimis obscurè rubris; rectricibus subtus pallidè luteis, superne binis intermediis dilutè viridibus, tribus utrinque proximis exterius dilutè viridibus, interiùs viridi-luteis, binis utrinque extimis viridi-luteis *PSITTACA GINGINIANA*.

Psittacam torquatam crassitie multum superat. Ipsiùs longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem unum pedem & novem pollices explet, & ad extremos ungues novem pollices & sex lineas. Rostrum, quindecim cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda tredecim pollices cum sex lineis; pes octo lineas; digitorum anticorum exterior cum ungue tredecim cum semi lineas, interior decem lineas; posticorum extimus unum pollicem, intimus

Elle est beaucoup plus grosse que la *Perruche à collier*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces six lignes. Son bec, qui a quinze lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche un pouce de long; sa queue treize pouces six lignes; son pied huit lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, treize lignes & demie, l'intérieur dix lignes; l'extérieur de ceux de derrière un pouce, & l'intérieur sept lignes & demie.

Elle a un pied onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un beau verd. Sur le dos est mêlé un peu de rouge obscur. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un verd très-clair, & tirant tant soit peu sur le cendré. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd clair, & tirant sur le jaune. Les petites couvertures du dessous des aîles sont vertes : les grandes sont cendrées. Les petites du dessus des aîles les plus proches du corps sont d'un rouge obscur : toutes les autres sont vertes. Toutes les plumes de l'aîle sont cendrées en-dessous; mais en-dessus la première est noirâtre, & bordée extérieurement de verd : toutes les autres sont vertes, & ont la plus grande partie de leur côté intérieur noirâtre : de plus leur bord extérieur & leur bout tirent un peu sur le jaunâtre; & leur bord intérieur est d'un cendré clair. La première des plumes de l'aîle est un peu plus courte que la seconde, qui est la plus lon-

septem cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & undecim pollicum; alæ vero complicatæ tertiam longitudinis caudæ partem pertingunt. Caput, pars colli superior; dorsum; uropygium, superiores caudæ tectrices & scapulares pennæ sunt eleganter virides. In dorso aliquid insuper rubri obscuri admiscetur. Guttur & collum inferius ex dilutissimo viridi nonnihil ad cinereum vergunt. Pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ tectrices sunt dilutè virides, ad flavum inclinantes. Tectrices alarum inferiores minores virides : majores cinereæ. Superiores alarum tectrices minores corpori viciniore obscure rubræ : reliquæ omnes virides. Remiges omnes sunt subtus cinereæ; superne verò prior nigricat, & viridi exterius marginatur : reliquæ omnes sunt virides; attamen in latere interiore maximâ parte nigricantes, ad margines insuper exteriores & in apice ad flavicantem colorem vergentes, orisque interioribus dilutè cinereis præditæ. Remix prima secundæ paululùm longitudine cedit;

dit ; secunda autem omnium longissima. Caudam componunt duodecim rectrices subtus omnes pallidè luteæ ; superne verò binæ intermedia dilutè virides : tres utrinque proximæ in latere exteriori concolores , in interiore viridi-luteæ : binæ tandem utrinque extimæ penitus viridi-luteæ. Binæ rectrices intermedia utrinque proximè sequentem quatuor pollicum longitudine excedunt : laterales omnes gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis novem pollicum & totidem linearum longitudine cedentem. Duodecim rectricum scapi superne fuscescunt. Oculos circumdat cutis nuda rubescens. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda concolor , in qua nares positæ sunt. Rostrum coccineum. Pedes rubescentes ; ungues verò cinerei. Habitat in *Gingimiano Regno in India Orientali. Ex museo D. Aubry.*

gue de toutes. La queue est composée de douze plumes , toutes d'un jaune pâle en-dessous ; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un verd clair : les trois qui les suivent immédiatement de chaque côté , sont de la même couleur du côté extérieur , & d'un verd-jaune du côté intérieur : enfin les deux plus extérieures de chaque côté sont tout-à-fait de cette dernière couleur. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues de quatre pouces que celle qui les suit immédiatement de chaque côté : toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est plus courte de neuf pouces neuf lignes que les deux du milieu. Les tiges des douze plumes de la queue sont brunes en-dessus. Les yeux sont entourés d'une peau nue & rougeâtre. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue , de la même couleur , dans laquelle sont placées les narines. Le bec est d'un rouge vif. Les pieds sont rougeâtres ; & les ongles

cendrés. On la trouve dans le Royaume de *Gingi* dans les *Indes Orientales. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

** 65. LA PERRUCHE A TESTE ROUGE DE GINGI.

Voyez Pl. XXIX. Fig. 2.

Psittacus minor longicaudus, superne viridi-flavicans, infernè luteo - viridescens; capite rubro, dilutè cœruleo adumbrato; taniâ nigrâ ab oris angulo ad oris angulum per occipitium ductâ; gutture nigro; maculâ in alis obscurè rubrâ; rectricibus viridibus, lateralibus interiùs luteis . . .
PSITTACA GINGINIANA ERYTHROCEPHALOS.

Elle est un peu moins grosse que la *Perruche ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces trois lignes. Son bec, qui a six lignes d'épaisseur, a aussi depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche six lignes de long; sa queue six pouces trois lignes; son pied cinq lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, neuf lignes, l'intérieur sept lignes; l'extérieur de ceux de derrière sept lignes & demie, & l'intérieur quatre lignes & demie. Elle a quatorze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête est d'un rouge nuancé de bleu clair, cette dernière couleur devenant d'autant plus forte qu'elle s'approche plus de l'oc-

Psittacæ vulgari paululum crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices æquat, & ad extremos ungues sex pollices & tres lineas. Rostrum, quod sex lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos sex quoque lineas longum est; cauda sex pollices cum tribus lineis; pes quinque lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue novem lineas, intimus septem lineas; posticorum extimus septem cum semi lineas, intimus quatuor cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput rubrum est, dilutè cœruleo adumbratum;

cœruleus autem color sensim atque sensim, versùs occipitium procedendo, intensior fit. In capite colorem rubrum circumdat tænia nigra, utrinque ab oris angulis orta, quæque, infra genas ducta, occipitium cingit. Infra tæniam nigram altera adest tænia dilutissimè viridis, collum ambiens, & torquem quodammodo efficiens. Pars colli superior, dorsum & scapulares pennæ ex obscurè viridi nonnihil flavicant. Uropygium & superiores caudæ rectrices sunt dilutè virides. Guttur nigrum. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores luteo-viridescentes. Rectrices alarum superiores & inferiores virides; attamen in utraque ala macula adest rotunda obscurè rubra. Remiges sunt subtus cinereo-fuscæ, superne verò in latere exteriore & apice virides, in interiore cinereo-fuscæ. Remigum omnium scapi sunt superne nigri, subtus fusci. Remix prima sat brevis est: tertia reliquas omnes longitudine superat. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermedia virides: laterales omnes in la-

ciput. Le rouge de la tête est entouré d'une bande noire, qui part de chaque côté des coins de la bouche, & va entourer l'occiput, en passant par-dessous les joues. Au-dessous de cette bande noire en est une autre d'un verd très-clair, qui entoure le col, & forme une espece de collier. La partie supérieure du col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un verd sombre & tirant un peu sur le jaunâtre. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd clair. La gorge est noire. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un jaune-verdâtre. Les couvertures du dessus & du dessous des ailes sont vertes; il y a cependant sur chaque aile une tache ronde d'un rouge obscur. Les plumes de l'aile sont en-dessous d'un cendré-brun, & en dessus elles sont vertes du côté extérieur & à leur bout, & d'un cendré-brun du côté intérieur. La tige de toutes ces plumes est noire en-dessus & brune en-dessous. La première de ces plumes est assez courte: la troisième est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont

vertes : toutes les latérales sont de la même couleur du côté extérieur, & jaunes du côté intérieur. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de quatre pouces une ligne que les deux du milieu. Le bec est rougeâtre. Les pieds & les ongles sont gris. On la trouve dans le Royaume de *Gingi* dans les *Indes Orientales*, d'où elle a été envoyée à *M. l'Abbé Aubry*, qui la conserve dans son cabinet.

tere exteriori concoloris; in interiori lutea. Binæ intermediae lateralium longitudinem excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis quatuor pollicum & linearum unius longitudine cedentem. Rostrum rubescens. Pedes, unguesque grisei. Habitat in *Ginginiano Regno in India Orientali*, unde in *museum D. Aubry* missa est.

66. LA PERRUCHE DE BENGAL.

Psittacus minor longicaudus viridis, infernè ad flavum inclinans; vertice roseo; occipitio cœruleo; gutture & torque nigris; maculâ in alis obscurè rubrâ; rectricibus superne cœruleis, infernè obscurè flavicantibus . . . *PSITTACA BENGALENSIS*.

Psittacus sub mento niger, capite rubro, cervice purpureâ; inferiore mandibulâ nigrâ, superiore croceâ, pedibus cœruleis. *Klein. Avi. pag. 25. N^o. 25.*

Perruche à collier à tête couleur de rose. *Edwards. Glanur. pag. 47. Chap. XXIII; avec une figure exacte Pl. 233.*

Petit Perroquet de Bengale. *Alb. Tom. III. pag. 7; avec une figure peu exacte Pl. 14.*

Les Anglois l'appellent BIRD WAS BROUGHT FROM BENGAL. *Alb. ROSE-HEADED RING PARRAKEET. Edwards.*

Les Originaires de Bengale, FRIDYTUTAH. *Alb.*

Elle est un peu plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à

Crassitie præcedentem paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad cau-

dam extremam decem circiter pollices explet, & ad extremos ungues sex pollices & tres lineas. Rostrum, quod octo lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque septem cum semi lineas longum est; cauda quinque pollices cum sex lineis; pes sex lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue undecim lineas, intimus septem lineas; posteriorum exterior novem lineas, interior sex lineas. Alæ complicatæ ad quartam circiter longitudinis caudæ partem usque protenduntur. Capitis vertex & genæ roseo colore tinguntur: caput posterius est cœruleum; duo autem colores isti sensim atque sensim inter se mixti sunt. Guttur nigrum; quæ nigredo binas efficit strictiores tæbias, unam scilicet utrinque productam, quæ in parte capitis posteriore coadunatæ, torquem quodammodo efformant. Partem colli superiorem, dorsum, uropygium, pennas scapulares, rectricesque caudæ superiores tingit color eleganter viridis. Collum inferius, pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes ex viridi

celui de la queue est d'environ dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces trois lignes. Son bec, qui a huit lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche sept lignes & demie de long; sa queue cinq pouces six lignes; son pied six lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes, l'intérieur sept lignes; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes, & l'intérieur six lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au quart de la longueur de la queue. Le sommet de la tête & les joues sont de couleur de rose: le derrière de la tête est bleu; & ces deux couleurs se perdent insensiblement l'une dans l'autre. La gorge est noire: cette couleur s'étend en deux bandes étroites, une de chaque côté, qui se réunissant vers le derrière de la tête, forment une espèce de collier. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un beau verd. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un verd tirant sur le jaune. Les couver-

tures du dessus des ailes sont vertes, excepté quelques-unes des petites, qui sont d'un rouge obscur, & qui forment sur l'aile une tache de cette couleur. Les plumes des ailes sont vertes en-dessus, d'un verd obscur en-dessous; & le bord extérieur de quelques-unes des grandes est d'un verd-jaune. La queue est composée de douze plumes bleues en-dessus, d'un jaunâtre obscur en-dessous, toutes finissant en pointe. Les deux du milieu sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. La bête du demi-bec supérieure est entourée d'une peau nue & rembrunie, dans laquelle sont placées les narines. Le demi-bec supérieur est d'un jaune pâle : l'inférieur est d'un brun obscur ou noirâtre. Les pieds & les ongles sont cendrés. On la trouve dans le Royaume de *Bengale*.

ad flavum inclinant. Superiores alarum rectrices sunt virides, attamen ex minoribus quædam sunt obscurè rubræ, & in utraque ala maculam concolorem efficiunt. Remiges superne virides, subtus obscurè virides; & ex majoribus quædam oris donantur exterioribus viridi-luteis. Cauda duodecim conflatur rectricibus superne cæruleis, infernè obscurè flavicantibus omnibus in acumine desinensibus. Binæ intermedia lateralium longitudinem non multum excedunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque reliquis omnibus longitudine cedentem. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda fuscescens, in qua nares collocantur. Mandibula superior pallidè lutea : inferior obscurè fusca sive nigricans. Pedes, unguesque cinerei. Habitat in *Bengalensi* Regno.

** 67. LA PERRUCHE DE LA CAROLINE.

Psittacus minor longicaudus, viridis; capite anteriùs, marginibus alarum, & calcaneorum ambitu aurantiis; occipitio, gutture & collo supremo luteis; remigibus majoribus superne exterius in exortu luteis, dein viridibus, apice ad cæruleum vergentibus; rectricibus viridibus . . . *PSITTACA CAROLINENSIS*.

Psittacus capite luteo, fronte rubrâ, caudâ longâ. Klein. Avi. pag. 25. N^o. 14.

Psittacus viridis, capite luteo, & fronte rubrâ. Frisch. hujus icon satis accurata Tab. 52.

Psittacus viridis, capite fulvo maculato. Linn. Syst. Nat. ed. 6. Gen. 37. sp. 5.

Psittacus pumilio, viridis, fulvo capite maculoso. Barr. Ornith. Class. III. Gen II. sp. 13.

Psittacus minor, vertice maculato. Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 145.

Psittacus Carolinienfis. Klein. Avi. pag. 25. N^o. 19.

Perroquet de la Caroline. Catesb. Tom. 1. pag. 11; avec une figure peu exacte Pl. II.

Les François de la Guiane l'appellent PERRICHE DES AMAZONES. Barr. Les Anglois, PARROT OF CAROLINA. Catesb.

Psittacam torquatum crassitie paululùm superat. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem tredecim pollices explet, & ad extremos ungues octo pollices & totidem lineas. Rostrum, quod unum pollicem crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda sex pollices; pes sex lineas; digitorum anticorum extremus cum ungue undecim lineas, intimus septem cum semi lineas; posticorum extremus decem lineas, intimus sex lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis novem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas ferè tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Tota capi-

Elle est un peu plus grosse que la *Perruche à collier*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces huit lignes. Son bec, qui a un pouce d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche onze lignes de long; sa queue six pouces; son pied six lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes, l'intérieur sept lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes, & l'intérieur six lignes. Elle a un pied neuf pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Toute la partie antérieure de la tête est d'un bel orangé. Le derrière de la tête,

le haut du col ou la partie du col qui est la plus voisine de la tête, & la gorge sont jaunes. Le bas du col ou la partie du col qui est la plus voisine du corps, le dos, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, la poitrine, le ventre & les côtés sont verts. Les jambes sont couvertes de plumes de la même couleur, excepté celles qui entourent le talon, qui sont d'un bel orangé. Le bord de l'aile, sur le pli qui répond à celui du poignet, & de là en descendant vers le bout de l'aile, dans l'espace de près de trois pouces, est de cette dernière couleur. Les petites couvertures du dessous des ailes sont vertes : les grandes sont brunes. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus éloignées du corps, sont du même verd que le dos : les grandes les plus proches du corps sont d'un verd tirant un peu sur le jaune. Les grandes plumes de l'aile sont brunes en-dessous ; en-dessus elles sont de la même couleur du côté intérieur, & leur côté extérieur est jaune vers l'origine de la plume, ensuite verd, & leur bout tire sur le bleu : les moyennes sont vertes en-dessus & brunes en-dessous. La queue est composée de

tis anterior pars eleganti aurantio tingitur. Caput posterius, collum supremum sive partem colli capiti viciniorem, & guttur vestiunt penæ luteæ. Quæ collum infimum sive partem colli corpori finitimam, dorsum, uropygium, pectus, ventrem & latera cooperiunt ; sicut & tectrices caudæ superiores & inferiores, sunt virides. Quæ crura obtinent, concolores, exceptis tamen illis quæ calcaneum ambiunt, eleganter aurentiis. Alarum margines, ad articulum carpo humano respondentem & inde versum alarum extremitates procedendo, per spatium trium fere pollicum simili aurantio tinguntur. Tectrices alarum inferiores minores sunt virides : majores fuscæ. Superiores minores, sicut & majores à corpore remotiores, eodem ac dorsum viridi imbutæ : majores corpori finitimæ ex viridi nonnihil ad luteum vergentes. Remiges majores subtus fuscæ, superne verò in latere interiore concolores, in exteriori versum ipsarum exortum luteæ, dein virides, & tandem apice ad cœruleum vergentes : minores superne virides ;

Ædes, subtus fusca. Cauda duodecim conflatur rectricibus viridibus. Binæ intermedie utrinque proximè sequentem unius pollicis & sex linearum longitudine excedunt: laterales omnes gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Oculos circumdat cutis nuda dilutè cinerea: ipsorum pupilla est nigra; irides verò luteæ. Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda candidans, in qua nares sunt positæ. Rostrum ex albo lutescens. Pedes, unguisque cinereo-albi. Habitat in *Guiana*. Autumnali tempore in *Carolinam* & etiam in *Virginiam* migrat. *Ex museo Realmuriano.*

douze plumes vertes. Les deux du milieu sont plus longues d'un pouce six lignes que celle qui les suit immédiatement de chaque côté: toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont entourés d'une peau nue, d'un cendré clair: leur prunelle est noire; & leur iris jaune. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & blanchâtre, dans laquelle les narines sont placées. Le bec est d'un blanc-jaunâtre. Les pieds & les ongles sont d'un gris-blanc. On la trouve dans la *Guiane*. Elle va en Automne à la *Caroline* & même jusqu'en *Virginie*. Du cabinet de *M. de Reaumur*.

** 68. LA PERRUCHE ILLINOISE.

Psittacus minor longicaudus, superne viridis, infernè viridiluteus; syncipite, genis & gutture aurantiis; collo inferiore cinereo-viridi; ventre maculis aurantiis vario; rectricibus subtus obscurè luteis, superne viridibus, lateralibus interiùs dilutè luteo marginatis *PSITTACA ILLINIACA.*

Psittacus minor viridis, caudâ longâ & malis croceis. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 54.*

Psittacus viridis, caudâ longâ, malis croceis. *Klein. Avi. pag. 25. N°. 20.*

Psittaci minoris Marcgravii secunda species, Tui Apute Juba. *Willugh. Ornith. pag. 78.*

Tom. IV.

Y y

Tui Apure Juba , secunda species. *Marcgr. Hist. Br. pag. 206.*

Jonst. Avi. pag. 141.

Tui Apure Juba. *Raj. Syn. Avi. pag. 34. N^o. 2.*

Tui species secunda ; Tui Apure Juba *Marcgravii. Raj. Syn. Avi. pag. 181. N^o. 6.*

Perruche facée de jaune. *Edwards. Glanur. pag. 49. Chap. XXIV ; avec une figure exacte Pl. 234.*

Les Anglois l'appellent YELLOW-FACED PARRAKEET. Edwards.

Les Brâsiliens TUI APURE JUBA. Marcgr. Jonst.

Elle n'est pas si grosse que la *Perruche ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes , & jusqu'à celui des ongles de six pouces quatre lignes. Son bec , qui a neuf lignes d'épaisseur , a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche huit lignes de long ; sa queue quatre pouces neuf lignes ; son pied six lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , dix lignes , l'intérieur six lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes , & l'intérieur cinq lignes. Elle a quinze pouces quatre lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à deux pouces neuf lignes au-delà de l'origine de la queue. Le synciput , les joues & la gorge sont d'un bel orangé. Le dessus de la tête est d'un verd foncé , qui devient cependant de plus en plus clair , en approchant de l'occiput , qui est varié de jaune. La partie su-

Psittacæ vulgari paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex lineas æquat , & ad extremos ungues sex pollices & quatuor lineas. Rostrum , quod novem lineas crassum , ab ipsius unco ad oris angulos octo lineas longum est ; cauda quatuor pollices cum novem lineis ; pes sex lineas ; digitorum anteriorum extimus cum ungue decem lineas , intimus sex cum semi lineas ; posticorum exterior novem lineas , interior quinque lineas. Ab extremo ad extremum alatum extensarum distantia est quindecim pollicum & quatuor linearum ; alæ verò complicatæ ad duos pollices & novem lineas ultra caudæ exortum protenduntur. Synciput , genæ & guttur elegantiaurantio imbuuntur colore. Caput superius est saturatè viridis ; viridis autem

color sensim atque sensim, versùs occipitium procedendo, fit dilutior; occiput verò luteo variegatur. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ teñtrices sunt virides. Collum inferius est cinereo-viride. Pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam subtus obtegentes, alarumque teñtrices inferiores minores viridi-luteo tinguntur; attamen ventrem variegant maculæ aurantiæ. Teñtrices alarum inferiores majores sunt cinereæ. Superiores omnes eodem imbutæ viridi ac dorsum ipsum tingitur; majores autem oris interioribus cinereis præditæ sunt. Alarum componunt viginti tres remiges, omnes subtus saturatè cinereæ; superne verò septemdecim primores sunt viridi-cœruleæ, interiùs nigricante marginatæ, scapis similiter nigricantibus præditæ: decima-octava viridis, oris interioribus, scapisque nigricantibus: quinque tandem corpori finitimæ penitus virides. Cauda duodecim constat reñtricibus subtus obscurè luteis; superne verò binæ intermediæ sunt virides: duæ utrinque proximè sequentes

périeure du col, le dos & le croupion sont verds. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La partie inférieure du col est d'un cendré-verd. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessous des ailes sont d'un verd-jaune; mais le ventre est varié de taches orangées. Les grandes couvertures du dessous des ailes sont cendrées. Toutes celles du dessus sont du même verd que le dos; & les grandes sont bordées intérieurement de cendré. L'aile est composée de vingt-trois plumes, toutes d'un cendré foncé en-dessous; mais en-dessus les dix-sept premières sont d'un verd-bleu, bordées intérieurement de noirâtre, & ont leur tige de cette dernière couleur: la dix-huitième est verte, & a le bord intérieur & la tige noirâtres: enfin les cinq plus proches du corps sont tout-à-fait vertes. La queue est composée de douze plumes, toutes d'un jaune obscur en-dessous; mais en-dessus les deux du milieu sont vertes: les deux qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont de la même couleur, mais une partie de leur côté intérieur est d'un cen-

dré foncé, bordé étroitement de jaune clair : les trois plus extérieures de chaque côté sont pareillement vertes, & bordées intérieurement de jaune clair. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte d'un pouce neuf lignes que les deux du milieu. Les yeux sont entourés d'une peau nue & cendrée : leur prunelle est noire ; & leur iris est d'un orangé foncé. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & cendrée, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est d'un cendré clair. Les pieds sont d'un cendré un peu plus foncé ; & les ongles bruns. On la trouve au *Brésil* & dans le pays des *Illinois*. Des cabinets de *Madame de Bandeville* & de *M. l'Abbé Aubry*. Je l'ai aussi vu vivante à *Paris*.

concolores, attamen partim in latere interiore saturatè cinerea, strictissimè dilutè luteo marginatæ : tres utrinque extremæ simili viridi imbutæ, oris interioribus dilutè luteis præditæ. Binæ rectrices intermedia lateralium longitudinem excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis unius pollicis & novem linearum longitudine cedentem. Oculos circumdat cutis nuda cinerea : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò saturatè aurantiæ. Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda cinerea, in qua nares sunt positæ. Rostrum dilutè cinereum. Pedes cinerei quidem, sed nonnihil saturatiùs ; ungues verò fuscii. Habitat in *Brasilia* & *Illinorum* regione. Ex museis *D. de Bandeville* & *D. Aubry*. Speciem istam *Parisiis* vivam quoque observavi.

** 69. LA PERRUCHE DE LA MARTINIQUE.

Psittacus minor longicaudus, superne viridis, infernè viridilutescens ; vertice viridi-cærulescente, syncipite, genis & collo inferiore griseo-fuscis, ad fulvum inclinantibus ; rectricibus superne viridibus, subtus lutescentibus
PSITTACA MARTINICANA.

Perruche à gorge brune. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXXVII; avec une figure exacte Pl. 177.*

Les Anglois l'appellent BROWN-THROATED PARRAKEET. Edwards.

Cum *Psittaca vulgari* crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & decem lineas. Rostrum, septem cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque septem lineas longum est; cauda quinque pollices; pes quinque cum semi lineas; digitorum anticorum exterior cum ungue decem lineas, interior sex cum semi lineas; posticorum extimus novem lineas, intimus quinque lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum quindecim pollicum & novem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Pennæ basim rostri ambientes, quæque genas, guttur & partem colli inferiorem obtegunt, sunt griseo-fuscæ, nonnihil ad fulvum inclinantes. Capitis vertex, mediam versùs partem usque, ex viridi cœrulescit. Reliquum caput, collum superius, dorsum

Elle est à peu près de la grosseur de la *Perruche ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces dix lignes. Son bec, qui a sept lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche sept lignes de long; sa queue cinq pouces; son pied cinq lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, dix lignes, l'intérieur six lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes, & l'intérieur cinq lignes. Elle a quinze pouces neuf lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. Les plumes qui entourent la bête du bec, & celles qui couvrent les joues, la gorge & la partie inférieure du col, sont d'un gris-brun, tirant un peu sur le fauve. Le sommet de la tête, jusque vers son milieu, est d'un verd-bleuâtre. Tout le reste de la tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont verts. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de

la queue sont de la même couleur. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessous des ailes sont d'un verd - jaunâtre. Les grandes couvertures du dessous des ailes sont noirâtres. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même verd que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont bleues. Toutes les plumes de l'aile sont noirâtres en-dessous ; mais en-dessus les grandes sont bleues, ayant une grande partie de leur côté intérieur noirâtre : les moyennes sont du même verd que le dos. La queue est composée de douze plumes vertes en-dessus & jaunâtres en-dessous. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont entourés d'une peau nue, d'un cendré clair : leur prunelle est noire ; & leur iris de couleur de noisette-jaunâtre. La bête du demi - bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue, d'un cendré foncé, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est d'un cendré clair à sa bête, & qui devient plus foncé en

& uropygium, sunt viridia. Pennas scapulares & superiores caudæ rectrices idem tingit color. Pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam subtus cooperientes & rectrices alarum inferiores minores ex viridi lutescunt. Alarum rectrices inferiores majores nigricant. Superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt eodem ac dorsum viridi imbutæ : majores à corpore remotiores cœruleæ. Remiges omnes subtus nigricantes ; superne verò majores cœruleæ, attamen in latere interiore maximâ parte nigricantes : minores eodem imbutæ viridi ac dorsum ipsum tingitur. Cauda duodecim conflatur rectricibus superne viridibus, subtus lutescentibus. Binæ intermediæ lateralium longitudinem superant ; laterales autem gradatim longitudinem minuuntur ad utrinque extremam usque brevior. Oculos circumdat cutis nudâ dilutè cinerea : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò ex avellaneo flavicantes. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda saturatè cinerea, in qua nares sunt positæ. Rostrum cinereum, ad basin quidem dilutiùs,

& versùs apicem procedendo saturatiùs. Pedes , unguisque cinereo-fusci. Habitat in *Martinica* & variis *Americæ* regionibus. Speciem istam *Parisiis* vivam observavi.

approchant vers le bout. Les pieds & les ongles sont d'un cendré-brun. On la trouve à la *Martinique* & en différens endroits de l'*Amérique*. Je l'ai vu vivante à *Paris*.

** 70. LA PERRUCHE A TESTE BLEUE.

Voyez Pl. XIX. Fig. 2.

Psittacus minor longicaudus, superne viridis, infernè viridiluteus; capite cœruleo-violaceo, sincipite ad rubrum inclinante, gutture cinereo-violaceo; collo ad latera luteo; rectricibus subtus cinereo-luteis, superne binis intermediis viridi-cœruleis, utrinque proximâ exterius viridi-cœruleâ, interiùs luteo-viridi, quatuor utrinque extimis exterius viridibus, interiùs luteis, lateralibus apice pallidè luteis
PSITTACA CYANOCEPHALOS.

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices. Rostrum, quod octo lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque septem lineas longum est; cauda sex pollices cum linea unica; pes sex lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue decem lineas, intimus septem lineas; posticorum extimus novem lineas, intimus quinque li-

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces. Son bec, qui a huit lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche sept lignes de long; sa queue six pouces une ligne; son pied six lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, dix lignes, l'intérieur sept lignes; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes, & l'intérieur cinq lignes. Elle a quinze pouces de

vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du quart de la longueur de la queue. La tête est d'un bleu-violet: sur le synciput cette couleur tire un peu sur le rouge, ensuite elle s'obscurcit en descendant de chaque côté & en s'approchant de la gorge, qui est d'un cendré-violet. Les parties supérieures du col & du dos, & les plumes scapulaires sont vertes. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd plus brillant. La partie inférieure du col est d'un jaune-vert: cette couleur remonte de chaque côté en se rétrécissant, & devenant de plus en plus jaune jusque vers la partie supérieure du col; de sorte que les côtés du col sont tout-à-fait jaunes. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd-jaune. Les petites couvertures du dessous des ailes sont d'un verd d'Aigue-marine: les grandes sont cendrées. Toutes celles du dessus des ailes sont vertes, le verd étant plus brillant sur les petites les plus proches du corps que sur les autres. Les plumes de l'aile sont cendrées en-dessous; mais en-dessus elles sont vertes du côté extérieur

neas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quindecim pollicum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra quartam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput cœruleo-violaceo tingitur colore: quî color in syncipite paululum ad rubrum inclinât, dein utrinque descendendo & versûs guttur procedendo, fit obscurior: guttur autem est cinereo-violaceum. Pars colli superior, sicut & dorsî suprema, scapularesque pennæ sunt virides. Dorsum inferum, uropygium & superiores caudæ tectrices viridi imbuuntur lucidior. Pars colli inferior est luteo-viridis: quî color utrinque versûs partem colli superiorem assurgens, fit strictior, & magis magisque ad luteum vergit; ita ut collum ad latera sit penitus luteum. Pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ viridi-luteæ. Quæ caudam subtus obtegunt, sunt eodem colore tinctæ. Tectrices alarum inferiores minores viridi-berryllinæ: majores cineræ. Omnes alarum tectrices superiores virides, minoribus quidem corpori finitimis lucidioribus. Remiges sunt subtus cineræ;

nereæ, superne verò in latere exteriori & apice virides, exterius pallidè luteo marginatæ, in latere interiore saturatè cinereæ: omnium in super remigum scapi sunt nigri; & prioris margo exterior albet. Caudam componunt duodecim rectrices, omnes subius cinereo-luteæ; superne verò binæ intermediae sunt virides, quidem, sed versùs ipsarum extremitates procedendo, magis magisque ad cœruleum vergentes: utrinque proximè sequens in latere exteriori concolor, in interiore lutea quidem, sed pariter versùs ipsius extremitatem procedendo, magis magisque ad viride inclinans: quatuor utrinque extimæ in latere exteriori virides, in interiore luteæ; qui color luteus versùs rectricis extremitatem paululùm quoque ad viride inclinât. Duodecim rectricum scapi superne nigricant, infernè candicant; laterallium autem omnium apices sunt pallidè lutei. Binæ rectrices intermediae utrinque proximè sequentem duorum pollicum longitudine antecellunt: laterales omnes gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam us-

& à leur bout, bordées extérieurement de jaune pâle, & leur côté intérieur est d'un cendré foncé: toutes ces plumes ont leur tige noire; & le bord extérieur de la première est blanc. La queue est composée de douze plumes, toutes d'un cendré-jaune en-dessous; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un verd qui tire d'autant plus sur le bleu, qu'il approche plus du bout de la plume: celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est de la même couleur du côté extérieur, & son côté intérieur est d'un jaune qui tire de même d'autant plus sur le verd, qu'il approche plus du bout de la plume: les quatre plus extérieures de chaque côté sont vertes du côté extérieur & jaunes du côté intérieur; cette dernière couleur tire aussi un peu sur le verd vers le bout de la plume. Les tiges des douze plumes de la queue sont noirâtres en-dessus & blanchâtres en-dessous; & toutes les plumes latérales sont terminées de jaune pâle. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues de deux pouces que celle qui les suit immédiatement de chaque côté: toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de

chaque côté, qui est plus courte que les deux du milieu de trois pouces dix lignes. Les yeux sont entourés d'une peau nue & jaunâtre. La base du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue, de la même couleur, dans laquelle les narines sont placées. Le demi-bec supérieur est jaune, excepté le bout de son crochet qui est d'un cendré clair : le demi-bec inférieur est tout de cette dernière couleur. Les pieds sont d'un cendré-bleuâtre ; & les ongles gris. On la trouve aux *Indes Orientales* ; d'où elle a été envoyée à *M. l'Abbé Aubry*, qui la conserve dans son cabinet.

que binis intermediis trium pollicum & decem linearum longitudine cedentem. Oculos circumdat cutis nuda lutescens. Basim mandibulae superioris similiter ambit cutis nuda concolor, in qua nares sunt collocatae. Mandibula superior lutea, attamen in unci apice dilute cinerea : mandibula inferior penitus dilute cinerea. Pedes cinereo-coerulescentes ; ungues verò grisei. Habitat in *India Orientali*, unde missa in museum *D. Aubry*.

71. LA PERRUCHE DU JAPON.

Psittacus minor longicaudus, superne viridis, inferne ruber ; gutture ferrugineo, ad subrubrum vergente ; maculâ utrinque ante & ponè oculos coeruleâ ; remigibus intense coeruleis ; rectricibus intermediis viridibus, lateralibus rubris.
 *PSITTACA JAPONENSIS.*

Psittacus Erythrochlorus macrouros. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 678. hujus icon pessima pag. 681.

Jonst. Avi. pag. 23.

Psittacus Erythrochlorus macrouros Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 77.

Psittacus Erythrochlorus macrouros Japonicus Aldrovandi. Raj. Syn. Avi. pag. 34. N° 3.

Psittacus Erythrochlorus macrouros. Charlet. Exer. pag. 74. N° 11.

Charlet. Onomast. pag. 67. N° 11.

- Elle est à peu près de la grandeur & de la grosseur de la *Perruche ordinaire*. Sa queue est

Magnitudine & crassitie *Psittacam vulgarem* circiter æmulator. Cauda ipsius lon-

gillima est, ut quæ toto corpore longior. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, superioresque caudæ rectrices sunt virides. Pennæ scapulares cœruleæ. In utroque capitis latere binæ sunt maculæ cœruleæ, alia ante, altera ponè oculos posita. Guttur est ferrugineum, ad subrubrumquodammodo vergens. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores rubri sunt coloris, pennis in extremitatibus lineolis nigris per longitudinem ductis insignitis. Superiores alarum rectrices eodem imbuuntur viridi ac dorsum ipsum tingitur, scapisque donantur albis. Remiges binæ primores sunt virides: reliquæ omnes intense cœruleæ: omnes autem scapos habent albos. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermedix virides, scapis albis præditæ: laterales omnes rubræ, scapis nigris donatæ. Binæ rectrices intermedix reliquis omnibus duplò sunt longiores: laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque brevior. Oculorum pupilla nigra: ipsorum

très-longue; car elle surpasse la longueur de tout le corps. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont verts. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. Les plumes scapulaires sont bleues. De chaque côté de la tête sont deux taches de cette dernière couleur, placées l'une devant & l'autre derrière les yeux. La gorge est d'un ferrugineux tirant un peu sur le rougeâtre. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont rouges, toutes les plumes étant marquées à leur extrémité de petites lignes longitudinales noires. Les couvertures du dessus des ailes sont du même verd que le dos, & ont leur tige blanche. Les deux premières plumes de l'aile sont vertes: toutes les autres sont d'un gros bleu: la tige de chacune de ces plumes est blanche. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont vertes, & ont leur tige blanche: toutes les latérales sont rouges, ayant leur tige noire. Les deux plumes du milieu de la queue sont du double plus longues que les autres: toutes les latérales vont en diminuant de lon-

gueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. La prunelle des yeux est noire : & leur iris est rouge. Le bec est de cette dernière couleur. Les pieds & les ongles sont d'un beau noir. On la trouve au Japon.

irides rubræ. Rostrum rubrum. Pedes, unguisque nigerrimi. Habitat in Japonensi Regno.

** 72. LA PERRUCHE VARIÉE D'AMBOINE.

Psittacus minor longicaudus, superne viridis; capite anteriùs saturatè cœruleo; collo superiore torque luteo cincto; collo inferiore & pectore rubro-aurantiis, marginibus penarum saturatè cœruleis; ventre supremo saturatè viridi; imo ventre viridi-luteo, saturatè viridi maculato; restrictibus superne splendide, infernè sordide viridibus . . .
PSITTACA AMBOINENSIS VARIA.

Perruche à estomach rouge. *Edwards. Glanur. pag. 45. Chap. XXII; avec une assez bonne figure Pl. 232.*

Les Anglois l'appellent RED-BREASTED PARRAKEET. Edwards.

Elle est un peu plus grosse que la *Perruche ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces dix lignes. Son bec, qui a dix lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche neuf lignes de long; sa queue quatre pouces neuf lignes; son pied cinq lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes, l'intérieur sept lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes, & l'intérieur cinq lignes & demie. Elle a un pied cinq

Psittacam vulgarem paululum crassitie superat. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices explet, & ad extremos ungues septem pollices & decem lineas. Rostrum, quod decem lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda quatuor pollices cum novem lineis; pes quinque lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue undecim lineas, intimus septem cum semi lineas; posticorum exterior decem lineas, interior quin-

que cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & quinque pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad quartam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput anterius & guttur saturato tinguntur cœruleo. Reliquum caput, pars colli superior, dorsum, uropygium pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ tectrices sunt eleganter virides. Collum superius cingit rænia transversa lutea, torquem quodammodo efficiens. Partem colli inferiorem & pectus vestiunt pennæ elegantissimè rubro-aurantiæ, saturatè cœruleo marginatæ. Ventrem supremum & latera tingit color saturatè viridis. Venter imus, crura, inferioresque caudæ tectrices viridiluteo imbuuntur, & saturatè viridi maculantur. Tectrices alarum inferiores sunt rubræ. Alarum margines, versus articulum carpo humano respondentem, luteæ. Remiges superne virides, subtus fuscæ; majores tamen in lateris interioris medio superne & infernè luteæ; & minores (duabus tribusve

pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au quart de la longueur de la queue. La partie antérieure de la tête & la gorge sont d'un bleu foncé. Le reste de la tête, le dessus du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un beau verd. La partie supérieure du col est entourée d'une bande transversale jaune, qui forme une espece de collier. La partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes d'un très-beau rouge tirant sur l'orangé, bordées de bleu foncé. Le haut du ventre & les côtés sont d'un verd foncé. Le bas-ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd-jaune, tacheté de verd foncé. Les couvertures du dessous des ailes sont rouges. Le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, est jaune. Les plumes de l'aile sont vertes en-dessus & brunes en-dessous, les grandes cependant sont jaunes dessus & dessous dans le milieu de leur côté intérieur; & les moyennes (excepté les deux ou trois plus proches du corps) ont de même le milieu de leur côté intérieur rouge dessus & des-

lous. La queue est composée de douze plumes d'un verd brillant en-dessus, & d'un verd sale en-dessous. Les deux du milieu sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. La base du demi-bec supérieur est entourée d'une peau nue & jaunâtre, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est d'un blanc-jaunâtre. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On la trouve dans l'*Ile d'Amboine*, d'où elle a été envoyée à *M. le Comte de Bentinck*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

corpori vicinioribus exceptis) similiter in medio lateris interioris superne & infernè rubra. Cauda duodecim conflatur rectricibus superne splendide, internè fordidè viridibus. Binæ intermedia lateralium longitudinem multum excedunt; laterales verò gradatim longitudinem minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Basim mandibulæ superioris ambit cutis nuda lutescens, in qua nares sunt positæ. Rostrum ex albo flavicat. Pedes, unguesque nigricant. Habitat in *Amboinensi insula*, unde missa ad *D. Comitem de Bentinck*, qui *D. de Reaumur* dono dedit,

73. LA PERRUCHE VARIÉE DES INDES.

Psittacus minor longicaudus, viridis, marginibus pennarum in dorso & ad latera ventris luteis; capite superius & maculâ ad aures nigro-cœruleis; occipite, genis, gutture; collo inferiore & pectore coccineis, marginibus pennarum in pectore viridi-nigricantibus; taniâ utrinque longitudinali in collo luteâ; rectricibus superne viridibus, infernè rubris, apice viridi-flavicantibus . . . *PSITTACA INDICA VARIA*.

Avis Paradisiaca Orientalis, vario colore elegantissima. *Seb. Vol. I. pag. 95. hujus duæ icones mancæ Tab. LX. fig. 2 & 3.*

Avis Paradisi Orientalis. Klein. Avi. pag. 64.

Buteo. Moehr. Avi. Gen. 99.

Lory Perruche. Edwards. Tom. IV. pag. CLXXIV; avec une figure exacte Pl. 174.

Les Anglois l'appellent LORY-PARRAKEET. Edwards.

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo circiter pollices æquat, & ad extremos unguës sex pollices cum lineis binis. Rostrum, quod sex cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque sex lineas longum est; cauda tres pollices & quatuor lineas; pes quinque lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue decem lineas, intimus sex cum semi lineas; posticorum extimus novem lineas, intimus quinque lineas. Alæ complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinẽm pertingunt. Capitis superior pars est splendidissimè nigro-cœrulea. In occipitio tænia extat lunulata coccinea, cujus pars concava caput spectat, & binæ extremitates ad oculos usque protenduntur. In utroque capitis latere macula adest splendidissimè nigro-cœrulea, ponè oculos & supra aures posita; ponè quam maculam altera adhuc extat macula longitudinalis lutea. Caput ad latera, idque infra oculos, guttur, partem colli inferiorem & pectus vestiunt pennæ coccineæ, marginibus pennarum

Elle est un peu moins grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces deux lignes. Son bec, qui a six lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche six lignes de long; sa queue trois pouces quatre lignes; son pied cinq lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, dix lignes, l'intérieur six lignes & demie; l'extérieur de ceux de derriere neuf lignes, & l'intérieur cinq lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un noir-bleu très-éclatant. Sur l'occiput est une bande d'un rouge vif, en forme de croissant, dont la concavité est tournée vers la tête, & les deux pointes s'étendent jusqu'aux yeux. De chaque côté de la tête est une tache d'un noir-bleu très-brillant, placée derriere les yeux & sur les oreilles, derriere laquelle tache en est une autre longitudinale jaune. Les côtés de la tête au-dessous des yeux, la gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un rouge vif, chaque plume de la poitrine étant

bordée par le bout d'un verd-noirâtre. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, celles du dessus de la queue, le ventre, les jambes & les côtés sont verts. Il y a cependant de chaque côté une bande longitudinale jaune, qui sépare le rouge du col & de la poitrine d'avec le verd du dessus du col & des côtés. Les plumes qui couvrent le milieu du dos & les côtés du ventre, sont aussi bordées de jaune par le bout. L'aîle bâtarde est composée de plumes vertes, pareillement bordées de jaune. Toutes les plumes de l'aîle sont vertes, & quelques-unes des plus proches du corps sont aussi bordées de jaune. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd-jaunâtre clair. La queue est composée de douze plumes vertes en-dessus; mais en-dessous elles sont rouges, & terminées de verd-jaunâtre. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont entourés d'une peau nue & cendrée : leur prunelle est noire; & leur iris est d'un orangé-rougeâtre. La bête du demi-

in pectore ad apicem viridi-nigricantibus. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares; quæ alas superne cooperiunt, superiores caudæ tectrices, venter, latera & crura viridi colore tinguntur. Attamen utrinque extat tænia longitudinalis lutea, colli pectorisque rubrum inter & colli superioris laterumque viride posita. Pennæ medium dorsum & ventris latera vestientes sunt quoque ad apicem luteo fimbriatæ. Quæ alarum notham constituunt, sunt virides, similiter luteo marginatæ. Alarum remiges omnes virides, quarundam corpori viciniorum marginibus pariter luteis. Inferiores caudæ tectrices dilutè viridi-lutescentes. Caudam componunt duodecim rectrices superne virides, infernè verò rubræ, ad apicem viridi-flavican-tes. Binæ intermediae laterali-um longitudinem antecellunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque brevior. Oculos circumdat cutis nuda cinerea: ipsorum pupilla est nigra; irides verò aurantiorubescens. Basim mandibulæ

bulæ superioris pariter ambit cutis nuda fuscescens, in qua nares positæ sunt. Rostrum dilutè aurantium. Pedes, unguisque saturatè cinerei. Habitat in *India Orientali*.

bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & brunâtre; dans laquelle sont placées les narines. Le bec est d'un orangé clair. Les pieds & les ongles sont d'un cendré foncé. On la trouve aux *Indes Orientales*.

74. LA PERRUCHE JAUNE DU BRÉSIL.

Psittacus minor longicaudus, luteus; remigibus majoribus obscurè viridibus; rectricibus luteis . . . *PSITTACA BRASILIENSIS LUTEA*.

Qui Juba Tui. *Marcgr. Hist. Br. pag. 207.*

Jonst. Avi. pag. 142.

Willugh. Ornith. pag. 78.

Raj. Syn. Avi. pag. 35. N°. 9.

Gujaruba. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 556.*

Perroquet jaune. *Comdam. Voy. des Amazo. pag. 172.*

Les Brasiiliens l'appellent QUI JUBA TUI. *Marcgr. Jonst.*

Magnitudine & crassitie *Psittacæ vulgari* cedit. Caudâ autem longâ cum illa convenit. Per universum corpus pennis vestitur luteis. Tectrices alarum superiores & inferiores, sicut & remiges minores, concolores: majores verò remiges sunt obscurè virides. Caudam componunt duodecim rectrices luteæ, quarum binæ intermediæ lateralium longitudinem excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior.

Tome IV.

Elle est moins grande & moins grosse que la *Perruche ordinaire*. Elle lui ressemble cependant par la longueur de sa queue. Tout son corps est couvert de plumes jaunes. Les couvertures du dessus & du dessous des aîles, ainsi que les petites plumes de l'aîle, sont de la même couleur: les grandes plumes de l'aîle sont d'un verd obscur. La queue est composée de douze plumes jaunes. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la

A a a

plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont noirs. Le bec est gris. Les pieds & les ongles sont de couleur de chair. Elle se prive très-aisément. On la trouve au *Bresil*.

Oculi sunt nigri. Rostrum griseum. Pedes, unguisque incarnato colore imbuti. Facile & valdè mansuescit. Habitat in *Brasilia*.

75. LA PERRUCHE JAUNE DU MEXIQUE.

Psittacus minor longicaudus, dilutè luteus; capite dilutè rubro; collo rubro-aurantio; remigibus viridibus; rectricibus dilutè luteis *PSITTACA MEXICANA LUTEA*.

Avis Cocho, *Psittaci Mexicani species. Seb. Vol. I. pag. 101. hujus icon. satis accurata Tab. LXIV. fig. 4.*

Elle est à peu près de la grosseur de la *Perruche ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces huit lignes. Son bec, qui a huit lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche huit lignes de long; sa queue six pouces; son pied six lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes, l'intérieur sept lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière dix lignes, & l'intérieur cinq lignes & demie. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête est d'un rouge clair. Le col est d'un rouge-

Psittacam vulgarem crassitie circiter æmulatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem undecim circiter pollices æquat, & ad extremos ungues sex pollices & octo lineas. Rostrum, quod octo cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque octo lineas longum est; cauda sex pollices; pes sex lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue undecim lineas, intimus septem cum semi lineas; posticorum exterior decem lineas, interior quinque cum semi lineas. Alæ complicatæ tertiam circiter longitudinis caudæ partem attingunt. Caput habet dilutè rubrum;

collum ex rubro aurantium. Dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crura, rectricesque caudæ superiores & inferiores dilutè luteo colore tinguntur. Superiores alarum rectrices viridi, rubro & aurantio variegantur. Remiges sunt virides. Cauda duodecim conflatur rectricibus dilutè luteis. Binæ intermediæ lateralium longitudinem antecellunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Rostrum rubicundum. Habitat in *Mexico*.

orangé. Le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un jaune clair. Les couvertures du dessus des ailes sont variées de verd, de rouge & d'orangé. Les plumes de l'aile sont vertes. La queue est composée de douze plumes d'un jaune clair. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est rouge. On la trouve au *Mexique*.

76. LA PERRUCHE JAUNE D'ANGOLA.

Psittacus minor longicaudus, luteo-aurantius, superne viridilutescente varius; oculorum ambitu, lateribus, cruribusque rubris; rectricibus viridilutescentibus, tribus utrinque extimis exterioribus superne cœruleis PSITTACA ANGOLENSIS LUTEA.

Psittacus croceus, caudâ longâ, oculis in circulo rubro, extremis remigibus & pennâ infimâ caudæ cœruleis. Klein. Avi. pag. 25. N°. 15.

Psittacus luteus, caudâ longâ. Frisch. hujus icon non satis accurata Tab. 53.

Petit Perroquet d'Angola. Alb. Tom. III. pag. 6; avec une figure mal coloriée Pl. 13.

Les Allemands l'appellent LANGSCHWANTZIGER GELBER PAPEGEY. Frisch. Les Anglois, PARROQUEET FROM ANGOLA. Alb.

Cum *Turtura* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad cau-

Elle est à peu près de la longueur d'une *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec

jusqu'à celui de la queue est d'environ onze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces cinq lignes. Son bec, qui a onze lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche dix lignes de long; sa queue cinq pouces neuf lignes; son pied six lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, douze lignes & demie, l'intérieur huit lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière onze lignes, & l'intérieur six lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un jaune-orangé. Le dos, les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur, & variées de taches d'un verd-jaunâtre. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont de cette dernière couleur. Le tour des yeux, les côtés & les jambes sont rouges. Les grandes couvertures du dessus des aîles les plus proches du corps sont d'un verd-jaunâtre, & terminées de jaune-orangé : les plus éloignées du corps sont bleues. Les grandes plumes de l'aîle sont

dam extremam undecim pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices & quinque lineas. Rostrum, quod undecim lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque decem lineas longum est; cauda quinque pollices & novem lineas; pes sex lineas; digitorum anticorum exterior cum ungue duodecim cum semi lineas, interior octo cum semi lineas; posticorum extimus undecim lineas, intimus sex lineas. Alæ complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Caput; guttur, collum, pectus, venter, inferioresque caudæ rectrices coloris sunt luteo-aurantii. Dorsum, pennæ scapulares & superiores alarum rectrices minores eodem imbuuntur colore, easque variègant maculæ viridi-lutescentes. Uropygium, superioresque caudæ rectrices ex viridi quoque lutescunt. Oculorum ambitum, latera & crura vestiunt pennæ rubræ. Rectrices alarum superiores majores corpori finitimæ sunt viridi-lutescentes, ad apicem luteo-aurantiæ : à corpore remotiores cœruleæ. Remiges majores eodem cœruleæ

Imbutæ, sed superne & in latere exteriori tantum, in latere vero interiori viridilutescentes: minores ex viridi similiter lutescunt. Duodecim rectricibus cauda constat: sex intermediae sunt viridilutescentes: tres utrinque extremae concolores, at tamen in latere exteriori, idque superne tantum, cœruleæ. Binæ rectrices intermediae lateralium longitudinem superant; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Oculos circumdat cutis nuda dilutè cinerea: ipsorum pupilla est nigra; irides verò obscurè luteæ. Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda cinerea, in qua nares sunt collocatæ. Rostrum cinereo-virescens. Pedes, unguesque rubescentes. Habitat in *Angolensi* Regno.

pareillement bleues, mais en-dessus & du côté extérieur seulement; leur côté intérieur est d'un verd-jaunâtre: les moyennes sont de cette dernière couleur. La queue est composée de douze plumes: les six du milieu sont d'un verd-jaunâtre: les trois plus extérieures de chaque côté sont de la même couleur, excepté leur côté extérieur, qui est bleu, mais en-dessus seulement. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont entourés d'une peau nue, d'un cendré clair: leur prunelle est noire; & leur iris d'un jaune obscur. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & cendrée dans laquelle sont placées les narines. Le bec est d'un cendré-verdâtre. Les pieds & les ongles sont rougeâtres. On la trouve dans le Royaume d'*Angola*.

** 77. LA PERRUCHE ROUGE DE BORNEO.

Psittacus minor longicaudus, coccineus; collo inferiore & pectore dilutiùs coccineis, marginibus pennarum luteis; remigibus apice viridibus, tribus corpori finitimis cœruleis; rectricibus sordidè rubris, superne apice viridescentibus, utrinque extremâ superne viridescente PSITTACA COCCINEA BONARUM FORTUNARUM INSULÆ.

Lory écarlate à longue queue. *Edwards. Tom. IV. pag. CLXXIII ;*
avec une figure exacte Pl. 173.

Les Anglois l'appellent LONG-TAILED SCARLET LORY. Edwards.

Elle est un peu plus grosse que la *Perruche ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces trois lignes. Son bec, qui a huit lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche sept lignes de long ; sa queue quatre pouces ; son pied cinq lignes & demie ; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes, l'intérieur sept lignes ; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes & demie, & l'intérieur cinq lignes & demie. Elle a treize pouces neuf lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue, le ventre, les jambes & les côtés sont d'un rouge vif. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes d'un rouge plus clair, & bordées de jaune. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un rouge sale,

Crassitie Psittacam vulgarem paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & tres lineas. Rostrum, quod octo lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque septem lineas longum est ; cauda quatuor pollices ; pes quinque cum semi lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue undecim lineas, intimus septem lineas ; posteriorum exterior novem cum semi lineas, interior quinque cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est tredecim pollicum & novem linearum ; alæ verò complicatæ tertiam circiter longitudinis caudæ partem attingunt. Caput, partem colli superiorem, dorsum, uropygium, pennas scapulares, superiores caudæ rectrices, ventrem, latera & crura tingit color coccineus. Guttur, partem colli inferiorem & pectus vestiunt pennæ coccineo dilutior tinctæ,

Iuteo marginatæ. Quæ caudam subtus obtegunt, sunt sordidè rubræ, elegantissimo cœruleo fimbriatæ. *Tectrices alarum inferiores pallidè rubræ, marginibus fuscescentibus præditæ. Superiores minimæ, istæ scilicet quæ alarum articulum carpo humano respondentem cooperiunt, virides: mediæ coccineæ: majores concolores, attamen apice virides; ex istis autem ultimis corpori finitima cœrulea. Remiges omnes rubræ, apice virides, exceptis tamen tribus corpori vicinioribus elegantissimè cœruleis. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum decem intermediæ sordidè rubræ, attamen apice superne viridescentes: utrinque extrema superne viridescens, subtus sordidè rubra. Duodecim rectrices in acumen desinunt. Binæ intermediæ lateralium longitudinem excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis unius pollicis & sex linearum longitudine cedentem. Oculos circumdat cutis nuda fuscescens. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda concolor, in*

bordées d'un fort beau bleu. Celles du dessous des ailes sont d'un rouge pâle, & bordées de brunâtre. Les plus petites du dessus, sçavoir celles qui couvrent le pli de l'aîle qui répond à celui du poignet, sont vertes: les moyennes sont d'un rouge vif: les grandes sont de la même couleur, mais terminées de verd; cependant de ces dernières la plus proche du corps est bleue. Toutes les plumes de l'aîle sont rouges, & terminées de verd; il faut cependant en excepter les trois plus proches du corps, qui sont d'un très-beau bleu. La queue est composée de douze plumes: les dix du milieu sont d'un rouge sale, excepté leur bout, qui est verdâtre en-dessus seulement: la plus extérieure de chaque côté est verdâtre en-dessus & d'un rouge sale en-dessous. Ces douze plumes se terminent en pointe. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte d'un pouce fix lignes que les deux du milieu. Les yeux sont entourés d'une peau nue & brunâtre. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue, de la même couleur, dans laquelle

sont placées les narines. Le bec est orangé. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On la trouve dans l'Isle de Borneo aux Indes Orientales, d'où elle a été envoyée à M. le Comte de Ben-
tinck, qui en a fait présent à M. de Reaumur.

qua nares positæ sunt. Rostrum aurantium. Pedes, unguesque nigricantes. Habitat in Bonarum Fortunarum Insula in India Orientali, unde missa ad D. Comitem de Ben-
tinck, qui D. de Reaumur dono dedit.

** 78. LA PERRUCHE ROUGE DES INDES.

Voyez Pl. XXV. Fig. 2.

Psittacus minor longicaudus, coccineus, superne saturatius, infernè dilutius, fusco & cœruleo-violaceo variegatus; capite & collo superioribus, pectore & taniâ ponè oculos cœruleo-violaceis; remigibus majoribus dilutè fusco, minoribus fusco-violaceo terminatis; rectricibus fusco-violaceis, lateralibus interiùs coccineis.... PSITTACA INDICA COCCINEA.

Elle est beaucoup plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec, qui a neuf lignes d'épaisseur, a aussi depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche neuf lignes de long; sa queue quatre pouces neuf lignes; son pied dix lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'intérieur neuf lignes; l'extérieur de ceux de derrière onze lignes, & l'intérieur six

Præcedentem crassitie multum superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices. Rostrum; quod novem lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque novem similiter lineas longum est; cauda quatuor pollices cum novem lineis; pes decem lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue undecim cum semi lineas, intimus novem lineas; postico-
rum

rum extimus undecim lineas, intimus sex cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum sexdecim pollicum & octo linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ non-nihil ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Synciput, caput posterius & ad latera, sicut & guttur, sunt coccinea. Capitis superior pars, collum superius & pectus ex cœruleo ad violaceum vergunt. In utroque capitis latere tania extat similiter cœruleo-violacea, à majore oculi cantho orta, & cœruleo-violaceum colorem in collo superiore pertingens. Pars colli inferior pallidè rubet, & paucò fusco, sicut & paucò violaceo, variegatur. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ sunt fuscæ, paucò rubro variegatæ. Dorsum infimum, uropygium, superioresque caudæ rectrices saturatè rubræ. Venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores rubro, fusco & cœruleo-violaceo variegantur. Pennæ alas subtus obtegentes sunt coccineæ. Superiores alarum rectrices rubro & fusco variæ. Tres primores remiges in latere exte-

lignes & demie. Elle a seize pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Le synciput, le derriere & les côtés de la tête, & la gorge sont d'un rouge vif. La partie supérieure de la tête, le dessus du col & la poitrine sont d'un bleu tirant sur le violet. De chaque côté de la tête est une bande de la même couleur, qui part du grand angle de l'œil, & va joindre le bleu-violet du dessus du col. La partie inférieure du col est d'un rouge pâle, varié d'un peu de brun & d'un peu de violet. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un brun varié d'un peu de rouge. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un rouge foncé. Le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont variés de rouge, de brun & de bleu-violet. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un rouge vif. Celles du dessus sont variées de rouge & de brun. Les trois premières plumes de l'aîle sont d'un brun-jaunâtre du côté extérieur & à leur bout; leur côté intérieur est rouge: toutes les autres sont de cette dernière

couleur ; mais les grandes sont terminées de brun clair , & les moyennes de brun tirant sur le violet. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un brun tirant sur le violet : toutes les latérales sont de la même couleur du côté extérieur , & d'un rouge vif du côté intérieur. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte. Le bec est rougeâtre. Les pieds & les ongles sont bruns. On la trouve aux *Indes Orientales* , d'où elle a été envoyée à *M. l'Abbé Aubry* , qui la conserve dans son cabinet.

riore & apice fusco-lutescentes , in latere interiore rubræ : reliquæ omnes in utroque latere rubent ; majores tamen dilutè fusco , minores verò fusco-violaceo terminantur. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ fusco-violaceæ : laterales omnes exteriùs concolores , interiùs coccineæ. Dux rectrices intermediæ lateralium longitudinem antecellunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Rostrum rubescit. Pedes , unguesque fusci sunt. Habitat in *India Orientali* , unde missa in *musæum D. Aubry*.

** 79. LA PERRUCHE ROUGE D'AMBOINE.

Voyez Pl. XXVIII. Fig. 2.

Psittacus minor, longicaudus, superne cœruleo-violaceus, infernè coccineus; capite & collo coccineis; remigibus exteriùs saturatè viridibus, interiùs & subtus nigricantibus; rectricibus saturatè violaceis, lateralibus interiùs & subtus nigricantibus; duabus utrinque extimis interiùs rubro marginatis *PSITTACA AMBOINENSIS COCCINEA.*

Elle est un peu plus grosse qu'une *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze

Crassitie Turturem nonnihil antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim

pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices & decem lineas. Rostrum, quod decem lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos novem cum semi lineas longum est; cauda novem pollices cum sex lineis; pes septem cum semi lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue undecim cum semi lineas, intimus septem lineas; posticorum extimus novem lineas, intimus quinque lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crura, tectricesque caudæ inferiores minores splendido imbuuntur coccinæo. Inferiores caudæ tectrices majores sunt in medio saturatè violacæ, & in tota circumferentia rubro marginatæ. Dorsum, uropygium, pennæ caudam superne cooperientes, tectrices alarum inferiores minores, alarumque margines, versùs articulum carpo humano respondentem, sunt splendidè cœ-

pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces dix lignes. Son bec, qui a dix lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche neuf lignes & demie de long; sa queue neuf pouces six lignes; son pied sept lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'intérieur sept lignes; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes, & l'intérieur cinq lignes. Elle a un pied dix pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les petites couvertures du dessous de la queue sont d'un rouge vif & éclatant. Les grandes couvertures du dessous de la queue sont d'un violet foncé dans leur milieu, & bordées de rouge dans toute leur circonférence. Le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, les petites du dessous des aîles & le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, sont d'un bleu-violet éclatant. Les grandes couvertures du dessous des aîles sont noirâtres. Les plus petites du dessus sont de la même couleur que le dos :

toutes les autres , ainsi que les plumes scapulaires , sont d'un verd foncé. Les plumes de l'aîle sont noirâtres en-dessous ; mais en-dessus les grandes sont d'un verd foncé du côté extérieur , & noirâtres du côté intérieur : les moyennes sont de ce même verd foncé du côté extérieur & à leur bout , & leur côté intérieur est noirâtre. La queue est composée de douze plumes noirâtres en-dessous ; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un violet foncé : toutes les latérales sont de la même couleur du côté extérieur , & leur côté intérieur est noirâtre : les deux plus extérieures de chaque côté sont de plus bordées intérieurement de rouge. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est plus courte de quatre pouces que les deux du milieu. Le bec est rouge , excepté son crochet , qui est noirâtre. Les pieds & les ongles sont rouges. On la trouve dans l'*Isle d'Amboine* , d'où elle a été envoyée à *M. le Comte de Bentinck* , qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

ruleo - violaceæ. Tectrices alarum inferiores majores nigricantes. Superiores minima dorso concolores : reliquæ omnes , sicut & scapulares pennæ , saturatè virides. Remiges subtus nigricantes ; superne verò majores in latere exteriori saturatè virides , in interiori nigricantes : minores exteriori & apice eodem viridi saturato tinctæ , interiori verò similiter nigricantes. Caudam componunt duodecim rectrices subtus nigricantes ; superne verò binæ intermediæ sunt saturatè violaceæ : laterales omnes in latere exteriori concolores , in interiori nigricantes : duæ utrinque extimæ rubro insuper interiori marginantur. Binæ rectrices intermediæ lateraliū longitudinem excedunt , laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis quatuor pollicum longitudine cedentem. Rostrum rubicundum , excepto unco nigricante. Pedes , unguesque rubri. Habitat in *Amboinensi* ; *Insula* , unde missa ad *D. Comitem de Bentinck* , qui *D. de Reaumur* dono dedit.

80. LA PERRUCHE ROUGE HUPÉE DE JAVA.

Psittacus minor longicaudus, cristatus, coccineus; gutture griseo; collo inferiore & pectore dilutè roseis; remigibus viridibus, luteo & roseo colore variis; rectricibus binis intermediis coccineis, lateralibus dilutè roseis, apice cœruleis, viridi mixtis *PSITTACA JAVENSIS CRISTATA COCCINEA.*

Psittacus parvus. Bont. Ind. Ori. pag. 63, in qua hujus icon minùs accurata.

Psittacus parvus Bontii. Willugh. Ornith. pag. 81.

Raj. Syn. Avi. pag. 34. N^o. 5.

Crassitie *Alaudam* æmulator. Caudam habet longissimam, decem circiter pollices ultra alarum complicatarum extremitates prominentem. Caput, collum, dorsum, uropygium, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ coccineæ. Tectrices caudæ superiores & inferiores eodem imbuuntur colore. Guttur griseum est. Collum inferius & pectus dilutè rosei sunt coloris. Pennæ scapulares & superiores alarum tectrices sunt virides, rubicundis intertextis pennis, quarum medietas luteo & roseo colore hinc inde variegatur. Remiges iidem colores variegant. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediae coccineæ : laterales

Elle est de la grosseur d'une *Alouette*. Sa queue est extrêmement longue; car elle passe d'environ dix pouces l'extrémité des aîles, lorsqu'elles sont pliées. La tête, le col, le dos, le croupion, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un rouge vif. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. La gorge est grise. La partie inférieure du col & la poitrine sont de couleur de rose pâle. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont vertes, & mêlées de plumes rouges, dont une moitié est variée çà & là de jaune & de couleur de rose. Les plumes de l'aîle sont variées des mêmes couleurs. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un rouge

vif : toutes les latérales font de couleur de rose pâle , & terminées de bleu mêlé de verd. Les deux plumes du milieu de la queue font beaucoup plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte. Cet Oiseau relève les plumes du sommet de sa tête en forme de hupe. Les yeux font noirs , & entourés d'une peau nue , d'un blanc-argenté. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & blanche , dans laquelle sont placées les narines. Le bec est gris. Les pieds & les ongles font cendrés. On la trouve dans l'Isle de Java.

omnes dilute roseæ , apice tamen cœruleæ , viridi mixtæ. Binæ rectrices intermedia lateralium longitudinem multum excedunt ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Verticis pennas , cristæ in modum , erigit hæc Avis. Oculi sunt nigri ; eosque circumdat cutis nuda albo - argentea. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda candida , in qua nares sunt positæ. Rostrum griseum est. Pedes , unguesque cinerei. Habitat in *Java Insula*.

SI. LA PETITE PERRUCHE DU BRÉSIL.

Psittacus minor brevicaudus , in toto corpore viridis , superne saturatiùs , infernè dilutiùs *PSITTACULA BRASILIENSIS*.

Psittacus minimus totus viridis. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 473.*
Psittaci minoris Marcgravii tertia species , *Tui tirica*. *Willugh. Ornith. pag. 78.*

Tui tirica , tertia species. *Marcgr. Hist. Br. pag. 206.*
Jonst. Avi. pag. 141.

Tui tirica. *Raj. Syn. Avi. pag. 34. N°. 3.*

Tuin. Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 556.

Les Anglois l'appellent GREEN PARROKET. Browne.

Les Brésiliens , TUI TIRICA. Marcgr. Jonst.

Elle est un peu plus grande & plus grosse que la petite Perruche Magnitudine & crassitie
Psittaculam Guineensem pau-

Iulū antecellit. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Per univēsum corpus pennis vestitur viridibus; color autem viridis in corpore superiore paulò est saturatior, in inferiore dilutior. Superiores alarum rectrices, sicut & remiges, dorso concolores. Caudam componunt duodecim rectrices similiter virides, superne quidem saturatius, infernè dilutius. Oculi sunt nigri. Rostrum incarnati coloris. Pedes, unguesque cœrulescentes. Habitat in *Brasilia* & *Jamaica*.

de Guinée. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes vertes; cette couleur est un peu plus foncée dans la partie supérieure du corps, & un peu plus claire dans l'inférieure. Les couvertures du dessus des aîles, ainsi que les plumes de l'aîle, sont de la même couleur que le dos. La queue est composée de douze plumes, qui sont pareillement d'un verd plus foncé en-dessus & plus clair en-dessous. Les yeux sont noirs. Le bec est de couleur de chair. Les pieds & les ongles sont bleuâtres. On la trouve au *Brésil* & à la *Jamaïque*.

82. LA PETITE PERRUCHE A TESTE ROUGE DU BRÉSIL.

Psittacus minor brevicaudus, dilutè viridis; syncipite rubro; maculâ in alis luteâ; rectricibus dilutè viridibus . . .
PSITTACULA BRASILIENSIS ERYTHROCEPHALOS.

Psittaci minoris Marcgravii septima species; Tui para Tupinambis.
Willugh. Ornith. pag. 78.

Tui para Tupinambis, septima species. Marcgr. Hist. Br. pag. 206.
Jonst. Avi. pag. 141.

Tui para Tupinambis. Raj. Syn. Avi. pag. 35. N° 7.

Les Brasiliens Toupinambous l'appellent TUI PARA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Magnitudine & crassitie cum *Alauda* convenit. Cauda ipsius valdè brevis est, &

Elle est de la grandeur & de la grosseur d'une *Alouette*. Sa queue est extrêmement cour-

te, & ne s'étend pas plus loin que ses aîles, lorsqu'elles sont pliées. Sur le synciput est une tache rouge en forme de croissant. Tout le reste de son corps est couvert de plumes d'un verd clair. Les scapulaires & les ouvertures du dessus des aîles sont de la même couleur; il y a cependant une tache jaune au milieu de chaque aîle. Les plumes de l'aîle sont aussi d'un verd clair. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que le corps. Le bec est de couleur de chair. Les pieds & les ongles sont gris. Elle fait son nid dans des trous d'arbres abandonnés par les *Fourmis*. On la trouve au *Brésil*.

alae complicatas non excedit. In syncipite macula extat semilunaris rubra. In toto reliquo corpore pennis vestitur dilutè viridibus. Pennae scapulares & superiores alarum tectrices concolores; exceptâ tamen maculâ in cujuslibet alae medio luteâ. Remiges sunt quoque dilutè virides. Cauda duodecim consistat rectricibus eodem imbutis colore ac corpus ipsum tingitur. Rostrum incarnatum. Pedes, unguesque grisei. Nidificat in arborum foraminibus à *Formicis* relictis. Habitat in *Brasília*.

83. LA PETITE PERRUCHE A CUL BLEU DU BRÉSIL:

Psittacus minor brevicaudus; viridis; uropygio cyaneo; tectricibus alarum superioribus majoribus saturatè cœruleis; rectricibus viridibus.... *PSITTACULA BRASILIENSIS UROPYGIO CYANEO*.

Psittaci minoris Marcgravii sexta species, Tuiete. *Willugh. Ornith. pag. 78.*

Tuiete sexta species. *Marcgr. Hist. Br. pag. 206.*

Jonst. Avi. pag. 141.

Tuiete. *Raj. Syn. Avi. pag. 34. N°. 6.*

Plus petite des Perruches, verte & bleue. *Edwards. Glanur. pag. 51.*

Chap. XXV; avec une figure exacte Pl. 235.

Les Anglois l'appellent LEAST GREEN AND BLUE PARRAKEET. *Edwards.*

Les Brasiiliens, TUIETE. *Marcgr. Jonst.*

Elle n'est pas plus grosse qu'un *Moineau franc*. Sa longueur *Craffitie Passerem domesticum non excedit. Ipsius longitudo*

gitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor circiter pollices æquat, & ad extremos ungues tres pollices & decem lineas. Rostrum, quatuor cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque quatuor lineas longum est; cauda unum pollicem; pes tres lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue sex lineas, intimus quatuor lineas; posticorum extimus quinque lineas, intimus tres lineas. Alæ complicatæ duas circiter tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Caput, guttur, collum, dorsum, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ tectrices eleganti imbuuntur viridi. Uropygium & tectrices caudæ superiores cyaneus tingit color. Pennæ alas subtus obtegentes sunt cinereo-viridescentes, quibusdam tamen plumulis cyaneis in marginibus alarum, versùs articulum carpo humano respondentem, intertextis. Tectrices alarum superiores minores eodem imbuuntur viridi ac dorsum ipsum tingitur: majores elegantissimo saturato tinguntur cœruleo. Remiges sunt superne viri-

Tom. IV.

gueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quatre pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pouces dix lignes. Son bec, qui a quatre lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche quatre lignes de long; sa queue un pouce; son pied trois lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, six lignes; l'intérieur quatre lignes; l'extérieur de ceux de derrière cinq lignes, & l'intérieur trois lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau verd. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un beau bleu. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un cendré-verdâtre; mais il y a quelques petites plumes d'un beau bleu mêlées sur le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet. Les petites couvertures du dessus des aîles sont du même verd que le dos: les grandes sont d'un très-beau bleu foncé. Les plumes de l'aîle sont vertes en-dessus, d'un cendré-verdâtre

Ccc

en-dessous, & leur bord extérieur est d'un verd-jaunâtre clair. La queue est composée de douze plumes d'un verd éclatant en-dessus, & d'un verd moins vif en-dessous. Les yeux sont entourés d'une peau nue & orangée. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue de la même couleur, dans laquelle sont placées les narines. Le bec, les pieds & les ongles sont orangés. On la trouve au *Bresil*.

des, infernè cinereo-viridescentes, exteriùs dilutè viridi-lutescente marginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices superne splendidiùs, subtus non ita splendide virides. Oculos circumdat cutis nuda aurantia. Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda concolor, in qua nares sunt positæ. Rostrum, pedes, unguisque aurantio colore tincti. Habitat in *Brasilia*.

84. LA PETITE PERRUCHE DE MALACA.

Psittacus minor brevicaudus, viridis; vertice cyaneo; rectricibus caudæ superioribus coccineis; rectricibus viridibus.
 *PSITTACULA MALACCENSIS.*

Avicula ex Malaca Insula, seu Psittacus marinus. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 560, in qua hujus icon non satis accurata.

Parmi les *petites Perruches* celle-ci est une des moins grosses. Le sommet de sa tête est d'un beau bleu. Le reste de la tête, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, les jambes & les côtés sont verts. Les plumes de l'aile sont de la même couleur. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un

Inter *Psittaculas* hæc est ex minimis una. Capitis vertex cyaneo colore tingitur. Reliquum caput, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, rectrices alarum superiores & inferiores, pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices, sicut & remiges, sunt virides. Rectrices caudæ superiores coccineæ. Caudam componunt duodecim rectrices eodem imbutæ vi-

ridi ac corpus ipsum tingitur. Rostrum, pedes, unguesque candicans. Habitat in *Malaca*, *Indiæ* peninsula. rouge vif. La queue est composée de douze plumes du même verd que celui du corps. Le bec, les pieds & les ongles sont blancs. On la trouve à *Malaca*, presqu'Île de l'*Inde*.

** 85. LA PETITE PERRUCHE DE GUINÉE.

Psittacus minor brevicaudus, viridis, superne saturatius, infernè dilutius; capite anteriori & guttore rubris; uropygio cyaneo; rectricibus viridibus, lateralibus tæniis transversis, aliâ coccineâ, alterâ nigrâ notatis . . . *PSITTACULA GUINEENSIS*.

Psittacus viridis minimus fronte & gulâ rubris. *Klein. Avi. pag. 25. N°. 21.*

Psittacus minimus viridis cum fronte & gula rubra. Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 54.

Psittacus minimus. Clus. Exot. Auâuar. pag. 365, in qua hujus icon non satis accurata.

Euf. Nieremb. pag. 226, in qua hujus icon à Clusio mutuata.

Psittacus pusillus viridis Æthiopicus Clusii. Raj. Syn. Avi. pag. 31. N°. 10.

Psittacus minor Americanus, versicolor. Seb. Vol. II. pag. 40. hujus icon non satis accurata. Tab. XL. fig. 1.

Petite Perruche à tête rouge, ou Moineau de Guinée. *Edwards. Glanur. pag. 54. Chap. XXVII; avec une figure exacte Pl. 237.*

Petit Perroquet verd des Indes Orientales. *Alb. Tom. III. pag. 7; avec une figure mal coloriée Pl. 15.*

Les Anglois l'appellent *LITTLE RED-HEADED PARRAKEET*, ou *GUINEY SPARROW. Edwards.*

Alaudam crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues quinque pollices & tres lineas. Rostrum, quod sex lineas cras-

Elle est à peu près de la grosseur d'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces trois lignes. Son bec, qui a six lignes d'épaisseur, a

depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche cinq lignes & demie de long ; sa queue un pouce six lignes ; son pied quatre lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , huit lignes , l'intérieur cinq lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière six lignes & demie , & l'intérieur quatre lignes. Elle a dix pouces trois lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La partie antérieure de la tête & la gorge sont rouges. Le reste de la tête , la partie supérieure du col , le dos , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un beau verd. La partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd un peu plus clair. Le croupion est d'un beau bleu. Le bord de l'aîle , vers le pli qui répond à celui du poignet , est de la même couleur. Les petites couvertures du dessous des aîles sont noires : les grandes sont d'un cendré foncé. Les grandes plumes de l'aîle sont en-dessus vertes du côté extérieur & à leur bout , d'un cendré foncé du côté intérieur , &

sum , ab ipsius unco ad oris angulos quinque cum semi lineas longum est ; cauda octodecim lineas ; pes quatuor lineas ; digitorum anteriorum exterior cum ungue octo lineas , interior quinque cum semi lineas ; posticorum extimus sex cum semi lineas , intimus quatuor lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem pollicum & trium linearum ; alæ vero complicatae ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput anterius & guttur rubri sunt coloris. Reliquum caput , partem colli superiorem , dorsum , pennas scapulares , alas superne vestientes , superioresque caudæ rectrices tingit color eleganter viridis. Pars colli inferior , pectus , venter , latera , crura & inferiores caudæ rectrices viridi imbuuntur nonnihil dilutiore. Uropygium cyaneum. Alarum margines , versus articulum carpo humano respondentem , concolores. Rectrices alarum inferiores minores nigrae : majores saturate cinerea. Remiges majores superne in latere exteriori & apice virides , in la-

tere interiore saturatè cinerea, infernè verò in utroque latere saturatè cinereo tincta : minores superne virides, subtus saturatè cinerea. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ virides : laterales omnes eodem colore imbutæ ; attamen ex istis quælibet versùs mediam longitudinem latiusculâ taniâ transversâ coccineâ, & deinde alterâ taniâ similiter transversâ, sed nigrâ & strictiore, notatur. Oculos circumdat cutis nuda cinerea : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò cœrulescentes. Basim mandibulæ superioris pariter ambit cutis nuda cinerea, in qua nares sunt positæ. Rostrum rubro imbitur colore ; qui color, versùs unci apicem procedendo, fit nonnihil dilutior. Pedes, unguesque sunt grisei.

Fœmina à mare discrepat capite anteriore rubro non ita vivido tincto, & marginibus alarum luteis.

Habitat in Guinea. Ex museo Realmuriano,

en-dessous elles sont des deux côtés de cette dernière couleur : les moyennes sont vertes en-dessus & d'un cendré foncé en-dessous. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont vertes ; toutes les latérales sont de la même couleur, mais chacune d'elles est marquée vers la moitié de sa longueur d'une assez large bande transversale d'un rouge vif, & ensuite d'une autre bande aussi transversale noire & plus étroite. Les yeux sont entourés d'une peau nue & cendrée : leur prunelle est noire ; & leur iris est bleuâtre. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & cendrée, dans laquelle sont placées les narines. Le bec est rouge ; cette couleur s'éclaircit un peu vers le bout du crochet. Les pieds & les ongles sont gris.

La femelle diffère du mâle en ce que le rouge du devant de sa tête est moins vif, & qu'elle a le bord de l'aile jaune.

On les trouve en Guinée. Du cabinet de M. de Reaumur.

86. LA PETITE PERRUCHE DES INDES.

Psittacus minor brevicaudus, viridis, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; capite superiùs, dorso infimo & uropygio rubris; rectricibus superne viridibus, infernè cœruleo-beryllinis *PSITTACULA INDICA*.

Perroquet Indien verd & rouge, de la plus petite espece. *Edwards. Tom. 1. pag. VI; avec une figure exacte Pl. 6.*

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces huit lignes. Son bec, qui a quatre lignes & demie d'épaisseur, a aussi depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche quatre lignes & demie de long; sa queue dix-huit lignes; son pied quatre lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, sept lignes & demie, l'intérieur cinq lignes; l'extérieur de ceux de derrière six lignes & demie, & l'intérieur quatre lignes & demie. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est rouge: cette couleur s'affoiblit peu à peu en approchant de l'occiput. Le dessus du col, la partie supérieure du dos, les plumes scapulaires & les cou-

Præcedentipaululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque circiter pollices æquat, & ad extremos ungues quatuor pollices & octo lineas. Rostrum, quatuor cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos quatuor cum semi lineas pariter longum est; cauda unum pollicem & sex lineas; pes quatuor cum semi lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue septem cum semi lineas, intimus quinque lineas; posteriorum exterior sex cum semi lineas, interior quatuor cum semi lineas. Alæ complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput superius colore imbuatur rubro: qui color, versùs occipitium procedendo, sensim atque sensim evanescit. Pars colli superior, sicut & dorsi supre-

ma, pennæ scapulares & superiores alarum teñtrices sunt eleganter virides. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam subtus obtegentes, alarumque teñtrices inferiores minores viridi dilutior tinguntur. Dorsum infimum, uropygium & pennæ caudam superne cooperientes sunt rubræ. Teñtrices alarum inferiores majores viridi-cœruleæ. Remiges majores superne in latere exteriori saturatè virides, in interiori nigricantes, subtus verò exteriùs saturatè cineræ, interiùs cœruleo-beryllinæ: minores superne eleganter virides, infernè cœruleo-beryllinæ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores. Oculos circumdat cutis nuda dilutè carneo colore imbuta. Rostrum rubro-aurantium. Pedes, unguesque incarnati coloris. Habitat in *India Orientali*.

vertures du dessus des ailes sont d'un beau verd. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessous des ailes sont d'un verd plus clair. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont rouges. Les grandes couvertures du dessous des ailes sont d'un verd-bleu. Les grandes plumes de l'aile sont en-dessus d'un verd foncé du côté extérieur, noirâtres du côté intérieur; & en-dessous elles sont d'un cendré foncé du côté extérieur, & d'un bleu d'Aigue-marine du côté intérieur: les moyennes sont d'un beau verd en-dessus, & d'un bleu d'Aigue-marine en-dessous. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aile. Les yeux sont entourés d'une peau nue, d'un couleur de chair clair. Le bec est d'un rouge-orangé. Les pieds & les ongles sont de couleur de chair. On la trouve aux *Indes Orientales*.

** 87. LA PETITE PERRUCHE DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XXX. Fig. 1.

Psittacus minor brevicaudus, viridis, infernè ad luteum vergens; (syncipite, gutture, collo inferiore & uropygio rubris; taniâ transversâ infra occipitium aurantio-rubrà, *mas*); (syncipite & uropygio rubris; maculâ utrinque rostrum inter & oculum viridi-cœruleâ, *fœmina*); rectricibus superne viridibus, infernè cœruleo-beryllinis *PSITTACULA PHILIPPENSIS*.

On l'appelle aux Philippines, COULACISSI.

Elle n'est guères plus grosse qu'un *Moineau franc*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces neuf lignes. Son bec, qui a cinq lignes d'épaisseur, a aussi depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche cinq lignes de long; sa queue un pouce six lignes; son pied cinq lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, sept lignes & demie, l'intérieur cinq lignes; l'extérieur de ceux de derrière six lignes & demie, & l'intérieur quatre lignes & demie. Elle a huit pouces neuf lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le synciput, la gorge & la partie inférieure du

Craffitie Passerem domesticum non multum antecellit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem quinque pollices æquat, & ad extremos ungues quatuor pollices & novem lineas. Rostrum, quinque lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos quinque pariter lineas longum est; cauda unum pollicem & sex lineas; pes quinque lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue septem cum semi lineas, intimus quinque lineas; posticorum extimus sex cum semi lineas, intimus quatuor cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum octo pollicum & novem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam circiter longitudinem

nem caudæ pertingunt. Syn-
ciput, guttur & partem colli
inferiorem tingit color ruber.
Caput ex viridi ad luteum in-
clinat. Infra occipitium stric-
ta extat tania transversa au-
rantio-rubra. Collum supe-
rius & ad latera, dorsum,
pennæ scapulares & superio-
res alarum tectrices sunt vi-
rides. Uropygium & pennæ
caudam superne cooperien-
tes rubræ. Pectus, venter,
latera, crura, pennæ cau-
dam subtus obtegentes, ala-
rumque tectrices inferiores
minores ex viridi ad luteum
vergentes. Tectrices alarum
inferiores majores viridi-cœ-
ruleæ. Remiges majores su-
perne in latere exteriori sa-
turatè virides, in interiori
nigricantes, subtus verò ex-
teriùs saturatè cinereæ, in-
teriùs cœruleo - beryllinæ:
minores superne virides, in-
fernè cœruleo - beryllinæ.
Caudam componunt duode-
cim rectrices remigibus mi-
noribus concolores. Binæ in-
termediæ lateralium longitu-
dinem nonnihil excedunt.
Rostrum, pedes, unguesque
rubri.

*Fœmina à mare differt in
eo quod minùs habeat in syn-*
Tom. IV,

col sont rouges. La tête est d'un
verd tirant sur le jaune. Au-
dessous de l'occiput est une
étroite bande transversale d'un
orangé tirant sur le rouge. La
partie supérieure & les côtés
du col, le dos, ainsi que les
plumes scapulaires & les cou-
vertures du dessus des ailes,
sont verts. Le croupion & les
couvertures du dessus de la
queue sont rouges. La poitri-
ne, le ventre, les côtés, les
jambes, les couvertures du des-
sous de la queue & les petites
du dessous des ailes sont d'un
verd tirant sur le jaune. Les
grandes couvertures du dessous
des ailes sont d'un verd-bleu.
Les grandes plumes de l'aile
sont en-dessus d'un verd foncé
du côté extérieur, noirâtres du
côté intérieur; & en-dessous
elles sont d'un cendré foncé du
côté extérieur, & d'un bleu
d'Aigue-marine du côté inté-
rieur: les moyennes sont ver-
tes en-dessus, & d'un bleu
d'Aigue-marine en-dessous. La
queue est composée de douze
plumes de la même couleur que
les moyennes de l'aile. Les
deux du milieu sont un peu plus
longues que les latérales. Le
bec, les pieds & les ongles
sont rouges.

La femelle diffère du mâle en
ce qu'elle a moins de rouge au

incipit, qu'elle n'en a point du tout à la gorge ni à la partie inférieure du col, & qu'elle n'a point au-dessous de l'occiput cette bande transversale d'un orangé-rouge qu'a le mâle. Elle en diffère encore en ce qu'elle a de chaque côté de la tête une tache d'un verd-bleu, placée entre le bec & l'œil.

On les trouve aux *Iles Philippines*, & sur-tout en celle de *Luçon*, aux environs de *Manille*, d'où elles ont été envoyées à *M. l'Abbé Aubry*, qui les conserve dans son cabinet.

capite rubri, nulla sit in gutture & collo inferiore rubedo, & infra occipitium tæniâ transversâ aurantio-rubrà, quâ *mas* donatur, ipsa destituatur. Ab illo quoque discrepat maculâ viridi-cœruleâ in utroque capitis latere rostrum inter & oculum positâ.

Habitant in *Philippensibus Insulis*, præsertim in *Lucionensi Insula*, circa *Manillam*, unde in *muŕeum D. Aubry* missæ sunt.

** 88. LA PETITE PERRUCHE DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XXX. Fig. 2.

Psittacus minor brevicaudus, dilutè viridis, infernè ad luteum vergens; capite, gutture & collo inferiore cinereo-albis, ad viride inclinantibus; rectricibus dilutè viridibus, tæniâ transversâ nigrâ notatis. *PSITTACULA MADAGASCARIENSIS*.

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces neuf lignes. Son bec, qui a cinq lignes & demie d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche cinq lignes de long; sa queue

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues quatuor pollices & novem lineas. Rostrum, quod quinque cum semi lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos quinque lineas longum est;

cauda unum pollicem & undecim lineas; pes quinque lineas; digitorum anticorum extimus cum ungue octo lineas, intimus quinque cum semi lineas; posticorum exterior septem lineas, interior quatuor lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput, guttur & collum inferius ex cinereo-albo non nihil ad viride inclinant. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superioresque caudæ rectrices sunt dilutè virides. Pectus, ventrem, latera, crura & rectrices caudæ inferiores idem tingit color viridis, sed paululùm ad luteum vergens. Pennæ alas subtus obtegentes sunt dilutè virides, nigro variegatæ. Remiges majores superne in latere exteriori & apice virides, in latere interiori fuscæ, oris exterioribus ad luteum vergentibus, subtus verò cinereo-fuscæ: minores superne virides, infernè cinereo-fuscæ. Caudam componunt duodecim rectrices dilutè virides, quarum quælibet versùs ipsius

un pouce onze lignes; son pied cinq lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, huit lignes, l'intérieur cinq lignes & demie; l'extérieur de ceux de derriere sept lignes, & l'intérieur quatre lignes. Elle a dix pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un gris-blanc tirant un peu sur le verd. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un verd clair. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont du même verd, mais tirant un peu sur le jaune. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un verd clair, varié de noir. Les grandes plumes de l'aîle sont en-dessus vertes du côté extérieur & à leur bout, brunes du côté intérieur, & leur bord extérieur tire sur le jaune; & en-dessous elles sont d'un cendré-brun: les moyennes sont vertes en-dessus, & d'un cendré-brun en-dessous. La queue est composée de douze plumes d'un verd clair, & qui sont marquées chacune vers son

bout d'une large bande transversale noire. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Le bec, les pieds & les ongles sont d'un gris-blanc. On la trouve à *Madagascar*, d'où elle a été apportée à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

extremitatem latâ tæniâ transversâ nigrâ notatur. Binæ intermediæ lateralium longitudinem nonnihil excedunt. Rostrum, pedes, unguesque cinereo-albi. Habitat in *Madagascaria*, unde in *museum Reaumurianum* allata à *D. Poivre*.

* * 89. LA PETITE PERRUCHE A GORGE JAUNE.

Voyez Pl. XXX. Fig. 3.

Psittacus minor brevicaudus, viridis, infernè dilutiùs & ad luteum inclinans; maculâ sub gutture aurantiâ; tæniâ in alis transversâ castaneo-aureâ ad viride vergente; rectricibus alarum inferioribus luteis; rectricibus viridibus, oris interioribus ad luteum inclinantibus PSITTACULA GUTTURE LUTEO.

Elle n'est guères plus grosse que l'*Alouette luppée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces. Son bec, qui a huit lignes d'épaisseur, a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche sept lignes & demie de long; sa queue deux pouces deux lignes; son pied quatre lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie, l'intérieur sept lignes; l'extérieur de ceux de derrière neuf lignes, & l'intérieur quatre lig-

Crassitie Alaudam cristatam non multum excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues sex tantum pollices. Rostrum, quod octo lineas crassum, ab ipsius unco ad oris angulos usque septem cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & totidem lineas; pes quatuor cum semi lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue novem cum semi lineas, intimus septem lineas; posteriorum exterior novem li-

neas , interior quatuor cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est tredecim pollicum ; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput superius viridis est coloris. Pars colli superior viridis quidem , sed aliquid lutei obscuri admixtum habens. Dorsum , uropygium , superiores caudæ tectrices & scapulares pennæ sunt eleganter virides. Sub gutture exigua extat macula rotunda aurantio colore imbuta. Collum inferius & pectus sunt viridi-lutea. Venter , latera , crura , inferioresque caudæ tectrices ex dilutè viridi nonnihil ad luteum inclinantes. Alarum margines , versùs articulum carpo humano respondentem , ex luteo ad viride vergentes. Pennæ alas subtus obtegentes eleganter luteæ. Tectrices alarum superiores minimæ eodem imbutæ viridi ac collum superius ipsum tingitur : mediæ castaneo-aureæ , nonnihil ad viride vergentes ; unde fit in utraque ala latitudo transversa concolor : majores à corpore remotiores prasinæ ; corpori finitimæ ex viridi paululùm ad luteum inclinantes. Remiges sunt

nes & demie. Elle a treize pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est verte. La partie supérieure du col est d'un verd mêlé d'une légère teinte de jaune obscur. Le dos , le croupion , les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un beau verd. Sous la gorge est une petite tache ronde d'un bel orangé. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un verd-jaune. Le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd clair , tirant un peu sur le jaune. Le bord de l'aîle , vers le pli qui répond à celui du poignet , est d'un jaune tirant sur le verd. Les couvertures du dessous de l'aîle sont d'un beau jaune. Les plus petites de dessus sont du même verd que la partie supérieure du col : les moyennes sont d'un marron-doré tirant un peu sur le verd ; ce qui forme sur chaque aîle une large bande transversale de cette couleur : les plus grandes les plus éloignées du corps sont d'un verd de pré ; & les plus proches du corps sont d'un verd tirant un peu sur le jaune. Les plumes de l'aîle sont en-dessous

d'un verd clair, excepté tout le long de leur tige, où elles sont d'un cendré foncé; mais en-dessus les grandes sont d'un verd de pré, & les moyennes d'un verd tirant un peu sur le jaune: toutes ont leur tige noire, & une grande partie de leur côté intérieur, vers les bords de la plume, d'un cendré foncé. La queue est composée de douze plumes vertes, & dont le bord intérieur tire sur le jaune. Le bec est d'un gris clair. Les pieds & les ongles sont gris. Je ne sçais dans quel pays on la trouve. *Du cabinet de M. Mauduyt.*

subtus dilutè virides, attamen secundum ipsarum scapi longitudinem saturatè cinereæ; superne verò majores sunt prasinae; minores ex viridi nonnihil ad luteum inclinant: omnium scapi sunt nigri; omnes quoque sunt in latere interiore, versùs ipsarum margines, maximâ parte saturatè cinereæ. Caudam componunt duodecim rectrices virides, oris interioribus ad luteum inclinantibus præditæ. Rostrum dilutè griseum. Pedes, unguesque grisei. In qua regione habitet prorsus ignoro. *Ex museo D. Mauduyt.*

90 LA PETITE PERRUCHE A TESTE JAUNE DU BRÉSIL.

Psittacus minor brevicaudus, superne viridis, infernè viridiluteus; syncipite aurantio; oculorum ambitu luteo; rectricibus superne viridibus, subtus obscurè luteis . . .
PSITTACULA BRASILIENSIS ICTEROCEPHALOS.

Psittaci minoris Marcgravii quarta species. Willugh. Ornith. pag. 78.
Tui quarta species. Marcgr. Hist. Br. pag. 206.

Jonst. Avi. pag. 141.

Raj. Syn. Avi. pag. 34. N°. 4.

Elle est de la grandeur & de la grosseur d'un *Etourneau*. Le synciput est orangé. Le tour des yeux est jaune. Le reste de la tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont verts. Les plumes scapulaires, les cou-

Magnitudine & crassitie cum *Sturno* convenit. Synciput aurantio colore tingitur. Oculorum ambitus luteus est. Reliquum caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapula-

res, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ rectrices sunt virides. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crura & rectrices caudæ inferiores tingit color viridi-luteus. Cauda duodecim constat rectricibus superne viridibus, subtus obscure luteis. Oculi magni sunt & subnigri. Rostrum nigrum. Habitat in *Brasilia*.

vertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd-jaune. La queue est composée de douze plumes vertes en-dessus, & d'un jaune obscur en-dessous. Les yeux sont grands & noirâtres. Le bec est noir. On la trouve au *Brésil*.

91. LA PETITE PERRUCHE JAUNE DU BRÉSIL.

Psittacus minor brevicaudus, superne viridis, infernè luteus; imo ventre viridi, capite & collo luteis; remigibus majoribus apice ad nigricantem colorem vergentibus; rectricibus viridibus *PSITTACULA BRASILIENSIS LUTEA*.

Psittaci minoris Marcgravii quinta species, Jendaya. *Willugh. Ornith.* pag. 78.

Jendaya, quinta species. *Marcgr. Hist. Br.* pag. 206.

Jonst. Avi. pag. 141.

Jendaya *Raj. Syn. Avi.* pag. 34. N^o. 5.

Les *Brasiliens* l'appellent JENDAYA. *Marcgr. Jonst.*

Magnitudine & crassitie *Merulam* adæquat. Caput, guttur, collum, pectus, ventrem supremum & latera vestiunt pennæ luteæ. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superiores alarum rectrices, imus venter, crura, rectricesque caudæ superiores & inferiores viridis sunt coloris. Alarum remi-

Elle est de la grandeur & de la grosseur d'un *Merle*. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont jaunes. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, le bas-ventre, les jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un beau verd. Les gran-

des plumes de l'aîle sont pareillement vertes , mais leur bout tire sur le noirâtre : les moyennes sont du même verd que le dos. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aîle. Les yeux sont entourés d'une peau nue & blanche : leur prunelle est noirâtre ; & leur iris est d'une belle couleur d'or. Le bec , les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve au *Bresil*.

ges majores sunt virides quidem , attamen apice ad nigricantem colorem vergentes : minores eodem imbutæ viridi ac dorsum ipsum tingitur. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores. Oculos circumdat cutis nuda candida : ipsorum pupilla nigricat ; irides verò sunt aureo colore imbutæ. Rostrum , pedes , unguesque nigri. Habitat in *Brasilia*.

** 92. LA PETITE PERRUCHE DU SÉNÉGAL;

Voyez Pl. XXIII. Fig. 2.

Psittacus minor brevicaudus , superne viridis , infernè aurantius , ad latera luteus ; capite & gutture cinereis ; collo viridi ; rectricibus superne saturatè cinereis , ad viride vergentibus , viridi marginatis *PSITTACULA SENEGALENSIS* :

Elle n'est guères plus grosse qu'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles de sept pouces sept lignes. Son bec , qui a neuf lignes d'épaisseur , a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche sept lignes & demie de long ; sa queue deux pouces six lignes ; son pied six lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , douze lignes &

Crassitie Merulam non multum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas explet ; & ad extremos ungues septem pollices & totidem lineas. Rostrum , quod novem lineas crassum , ab ipsius unco ad oris angulos usque septem cum semi lineas longum est ; cauda duos pollices cum sex lineis ; pes sex lineas ; digitorum anticorum extremus

mus cum ungue duodecim cum semi lineas , intimus novem cum semi lineas ; posticorum extimus undecim lineas , intimus sex lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum quindecim pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput superius & ad latera, gutturque amœnissimo tinguntur cinereo. Occiput, collum & dorsum viridis sunt coloris : qui color supra pectus in acumen protenditur. Uropygium, superioresque caudæ rectrices viridi imbuuntur nonnihil dilutiores. Pectus & venter elegantissimo tinguntur aurantio. Crura sunt viridia. Latera, pennæ caudam subtus cooperientes & rectrices alarum inferiores minores eleganter luteæ : majores alarum inferiores rectrices dilutè cinereæ. Margines alarum, versùs articulum carpo humano respondentem, pennæ scapulares, superiores alarum rectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbutæ viridi ac dorsum ipsum tingitur : superiores alarum rectrices majores à corpore remotiores, sicut & alæ no-

Tom. IV.

demie, l'intérieur neuf lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière onze lignes, & l'intérieur six lignes. Elle a quinze pouces de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure & les côtés de la tête, ainsi que la gorge, sont d'un joli cendré. L'occiput, le col & le dos sont verts : cette couleur descend en pointe sur la poitrine. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd un peu plus clair. La poitrine & le ventre sont d'un bel orangé. Les jambes sont vertes. Les côtés, les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessous des ailes sont d'un beau jaune : les grandes du dessous des ailes sont d'un cendré clair. Le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, les plumes scapulaires, les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même verd que le dos : les grandes couvertures du dessus des ailes les plus éloignées du corps & les plumes de l'aile bâtarde sont d'un cendré foncé, bordées extérieurement de verd. Les plumes de l'aile sont d'un cendré

E e e

clair en-dessous ; mais en-dessus les grandes sont d'un cendré foncé , bordées extérieurement de verd : les moyennes sont de cette dernière couleur du côté extérieur , & d'un cendré foncé du côté intérieur. La queue est composée de douze plumes , qui sont en-dessous d'un cendré tirant tant soit peu sur le verd ; mais en-dessus elles sont d'un cendré foncé , qui tire d'autant plus sur le verd , qu'il approche plus des bords de chaque plume ; de sorte que ces bords sont tout-à-fait verds. Les yeux sont entourés d'une peau nue & noirâtre : leur prunelle est noire ; & leur iris est d'un beau jaune. La bête du demi-bec supérieur est aussi entourée d'une peau nue & noirâtre , dans laquelle sont placées les narines. Le bec & les ongles sont d'un cendré-noirâtre ; les pieds sont d'un cendré tirant un peu sur le rougeâtre. On la trouve au *Sénégal*. *Du cabinet de M. Mauduyt*. Je l'ai aussi vue vivante à *Paris* chez *M. de Jussieu*.

thæ pennæ , saturatè cinereæ , in latere exteriori viridi fimbriatæ. Remiges subtus dilutè cinereæ ; superne verò majores saturatè cinereæ , exterius viridi marginatæ : minores in latere exteriori virides , in interiori saturatè cinereæ. Caudam componunt duodecim rectrices subtus cinereæ , nonnihil ad viride inclinantes , superne autem saturatè cinereæ , qui color cinereus magis magisque , versùs rectricum margines procedendo , ad viridè vergit ; ita ut rectrices ad margines penitus sint virides. Oculos circumdat cutis nuda nigricans : ipforum pupilla est nigra ; irides verò eleganter luteæ. Basim mandibulæ superioris similiter ambit cutis nuda nigricans , in qua nares sunt positæ. Rostrum , unguesque cinereo - nigricantes ; pedes cinerei quidem , sed tamen paululùm ad rubescentem inclinantes colorem. Habitat in *Senegalenfi* regione. *Ex museo D. Mauduyt*. Speciem istam quoque *Parisiis* apud *D. de Jussieu* vivam observavi.

93 LA PETITE PERRUCHE BRUNE DU BRÉSIL.

Psittacus minor brevicaudus, superne viridis, infernè fusco-rufescens ; vertice saturatè castaneo ; oculorum ambitu fusco ; gutture cinereo ; marginibus alarum sanguineis ; maculâ in dorso, & rectricibus dilutè fuscis *PSITTACULA BRASILIENSIS FUSCA.*

Psittacus minor vulgaris. Barr. *Hist. Fr. Eq.* pag. 146.

Anaca Brasiliensibus. Marcgr. *Hist. Br.* pag. 207.

Jonst. Avi. pag. 142.

Willugh. Ornith. pag. 78.

Raj. Syn. Avi. pag. 35. N°. 8.

Les François de la Guiane l'appellent PERRICHE COMMUNE. Barr.

Les Brasiliens , ANACA. Marcgr. *Jonst. Willugh. Raj. Barr.*

Magnitudine & crassitie *Alaudam* circiter æmulator. Vertex capitis est saturatè castaneus. Oculorum ambitus fuscus. Guttur cinereum. Colli superior pars, dorsum, uropygium, latera, crura, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ rectrices sunt virides ; attamen in dorso macula extat dilutè fusca. Collum inferius, pectus, venter & rectrices caudæ inferiores ex fusco rufescunt. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, sanguinei sunt coloris. Remiges majores virides, attamen in extremitate thalassinæ : minores in totum virides. Caudam componunt

Elle est à peu près de la grandeur & de la grosseur d'une *Alouette*. Le sommet de la tête est d'un marron foncé. Le tour des yeux est brun. La gorge est cendrée. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes, celles du dessus de la queue, les jambes & les côtés sont verts ; il y a cependant sur le dos une tache d'un brun clair. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun-roussâtre. Le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, est d'un rouge de sang. Les grandes plumes de l'aile sont d'un verd, qui à leur extrémité de-

vient d'un verd de mer : les moyennes sont entièrement vertes. La queue est composée de douze plumes d'un brun clair. Le bec est brun. Les pieds sont cendrés ; & les ongles noirâtres. On la trouve dans la *Guiane* & au *Brésil*.

duodecim rectrices dilute fuscæ. Rostrum fuscum. Pedes cinerei ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Guiana* & *Brasil*ia.

94. LA PETITE PERRUCHE HUPÉE.

Psittacus minor brevicaudus, cristatus, viridis ; cristâ, alis & caudâ rubris *PSITTACULA CRISTATA*.

Psittacus erythrochlorus cristatus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 682*, in qua hujus icon non satis accurata.

Jonst. Avi. pag. 23.

Psittacus erythrochlorus cristatus Aldrovandi. Raj. Syn. Avi. pag. 34. N°. 4.

Psittacus erythrochlorus cristatus Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 78.

Psittacus erythrochlorus torquatus cristatus. Charlet. Exer. pag. 74. N°. 13.

Charlet. Onomazt. pag. 67. N°. 13.

Elle approche de la grosseur d'un *Merle* ; mais elle a la queue beaucoup plus courte. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les côtés sont verts. Sur le sommet de la tête est une huppe composée de six plumes rouges, sçavoir trois grandes & trois petites, que l'Oiseau peut redresser ou abaisser à volonté, comme fait le *Kakatoes*. Les couvertures du dessus des ailes, ainsi que les plumes de l'aîle,

Ad *Merulæ* crassitiem accedit ; sed caudâ multò breviori donatur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crura, rectricesque caudæ superiores & inferiores viridi imbuuntur colore. In summo capite crista extat sex pennis rubris conflata, tribus scilicet majoribus, & minoribus totidem, quas Avis ad libitum, *Cacatuæ* instar, erigere aut componere potest. Rectrices alarum superiores, sicut & remiges, sunt rubræ.

Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Oculorum pupilla est nigra ; irides verò rubræ. De colore rostri , sicut & pedum , apud *Aldrovandum* nulla mentio facta est. In qua regione habitat prorsus me latet.

font rouges. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles de l'aile. La prunelle des yeux est noire : leur iris est rouge. *Aldrovande* n'a point parlé de la couleur du bec , non plus que de celle des pieds. Je ne sçais dans quel pays on la trouve.

95. LA PETITE PERRUCHE HUPÉE DU MEXIQUE.

Psittacus minor brevicaudus , cristatus , saturatè coccineus ; cristâ purpureâ ; oculorum ambitu cœruleo ; gutture luteo ; cruribus dilutè cœruleis ; remigibus viridibus , albo marginatis ; rectricibus saturatè coccineis PSITTACULA MEXICANA CRISTATA.

Psittacus collo rubro , plumis in capite purpureis. Klein. Avi. pag. 25. N°. 22.

Avis de cocho , Psittaci species , Mexicana , vario colore. Seb. Vol. I. pag. 94. hujus icon non satis accurata Tab. LIX. fig. 2.

Præcedentem crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem circiter pollices explet , & ad extremos ungues sex pollices & septem lineas. Rostrum , quod sex cum semi lineas crassum , ab ipsius unco ad oris angulos usque sex lineas longum est ; cauda unum pollicem cum novem lineis ; pes quinque lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue octo lineas , intimus sex cum semi lineas ; postico-

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ sept pouces , & jusqu'à celui des ongles de six pouces sept lignes. Son bec , qui a six lignes & demie d'épaisseur , a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche six lignes de long ; sa queue un pouce neuf lignes ; son pied cinq lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , huit lignes , l'intérieur six lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derriere

sept lignes , & l'intérieur quatre lignes & demie. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Le synciput est orné d'une huppe pourpre. Le tour des yeux est bleu. La gorge est jaune. Le col est rouge. Le derrière de la tête , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , la poitrine , le ventre , les côtés , & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un rouge vif , mais foncé. Les jambes sont d'un bleu clair. Les couvertures des aîles sont d'un pourpre clair & très-agréable. Les plumes de l'aîle sont vertes , & bordées de blanc. La queue est composée de douze plumes d'un rouge vif , mais foncé. Le bec est jaune. Les pieds & les ongles sont d'un cendré-gris. On la trouve au *Mexique*.

rum extimus septem lineas , intimus quatuor cum semi lineas. Alæ complicatæ non-nihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. In syncipite crista extat purpurea. Oculorum ambitus est cœruleus. Guttur luteum. Collum rubrum. Caput posterius , dorsum , uropygium , pennas scapulares , pectus , ventrem , latera , rectricesque caudæ superiores & inferiores saturatè coccineus tingit color. Crura sunt dilutè cœrulea. Pennæ alas vestientes purpureo dilutiorè quàm elegantissimè pictæ. Remiges virides , albo marginatæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus saturatè coccineis. Rostrum flavum. Pedes , unguesque ex cinereo grisei. Habitat in *Mexico*.



Fig. 2.



2. Perruche à tête bleue.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Ara du Brésil.

2. Perruche à tête bleue.



du Brésil .



Desiné et Gravé par Martinet.

Ara bleu et jaune du Brésil.







Dessiné et Gravé par Martinet.

Kakaloes.

Fig. 2



2. Perroquet de l'Isle de Luçon.

Fig. 1.

Fig. 2



Desiné et Gravé par Martinet.

1. Petit Kakatoes.

2. Perroquet de l'Isle de Luçon.



2 . Lory des Philippines .



Dessiné & Gravé par Martenot.

1. Lory des Moluques.

2. Lory des Philippines.



2. *Petite Perruche du Sénégal.*



Designé et Gravé par Martinet.

1. Lory des Indes Orientales.

2. Petite Perruche du Sénégal.

Echelle de 6 Pouces pour la premiere Figure.






2. Perruche rouge des Indes.

Fig. 1.



Fig. 2



Designé et Gravé par Martinet.

1. Perroquet Amazone à gorge bleue.

2. Perruche rouge des Indes.





2. Perroquet Amazone varié.

Fig. 2.

Fig. 1.



Echelle de 6 Pouces.

1. Perroquet Amazone du Bresil.

2. Perroquet Amazone varié.



L.



on.

2. Perruche de Cayenne.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Perruche à Collier de l'Isle de Bourbon.

2. Perruche de Cayenne.





Fig. 2.

2. Perruche rouge, d'Amboine.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Perruche de la Guiane.

2. Perruche rouge, d'Amboine.

g. 2.



2. Perruche à tête rouge de Ginqi.

Fig. 2.

Fig. 1.

Échelle de 6 Pouces pour la première Figure 1.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Perruche de Gingi.

2. Perruche à tête rouge de Gingi.





Madagascar. 3. Petite Perruche à gorge jaune.



Designé et Gravé par Martinet.

1. Petite Perruche des Philippines. 2. Petite Perruche de Madagascar. 3. Petite Perruche à gorge jaune.



SECTIO V.

SECTION V.

Eæ quæ rostro donantur longo; crassitie caput æquantem, ferræ instar denticulato; utriusque mandibulæ apice deorsum incurvo: & linguâ pennæ æmulâ præditæ sunt.

Ceux qui ont le bec long, de la grosseur de la tête, dentelé comme une scie; le bout des deux mandibules courbé enenbas: & la langue ressemblante à une plume.

SOLUM *Tucanæ* genus hanc sectionem constituit.

CETTE section ne comprend qu'un seul genre, sçavoir celui du *Toucan*.

LIV.

LIV.

*Genus Tucanæ.**Le Genre du Toucan.*

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis destituti; duo scilicet antici, totidem postici; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Rostrum longum, crassitie caput æquans, ferræ instar denticulatum:

Apex utriusque mandibulæ deorsum incurvus:

Lingua pennæ æmula.

Son caractere est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de membranes; deux devant & deux derriere; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Le bec long, de la grosseur de la tête, dentelé comme une scie:

Le bout des deux mandibules courbé enenbas:

La langue ressemblante à une plume.

Omnia hujus generis Avium cauda decem tantum rectricibus conflatur.

Tous les Oiseaux de ce genre n'ont que dix plumes à la queue. Leur bec, quoique extrême-

ment gros & long, pèse fort peu ; car il est composé d'une partie cellulaire très-légère, renfermée dans une matière cornée extrêmement mince. Dans les uns les narines sont placées près de l'origine du demi-bec supérieur hors de la matière cornée, & sont cachées sous les plumes : dans les autres elles sont placées sur la matière cornée même, & sont apparentes.

Ipsorum rostrum, quamquam valdè crassum & longum, minimè pendet ; parte enim constat cellulari levissimâ, materiâ corneâ valdè tenui involutâ. In aliis narres prope mandibulæ superioris exortum & extra materiam corneam sunt collocatæ, & plumis coopertæ : in alteris verò supra ipsam materiam corneam positæ sunt, & conspicuæ.

1. LE TOUCAN.

Tucana superne nigro-viridans, dorso infimo & uropygio ad cinereum vergentibus ; pectore aurancio ; ventre & rectricibus caudæ inferioribus coccineis ; rectricibus superne nigro-viridantibus, subtus nigris, apice coccineis . . .
TUCANA.

Toucan, sive Pica Brasiliica. *Gesn. Avi. pag. 800. hujus icon non satis accurata pag. 801.*

Pica Brasiliica. *Gesn. icon. Avi. pag. 130, in qua eadem icon.*

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 801. hujus icon non satis accurata pag. 802.

Pica Brasiliica Gesneri. *Barr. Hist. Tr. Eq. pag. 141.*

Pica Brasiliica Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 88. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XX.*

Raj. Syn. Avi. pag. 44. N^o. 1.

Pica Brasiliica, aliis Ramphastos, Hipporhynchos & Buryrhychos, aliis Barbara & Piperivora. *Jonst. Avi. pag. 28. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 56.*

Pica Brasiliensis, Hipporhynchos. *Charlet. Exer. pag. 76. N^o. 6.*

Charlet. Onomazt. pag. 68. N^o. 6.

Pica Brasiliensis, uropygio coccineo. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 38. sp. 1.*

Rostrata Americana, nigra, ventre & uropygio coccineis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXV. sp. 1.*

Nasutus simpliciter. *Klein. Avi. pag. 38. N^o. 1.*

Bucco. *Moehr. Avi. Gen. 3.*

Monstrosa

Monstrosa Avis. *Mus. Best. pag. 34. N°. 3. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. IX. N°. 3.*

Avis Piperivora nonnullis. *Willugh. Raj.*

Pie du Brésil. *Alb. Tom. II. pag. 18 ; avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl. 25.*

Les Espagnols l'appellent CARPINTERO. *Mus. Best.*

Les Italiens, GAZA DI BRESSILIA. *Aldrov.*

Les Allemands, PFEFFER-VOGEL. *Gesn. Aldrov. PFEFFER-FRACSZ : Aldrov. PFEFFER-FRASZ ; INDIANISCHER VOGEL. Gesn.*

Les Anglois, GREAT BEAKT PIE OF BRASIL, ou PEPPER-PIE. *Charlet.*

Les François de la Guiane, GROS-BEC. *Barr.*

Les Indiens de la Guiane, TOUKAN. *Barr.*

Les Brésiliens, TOLCAN. *Willugh. Raj. Mus. Best.*

Les Péruviens, TACATACA. *Mus. Best.*

Les Mexiquains, XOCHITENACATL. *Willugh. Raj. Mus. Best.*

Crassitie *Picam* paululùm anteceliit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem octo pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem quinque pollices & sex lineas. Rostrum, quod in exortu unum pollicem & decem lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque sex circiter pollices longum est; cauda sex pollices cum tribus lineis; pes sexdecim cum semi lineas; digitorum anticorum extremus cum ungue octodecim lineas, intimus unum pollicem; posticorum extremus sexdecim lineas, intimus octo cum semi lineas. Alæ complicatæ ad mediam circiter longitudinem caudæ

Tom. IV.

Il est un peu plus gros qu'une *Pie*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied cinq pouces six lignes. Son bec, qui a à son origine un pouce dix lignes d'épaisseur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche environ six pouces de long; sa queue six pouces trois lignes; son pied seize lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce six lignes, l'intérieur un pouce; l'extérieur de ceux de derrière seize lignes, & l'intérieur huit lignes & demie. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la partie supérieure du dos & les

F ff

plumes scapulaires sont d'un noir brillant & changeant en verd. La partie inférieure du dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & celles du dessus des ailes sont de la même couleur, mais qui tire un peu sur le cendré. La poitrine est d'un bel orangé. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un rouge très-vif. Les couvertures du dessous des ailes sont noirâtres. Les plumes de l'aile sont en-dessous de cette dernière couleur ; & en-dessus elles sont d'un noir changeant en verd, mais moins brillant que celui du dos. La queue est composée de dix plumes d'égale longueur, noires en-dessous, d'un noir changeant en verd en-dessus, & terminées de rouge vif. Les narines sont situées sur la matière cornée, tout près de l'origine du demi-bec supérieur, & sont apparentes. Le bec est d'un jaunâtre nuancé de verd obscur, excepté son bout, qui est rougeâtre. Sa dentelure est fort apparente. Les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve dans la *Guiane* & au *Bresil*.

pertingunt. Caput, guttur, collum, dorsum supremum & scapulares pennæ sunt splendidè nigræ, viridi colore variantes. Dorsum infimum, uropygium, pennæ caudam superne cooperientes & superiores alarum rectrices eodem imbuuntur colore ; attamen nonnihil ad cinereum vergunt. Pectus elegantissimo tingitur auratione. Venter, latera, crura, inferioresque caudæ rectrices vividissimo imbuuntur coccineo. Pennæ alas subtus obtegentes nigricant. Alarum remiges sunt quoque subtus nigricantes, superne verò ex nigro viridescunt, sed minùs quàm in dorso splendidè. Caudam componunt decem rectrices æqualem obtinentes longitudinem, subtus nigræ, superne nigro-viridantes, apice coccineæ. Nares supra materiam corneam, prope mandibulæ superioris exortum, sunt collocatæ & conspicuæ. Rostrum flavicans, viridi obscuro adumbratum, attamen apice rubescens. Ipsius denticulæ valdè conspicuæ. Pedes, unguesque nigri. Habitat in *Guiana* & *Brasilia*.

** 2. LE TOUCAN A GORGE JAUNE DE CAYENNE.

Voyez Pl. XXXI. Fig. 1.

Tucana superne nigro-viridans ; genis & gutture sulphureis ; collo inferiore aurantio ; pectore , ventre supremo , testricibusque caudæ superioribus & inferioribus coccineis ; rectricibus superne nigro-viridantibus , subtus nigris

TUCANA CAYANENSIS GUTTURE LUTEO.

Cum *Pica* crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & quinque pollices explet , & ad extremos ungues quatuordecim pollices & sex lineas. Rostrum , quod in exortu unum pollicem & sex lineas crassum , ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & lineas binas longum est ; cauda sex pollices cum lineis binis ; pes unum pollicem & septem lineas ; digitorum anteriorum extimus cum ungue unum pollicem & octo lineas ; intimus quatuordecim lineas ; posteriorum exterior octodecim lineas , interior novem cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis novem pollicum & sex linearum ; alæ verò , complicatæ mediam

Il est à peu près de la grosseur d'une *Pic*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces , & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces six lignes. Son bec , qui a à son origine un pouce six lignes d'épaisseur , a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche trois pouces deux lignes de long ; sa queue six pouces deux lignes ; son pied un pouce sept lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , un pouce huit lignes , l'intérieur quatorze lignes ; l'extérieur de ceux de derrière un pouce six lignes , & l'intérieur neuf lignes & demie. Il a un pied neuf pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col , le dos & le croupion sont d'un noir bril-

Fff ij

lant & changeant en verd. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur, mais chaque plume est bordée d'un noir-verd encore plus brillant. Les joues & la gorge sont d'un beau jaune de soufre. La partie inférieure du col est d'un bel orange, bordé tout autour d'une bande de couleur de soufre, qui le sépare d'avec le noir du dessus du col & le rouge de la poitrine. La poitrine, le haut du ventre, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un rouge très-vif. Les jambes sont d'un noir brillant, & changeant en verd. Le bas-ventre & les côtés sont noirâtres. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un noirâtre plus clair. Les plumes de l'aile sont noires en-dessous, & en-dessus d'un noir changeant en verd, mais moins brillant que celui du dos. La queue est composée de dix plumes de la même couleur que celles des ailes. Elles sont toutes d'égale longueur. Les narines sont placées près de l'origine du demi bec supérieur, hors de la matière cornée, & sont cachées sous les plumes. Le bec est noir à son origine, ce qui forme une bande de cette couleur, beaucoup plus large sur la mandibule

circiter longitudinem caudæ pertingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigrae quidem, sed splendide & viridi colore variantes. Scapulares & superiores alarum rectrices concolores, attamen quælibet penna nigro-viridi adhuc splendidiore marginatur. Genæ & guttur eleganti sulphureo colore tinguntur. Collum inferius tingit color eleganter aurantius, quem circumdat tænia sulphurea, illum à colli superioris nigro & pectoris coccineo colore distinguens. Pectus, ventrem supremum, rectricesque caudæ superiores & inferiores tingit color vividissime coccineus. Crura sunt splendide nigro-viridantia. Venter imus & latera nigricant. Pennæ alas subtus obtegentes sunt dilutius nigricantes. Remiges subtus nigrae, superne nigro-viridantes, sed minus quam in dorso splendide. Caudam componunt decem rectrices remigibus concolores, æqualemque obtinentes longitudinem. Nares prope mandibulæ superioris exortum & extra materiam corneam sunt positæ & plumis coopertæ. Rostrum in

exortu nigrum, quæ nigredo taniam efficit in mandibula inferiore multò quàm in superiore latiore, & quidè prope synciput stric-
tissimam : reliquum rostrum viridi-olivaceum, attamen ad luteum inclinans prope suprà dictam taniam nigram, in medio mandibulæ superioris secundùm ipsam longitudinem, & in apice rostri : duarum insuper mandibularum margines sunt rubræ, idque per totam longitudinem, si tamen exortum & apicem excipias. Rostri denticulæ sunt parùm conspicuæ. Pedes, unguesque nigri. Habitat in *Cayana*.
Ex museo D. de Bandeville.

bule inférieure que sur la supérieure ; elle est même très-étroite auprès du synciput : le reste du bec est d'un verd - d'olive, qui tire cependant sur le jaune auprès de la bande noire, dont nous avons parlé ci-dessus, tout le long du milieu de la mandibule supérieure, & au bout du bec : de plus les bords des deux mandibules sont rouges dans toute leur longueur, excepté à leur origine & à leur bout. La dentelure du bec est peu apparente. Les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *Cayenne*. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

3. LE TOUCAN A GORGE BLANCHE DU BRÉSIL.

Tucana nigro-viridans ; genis, gutture & collo inferiore candidis ; taniâ transversâ in summo pectore coccineâ ; uropygio & rectricibus caudæ superioribus altis, inferioribus pallidè rubris ; rectricibus superne nigro-viridantibus, subtus nigris TUCANA BRASILIENSIS GUTTURE ALBO.

Rostrata nigra urrhopygio albo. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 38. sp. 3.*

Rostrata Americana nigra uropygio albo. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXV. sp. 4.*

Picus Americanus. *Hernand. Hist. Mex. pag. 697, in qua hujus icon non satis accurata. (An fœmina) ?*

Passer longirostrus Xochitenacatl dictus. *Euf. Nieremb. pag. 208, in qua hujus icon non satis accurata. (An fœmina) ?*

Altera Xochitenacatl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 58. Cap. CCXXIX. (An fœmina) ?*

Xochitenacatl tertia. *Raj. Syn. Avi. pag. 178. N°. 6. (An fœmina) ?*

Toucan , ou Pie du Brésil. *Edwards. Tom. II. pag. LXIV ; avec une figure exacte Pl. 64.*

Les Mexiquains l'appellent XOCHITENACATL. Fern.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Pigeon domestique*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied neuf pouces , & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces trois lignes. Son bec , qui a vers son origine environ deux pouces d'épaisseur , a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche cinq pouces huit lignes de long ; sa queue cinq pouces six lignes ; son pied dix-huit lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , un pouce neuf lignes , l'intérieur seize lignes ; l'extérieur de ceux de derrière un pouce huit lignes , & l'intérieur onze lignes. Ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'au quart de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col , sont d'un noir de velours. Le dos , les plumes scapulaires , la poitrine , le ventre , les côtés & les jambes sont d'un noir changeant en verd. Les joues , la gorge & la partie inférieure du col sont blanches. Au haut de la poitrine est une bande transversale d'un rouge très-vif , d'environ cinq lignes de large. Le

Columbam domesticam crassitie circiter æmulator. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & novem circiter pollices æquat , & ad extremos ungues unum pedem septem pollices & tres lineas. Rostrum , versùs exitum duos circiter pollices crassum , ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & octo lineas longum est ; cauda quinque pollices cum sex lineis ; pes octodecim lineas ; digitorum anteriorum exterior cum ungue unum pollicem & novem lineas , interior sexdecim lineas ; posteriorum extimus unum pollicem & octo lineas , intimus undecim lineas. Alæ complicatæ ad quartam circiter longitudinis caudæ partem usque protrahuntur. Partes capitis & colli superiores nigro tinguntur holoserici villosi instar splendenti. Dorsum , scapulares pennas , pectus , ventrem , latera & crura tingit color nigro-viridans. Genæ , guttur & pars colli inferior albore nitent. In summo

pectore tania extat transversa vividissimè coccinea, quinque circiter linearum latitudinem obtinens. Uropygium albet. Tectrices caudæ superiores concolores : inferiores pallidè rubræ. Pennæ alas subtus cooperientes nigræ. Superiores alarum tectrices, dorso instar, nigro-viridantes, sed splendidius. Remiges superne in latere exteriori nigro-viridescentes, in interiori nigræ, infernè verò in utroque latere nigro colore imbutæ. Cauda decem constat rectricibus æqualem obtinentibus longitudinem, superne nigro-viridantibus, subtus nigris. Oculos circumdat cutis nuda luteo-viridescens : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò obscurè avellaneæ. Nares prope mandibulæ superioris exortum, & extra materiam corneam, collocantur, plumisque cooperiuntur. Basim rostri circumdat tania striatissima nigra. Mandibula superior ex pallidè luteo viridescens, exceptis marginibus aurantiis & exiguis taniis transversis nigricantibus insignitis, excepto quoque apice per unius circiter pollicis intervallum splendide coccineo ; mandibula

inferior est blanc. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur : celles du dessous sont d'un rouge pâle. Les couvertures du dessous des ailes sont noires : celles du dessus sont du même noir-vert que le dos, mais plus brillant. Les plumes de l'aile sont en-dessus d'un noir tirant sur le verd du côté extérieur, & noires du côté intérieur ; mais en-dessous elles sont des deux côtés de cette dernière couleur. La queue est composée de dix plumes d'égale longueur, d'un noir tirant sur le verd en-dessus, & noires en-dessous. Les yeux sont entourés d'une peau nue, d'un jaune-verdâtre : leur prunelle est noire ; & leur iris est de couleur de noisette sombre. Les narines sont placées près de l'origine du demi-bec supérieur, hors de la matière cornée, & sont cachées sous les plumes. La base du bec est entourée d'une bande noire fort étroite. Le demi-bec supérieur est d'un jaune pâle & verdâtre, excepté ses bords, qui sont orangés & marqués de petites bandes transversales noirâtres, & son bout, qui dans l'espace d'environ un pouce est d'un rouge vif & brillant : le demi-bec inférieur est d'un bleu assez clair vers son origine, & qui devient

entoure de plus en plus, foncé en approchant vers son bout, qui, comme celui du demi-bec supérieur, est d'un rouge vif & brillant : les bords sont aussi marqués de petites bandes transversales noirâtres. La dentelure du bec est fort peu apparente. Les pieds & les ongles sont bleuâtres. On le trouve au *Bresil* dans la *Guiane* & au *Mexique*.

bula inferior cœruleo imbuta colore, versus exortum diluto, & deinde, versus apicem procedendo, magis magisque saturatiore; ipsius intus per apex, mandibulæ superioris apicis instar, est splendide coccineus: ipsius quoque margines exiguis tæniis transversis nigricantibus insigniuntur. Rostrum est parum conspicuè denticulatum. Pedes, unguesque cœrulescentes. Habitat in *Brasilia*, *Guiana* & *Mexico*.

**** 4. LE TOUCAN A GORGE BLANCHE DE CAYENNE.**

Voyez Pl. XXXI. Fig. 2.

Tucana nigro-viridans; genis, gutture & collo inferiore candidis; tæniâ transversa in summo pectore coccinea; rectricibus caudæ superioribus sulphureis, inferioribus coccineis; rectricibus superne nigro-viridantibus, subtus nigris
TUCANA CAYANENSIS GUTTURE ALBO.

Toucan à bec rouge. *Edwards. Glanur. pag. 58. Chap. XXVIII; avec une figure exacte Pl. 238.*

Oï eu appelé Tocan. *Feuillée Journ. des Obs. phys. pag. 428. (ed. 1714).* Les Anglois l'appellent RED-BEAKED TOUCAN. *Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces dix lignes. Son bec, qui a à son origine deux pouces d'é-

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & novem pollices æquat, & ad extremos ungues unum pedem septem pollices & decem lineas. Rostrum, quod

quod in exortu duos pollices crassum, ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & sex lineas longum est; cauda quinque pollices cum septem lineis; pes duos pollices cum linea una; digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & decem cum semi lineas, intimus unum pollicem & quinque cum semi lineas; posticorum extimus unum pollicem & novem lineas, intimus unum pollicem tantum. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & sex pollicum; alæ verò complicatæ quartam longitudinis caudæ partem attingunt. Superiores capitis & colli partes nigro imbuuntur holoserici villosi instar splendenti. Dorsum, uropygium, penæ scapulares, superiores alarum rectrices, pectus, venter, latera & crura sunt nigro-viridantes. Genæ, guttur & collum inferius candore nitent. In summo pectore tænia extat transversa vividissimè coccinea, quinque circiter lineas lata. Penæ caudam subtus obregentes eodem imbuuntur coccineo: quæ illam superne cooperiunt, sunt sulphureæ.

Tom. IV.

paissieur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche cinq pouces six lignes de long; sa queue cinq pouces sept lignes; son pied deux pouces une ligne; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce dix lignes & demie, l'intérieur un pouce cinq lignes & demie; l'extérieur de ceux de derrière un pouce neuf lignes, & l'intérieur un pouce. Il a deux pieds six pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au quart de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un noir de velours. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un noir changeant en verd. Les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont blanches. Au haut de la poitrine est une bande transversale d'un rouge très-vif, d'environ cinq lignes de large. Les couvertures du dessous de la queue sont du même rouge: celles du dessus sont de couleur de soufre. Les couvertures du dessous des aîles sont noires. Les plumes de l'aîle sont en-dessus d'un noir tirant sur le verd du côté extérieur, & noires du côté intérieur; mais en-dessous elles sont

G g g

des deux côtés de cette dernière couleur. La queue est composée de dix plumes d'égale longueur, d'un noir tirant sur le verd en-dessus, & noires en-dessous. Les yeux sont noirs, & entourés d'une peau nue & bleuâtre. Les narines sont situées près de l'origine du demi-bec supérieur, hors de la matière cornée, & sont cachées sous les plumes. La bête du bec est entourée d'une bande noire fort étroite, qui est suivie d'une large bande jaunâtre, laquelle est elle-même suivie d'une noire : une autre bande jaunâtre s'étend sur le dessus du demi-bec supérieur dans toute sa longueur & jusqu'à son bout : le reste du bec est rouge, excepté le bout du demi-bec inférieur, qui, comme celui du demi-bec supérieur, est jaunâtre. La dentelure du bec est peu apparente. Les pieds sont de couleur de plomb ; & les ongles noirs. Il mange de tout ce qu'on lui présente. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

Inferiores alarum rectrices nigrae. Remiges superne in latere exteriori nigro-viridescentes, in interiori nigrae, subtus verò in utroque latere nigredine imbutae. Caudam componunt decem rectrices longitudine aequales, superne nigro-viridantes, subtus nigrae. Oculi sunt nigri, eosque circumdat cutis nuda caeruleascens. Nares prope mandibulae superioris exortum, extra materiam corneam, sunt positae, & plumis coopertae. Rostrum basin ambit tænia stric-tissima nigra, quam sequitur lata tænia flavicans, & istam secundam sequitur altera tænia nigra : alia extenditur fascia flavicans supra mandibulae superioris partem supremam, idque per totam longitudinem & ad apicem usque : reliquum rostrum rubrum, excepto tamen mandibulae inferioris apice, mandibulae superioris apicis instar, flavicante. Rostrum est parum conspicuè denticulatum. Pedes plumbeo colore imbuti ; ungues verò nigri. Cuncta sibi oblata devorat. Habitat in *Cayana*, unde in *musæum Reaumurianum* missa à *D. des Essars*,

** 5. LE TOUCAN A GORGE JAUNE DU BRÉSIL.

Voyez Pl. XXXII. Fig. 1.

Tucana nigro-viridans; genis, gutture & collo inferiore aurantiis; taniâ transversâ in summo pectore coccineâ; tectricibus caudæ superioribus sulphureis, inferioribus coccineis; rectricibus superne nigro-viridantibus, subtus nigris TUCANA BRASILIENSIS GUTTURE LUTEO.

Tucana. Charlet. *Exer. pag. 118. N^o. XXI.*

Charlet. *Onomazt. pag. 115. N^o. XXI.*

Tucana quam Lerus & Thevetus vocant Toucan. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 557.*

Jonst. Avi. pag. 125.

Tucana, sive Toucan Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 217.*

Rostrata Americana nigra, uropygio luteo. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXV. sp. 3.*

Piperivora nigra, uropygio luteo. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 38. sp. 2.*

Les Brasiliens l'appellent TOUCAN. *Marcgr.*

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem septem pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues octodecim pollices & quinque lineas. Rostrum, versùs ipsius exortum unum pollicem & octo lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor pollices & sex lineas longum est; cauda quinque pollices & septem lineas; pes unum pollicem & undecim lineas;

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied sept pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix-huit pouces cinq lignes. Son bec, qui a vers son origine un pouce huit lignes d'épaisseur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche quatre pouces six lignes de long; sa queue cinq pouces sept lignes; son pied un pouce onze lignes; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes & demie,

Ggg ij

l'intérieur quinze lignes; l'extérieur de ceux de derrière un pouce huit lignes, & l'intérieur dix lignes. Il a un pied neuf pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au quart de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un noir de velours. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un noir changeant en verd. Les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un bel orangé : cette couleur est terminée dans le bas par une petite bande transversale de couleur de soufre, & elle s'éclaircit sur les joues & les côtés du col; & même dans quelques individus ces parties sont presque blanches. Au haut de la poitrine est une bande transversale d'un rouge très-vif, d'environ cinq lignes de large. Les couvertures du dessous de la queue sont du même rouge : celles du dessus sont de couleur de soufre. Les couvertures du dessous des aîles sont noires. Les plumes de l'aile sont en-dessus d'un noir tirant sur le verd du côté extérieur, & noires du côté intérieur; mais en-dessous elles sont des

digitorum anticorum extimus cum ungue unum pollicem & novem cum femi lineas, intimus quindecim lineas; posticorum exterior unum pollicem & octo lineas, interior decem lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis novem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad quartam longitudinis caudæ partem extenduntur. Partes capitis & colli superiores sunt nigrae, holoserici villosi insart splendentes. Dorsum & uropygium, pennas scapulares, superiores alarum rectrices, pectus, ventrem, latera & crura tingit color nigro-viridans. Genæ, guttur & pars colli inferior elegantè imbuuntur aurantio : qui color in parte infima exiguâ terminatur taniâ transversâ sulphureâ, & in genis lateribusque colli fit dilutior; ita ut in quibusdam individuïs partes istæ sint ferè candidæ. In summo pectore taniâ extat transversa vividissimè coccinea, quinque circiter linearum latitudinem obtinens. Rectrices caudæ inferiores eodem imbuuntur coccineo : superiores sunt sulphureæ. Pennæ alas subtus

obtegentes nigræ. Remiges superne in latere exteriori nigro-viridescentes, in interiori nigræ, subtus verò in utroque latere nigredine tinctæ. Cauda decem conflatur rectricibus longitudine æqualibus, superne nigro-viridantibus, subtus nigris. Oculi sunt nigri, & cute nudâ flavicante circumdati. Nares prope mandibulæ superioris exortum extra materiam corneam, sunt collocatæ, & plumis tectæ. Basim rostri circumdat tænia grisea latiuscula, quæ tamen, versùs partem rostri supremam procedendo, fit strictior: reliquum rostrum nigrum. Ipsiùs denticulæ parùm conspicuæ. Pedes plumbeo colore imbuti; ungues verò nigri. Habitat in *Brasilia* & *Cayana*, unde in *musæum Realmurianum* missa à *D. des, Effars*.

deux côtés de cette dernière couleur. La queue est composée de dix plumes d'égale longueur, d'un noir tirant sur le verd en-dessus, & noires en-dessous. Les yeux sont noirs, & entourés d'une peau nue & jaunâtre. Les narines sont situées près de l'origine du demi-bec supérieur, hors de la matière cornée, & sont cachées sous les plumes. La bête du bec est entourée d'une bande grise assez large, mais qui va en rétrécissant vers le dessus du bec; le reste du bec est noir. Sa dentelure est fort peu apparente. Les pieds sont de couleur de plomb; & les ongles noirs. On le trouve au *Bresil* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Effars*.

6. LE TOUCAN A COLLIER DU MEXIQUE.

Tucana superne nigra, infernè viridis; torque coccineo; collo inferiore in infima parte dilutè luteo, rubris maculis, atrisque lineis vario; imo ventre & rectricibus caudæ inferioribus rubris; rectricibus nigris . . . TUCANA MEXICANA TORQUATA.

Cochitenacatl. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 46. cap. CLX.
Les Mexiquains l'appellent. COCHITENACATL. Fern.

Il approche de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied six pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a près de sept pouces de long. La tête & la partie du col qui en est la-plus proche, sont noires, & cela jusqu'à une bande d'un rouge vif, qui entoure le col, & forme un collier, le bas du col, c'est-à-dire la partie la plus voisine du corps, est noir en-dessus, & d'un jaune clair en-dessous, cette dernière couleur étant variée de taches rouges & de lignes noires. Le dos & le croupion sont noirs. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue, & celles du dessus & du dessous des aîles sont de la même couleur. La poitrine, le haut du ventre & les côtés sont verts. Le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue sont rouges. Les jambes pourpres. Les plumes de l'aîle sont noires. La queue est composée de dix plumes de la même couleur. Les yeux sont noirs; leur iris est d'un jaune-rougeâtre. Le demi-bec supérieur est blanchâtre, l'inférieur est noir. Les pieds sont d'un cendré-verdâtre; & les ongles noirs. Il se nourrit de *Poissons*.

Ad præcedentis crassitiem accedit. Iplius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & sex circiter pollices æquat. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem ferè pollices longum est. Caput & pars colli ipsi finitima nigro imbuuntur colore, idque ad taniam usque coccineam, quâ præcinctum est collum, quæque torquem efficit: collum autem in parte infima sive illa quæ corpori vicinior est, superne nigrum, infernè dilutè luteum, rubris maculis, atrisque lineis varium. Dorsum, uropygium, penna scapulares, quæ caudam superne cooperiunt, alarumque teatrices superiores & inferiores sunt nigræ. Pectus, venter supremus & latera viridis sunt coloris. Venter imus & teatrices caudæ inferiores rubro colore tinguntur. Crura purpurea. Remiges nigræ. Caudam componunt decem rectrices remigibus concolores. Oculi sunt nigri; ipsorum verò irides ex luteo rubescentes. Mandibula superior candicans, inferior nigra. Pedes è cinereo virescentes; ungues verò nigri. *Piscibus* yicitat. Habitat in *Mexico*

7. LE TOUCAN VERD DU MEXIQUE.

Tucana in toto corpore viridis, rubro & pavonino colore variegata TUCANA MEXICANA VIRIDIS.

Xochitenacatl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 51. cap. CLXXXVII.*
Les Mexiquains l'appellent XOCHITENACATL. Fern.

Magnitudine & crassitie *Tucanam Brasiliensem gutture luteo* circiter æmulatur. Rostrum habet quatuor ferè pollices longum. Per universum corpus pennis vestitur viridibus, insertis tamen nonnullis rubescentibus, pavoninisque aliis. Rostrum luteo ac nigro colore varium. Pedes, unguisque nigri. Habitat in *Mexico*, ibique calidas regiones atque maritimas frequentat.

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur du *Toucan à gorge jaune du Brésil*. Son bec a près de quatre pouces de long. Tout son corps est couvert de plumes vertes, parmi lesquelles sont cependant mêlées quelques plumes rouges & quelques autres qui brillent des couleurs du *Paon*. Le bec est varié de noir & de jaune. Les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Mexique*, duquel il habite principalement les regions chaudes & maritimes.

** 8. LE TOUCAN VERD DE CAYENNE.

Voyez Pl. XXXIII. Fig. 1.

Tucana superne obscurè viridis, infernè sulphurea; capite & gutture nigris (*mas*) castaneis (*fœmina*); uropygio coccineo; rectricibus superne obscurè viridibus, infernè viridicineris TUCANA CAYANENSIS VIRIDIS.

Merulam crassitie non multum superat. Ipsi long-

Il n'est guères plus gros qu'un *Merle*. Sa longueur depuis le

bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces , & jusqu'à celui des ongles de douze pouces six lignes. Son bec , qui a à son origine quinze lignes d'épaisseur , a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche trois pouces quatre lignes de long ; (le bec de la *femelle* n'a que deux pouces huit lignes de longueur) ; sa queue quatre pouces deux lignes ; son pied quatorze lignes ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , treize lignes & demie , l'intérieur dix lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière douze lignes & demie , & l'intérieur six lignes. Il a seize pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La tête , la gorge & la partie inférieure du col qui en est la plus voisine , sont d'un beau noir. La partie supérieure du col , le dos , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des ailes , celles du dessus de la queue & les jambes sont d'un verd obscur. Le croupion est d'un rouge vif. Le bas de la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont de couleur de soufre. Les couvertures du dessous des ailes sont

ginitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices explet , & ad extremos ungues duodecim pollices & sex lineas. Rostrum , quod in exortu quindecim lineas crassum , ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & quatuor lineas longum est ; (rostrum in *femina* duos tantum pollices & octo lineas longum) ; cauda quatuor pollices cum lineis binis ; pes quatuordecim lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue tredecim cum semi lineas , intimus decem cum semi lineas ; posticorum extimus duodecim cum semi lineas , intimus sex lineas. Alis expansis , extremitates majorum remigum sexdecim pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Caput , guttur & pars colli inferior illi finitima splendenti nigro tinguntur. Collum superius , dorsum , pennæ scapulares , quæ alas superne vestiunt , superiores caudæ testrices , sicut & crura , sunt obscurè virides. Uropygium coccineum. Colli inferioris pars infima , pectus , venter , latera , inferioresque

rioresque caudæ tectrices sulphureo imbuuntur colore. Pennæ alas subtus obtegentes ex albo flavicant. Remiges sunt nigricantes, exterius viridi obscuro, interius verò albo-flavicante marginatæ. Cauda decem conflatur rectricibus superne obscurè viridibus, infernè viridicinereis. Binæ intermediæ lateralium longitudinem excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis duorum pollicum & trium linearum longitudine cedentem. Oculos circumdat cutis nuda flavicans : ipsorum pupilla est nigra; irides verò luteæ. Nares supra materiam ipsam corneam, prope mandibulæ superioris exortum, collocatæ sunt & conspicuæ. Mandibula superior in parte suprema lutea, ad latera rubra: duos autem colores istos distinguit exigua tania longitudinalis nigra, in utroque mandibulæ superioris latere posita: mandibula inferior nigra, attramen ad basin rubra: aliquid quoque rubri circa nares rostrum tingit. Rostridenticulæ sunt candidæ & multum conspicuæ. Pedes plumbeo colore imbuti; ungues verò nigri.

d'un blanc-jaunâtre. Les plumes de l'aîle sont noirâtres, bordées extérieurement d'un verd obscur, & intérieurement de blanc-jaunâtre. La queue est composée de dix plumes d'un verd obscur en-dessus, & d'un verd-cendré en-dessous. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de deux pouces trois lignes que les deux du milieu. Les yeux sont entourés d'une peau nue & jaunâtre: leur prunelle est noire; & leur iris est jaune. Les narines sont placées sur la matière cornée, tout près de l'origine du demi-bec supérieur, & sont apparentes. Le dessus du demi-bec supérieur est jaune; les côtés en sont rouges: ces deux couleurs sont séparées par une petite bande longitudinale noire, placée sur chaque côté du demi-bec supérieur: le demi-bec inférieur est noir, excepté sa base, qui est rouge: il y a aussi un peu de cette dernière couleur vers les narines. La dentelure du bec est blanche & très-apparente. Les pieds sont de couleur de plomb; & les ongles noirs.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a la tête, la gorge & la partie inférieure du col qui en est la plus voisine, d'un beau marron, tandis que ces parties sont noires dans le mâle. Cette couleur de marron est séparée de la couleur de soufre du dessous du col par une petite bande transversale noire. Du reste elle ressemble parfaitement au mâle.

On les trouve à Cayenne, d'où ils ont été envoyés à M. de Reaumur par M. des Effars.

Fœmina à mare discrepat capite, gutture & parte colli inferioris gutturi finitima elegantè castaneis, dum partes istæ sunt in mare nigræ. Colorem autem castaneum à colli inferioris colore sulphureo distinguit exigua tænia transversa nigra. In reliquis cum mare perfectè convenit.

Habitant in Cayana, unde in museum Realmurianum missæ à D. des Effars.

** 9. LE TOUCAN VERD DU BRÉSIL.

Voyez Pl. XXXIII. Fig. 2.

Tucana superne obscurè viridis, infernè sulphurea; capite, gutture & collo nigris; dorso infimo, uropygio, rectricibus caudæ superioribus & taniâ transversâ in ventre coccineis; rectricibus superne obscurè, infernè dilutè viridibus TUCANA BRASILIENSIS VIRIDIS.

Cuculus Brasiliensis, Aracari Marcgravii. Klein. Avi. pag. 30. N^o. 4. Aracari. Pison. Hist. Nat. pag. 92, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.

Aracari Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 217, in qua hujus icon non satis accurata.

Jonst. Avi. pag. 148. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 60.

Aracari Brasiliensibus Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 96, hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XXII.

Raj. Syn. Avi. pag. 44. N^o. 2.

Oiseau des Terres neuves. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 184, dans laquelle il y a une assez bonne figure du bec.

Oiseau aquatique apporté des Terres neuves. Bel. Portr. d'Ois. pag. 40, dans laquelle est la même figure.

Les Brasiliens l'appellent ARACARI. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Præcedentem crassitie paululum antecellit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem sexdecim pollices & octo lineas æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices cum octo lineis. Rostrum, quod in exortu sexdecim lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos quatuor pollices & duas cum semi lineas longum est; cauda sex pollices & tres lineas; pes sexdecim cum semi lineas; digitorum anteriorum extimus cum ungue unum pollicem & quinque cum semi lineas, intimus tredecim lineas; posticorum exterior sexdecim lineas, interior septem cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & quinque pollicum; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Caput, guttur & collum nigri sunt coloris. In utroque capitis latere exigua extat macula castanea, supra aures posita. Dorsi suprema pars, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices sunt obscurè virides. Dorsum infimum, uropygium & pennæ caudam superne cooperientes coccineæ. Pectus,

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de seize pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces huit lignes. Son bec, qui a à son origine seize lignes d'épaisseur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche quatre pouces deux lignes & demie de long; sa queue six pouces trois lignes; son pied seize lignes & demie; le doigt extérieur de devant, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes & demie, l'intérieur treize lignes; l'extérieur de ceux de derrière seize lignes, & l'intérieur sept lignes & demie. Il a un pied cinq pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La tête, la gorge & le col sont noirs. De chaque côté de la tête est une petite tache de marron, placée sur les oreilles. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont d'un verd obscur. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un rouge vif. La poitrine, le ventre & les côtés sont de couleur de soufre: cette couleur est mêlée d'un peu de rouge

au haut de la poitrine. Sur le ventre est aussi une bande transversale d'un rouge vif, d'environ huit lignes de largeur. Les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un jaune-olivâtre, mêlé confusément d'un peu de rouge & de fauve. Les petites couvertures du dessous des ailes sont d'un verd obscur : les grandes sont d'un cendré foncé. Les plumes de l'aile sont en-dessous de cette dernière couleur ; mais en-dessus les grandes sont noirâtres, & bordées extérieurement de verd obscur : les moyennes sont de cette dernière couleur du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur. La queue est composée de dix plumes d'un verd obscur en-dessus, & d'un verd clair en-dessous. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de trois pouces sept lignes que les deux du milieu. Les yeux sont entourés d'une peau nue & jaunâtre : leur prunelle est noire ; & leur iris est jaune. Les narines sont placées sur la matière cornée, à l'origine du demi-bec supérieur, & sont apparentes. La base du bec est entourée d'une

venter & latera sulphureo imbuuntur colore, cum aliqua in summo pectore rubri mixtura. In ventre quoque extat tania transversa coccinea, octo circiter lineas lata. Crura, inferioresque caudæ rectrices sunt luteo-olivaceæ, cum pauco rubro & fulvo confusè mixtis. Rectrices alarum inferiores minores sunt obscurè virides : majores saturatè cinereæ. Remiges subtus simili cinereo saturato imbutæ, superne verò majores nigricantes, exterius viridi obscuro fimbriatæ : minores in latere exteriori obscurè virides, in interiori nigricantes. Caudam componunt decem rectrices superne obscurè, infernè dilutè virides. Binæ intermediae lateralium longitudinem antecellunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis trium pollicum & septem linearum longitudine cedentem. Oculos circumdat cutis nuda flavicans : ipsorum pupilla est nigra ; irides verò luteæ. Nares in materia ipsa cornea, ad mandibulæ superioris exortum, positæ sunt & conspicuæ. Basim rostri ambit linea can-

didâ, supra rostri superficiem paululùm elevata : mandibula superior alba, latâ tæniâ nigricante, ab ipsius exortu versùs apicem usque protensâ, ibique in acumen desinente, in suprema parte insignita : mandibula inferior nigricans. Rostrum valdè conspicuè denticulatum. Pedes perobscurè virides sive viridi - nigricantes ; ungues verò nigri. Habitat in *Brasilia*, *Surina* & *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Artur*.

ligne blanche, qui s'éleve plus que le reste du bec : le demi-bec supérieur est blanc, & marqué en-dessus d'une large bande noirâtre, qui s'étend depuis son origine jusques vers son bout, où elle se termine en pointe : le demi-bec inférieur est noirâtre. La dentelure du bec est très-apparente. Les pieds sont d'un verd très-obscur ou noirâtre ; les ongles sont noirs. On le trouve au *Brésil*, à *Surinam* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

** 10. LE TOUCAN A COLLIER DE CAYENNE.

Voyez Pl. XXXII. Fig. 2.

Tucana viridi-olivacea ; capite, collo, pectore & medio ventre nigro - chalybeis ; maculâ ad aures flavo-aureâ ; collo superiore torque flavo-aurantio cincto ; rectricibus caudæ inferioribus coccineis ; rectricibus superne viridibus, infernè fuscis, apice castaneis . . . TUCANA CAYANENSIS TORQUATA.

Rostrata viridans, rostro nigro partim rubro. *Linn. Systh. Nat. ed. 6, Gen. 38. sp. 4.*

Rostrata Americana viridans, rostro partim rubro nigro. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXV. sp. 2.*

Pica minor, rostro denticulato, vario. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 141.*

Les François de la Guiane l'appellent GROS-BEC ; QUEUE DE RAT. *Barr.*

Tucanæ Cayanensi viridi paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam trede-

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Toucan verd de Cayenne*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue

est de treize pouces , & jusqu'à celui des ongles d'un pied. Son bec , qui a vers son origine onze lignes & demie d'épaisseur , a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche deux pouces dix lignes de long ; sa queue trois pouces onze lignes ; son pied quatorze lignes & demie ; le doigt extérieur de devant , joint avec l'ongle , quinze lignes & demie , l'intérieur dix lignes & demie ; l'extérieur de ceux de derrière treize lignes & demie , & l'intérieur sept lignes. Il a quatorze pouces trois lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La tête , la gorge , le col , la poitrine & le milieu du ventre sont d'un noir brillant , & tirant sur la couleur d'acier poli. De chaque côté de la tête , vers les oreilles , est cependant une grande tache d'un jaune-doré. Sur la partie supérieure du col le noir est terminé par une bande transversale d'un jaune tirant sur l'orangé , qui forme une espece de collier. Le dos , le croupion , les couvertures du dessus de la queue , le ventre (excepté son milieu) & les côtés sont d'un verd-d'olive. Les jambes sont mêlées de verd-d'olive & de marron. Les couvertures du dessous

cim pollices æquat , & ad extremos ungues unum pedem. Rostrum , versùs ipsius exortum undecim cum semi lineas crassum , ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & decem lineas longum est ; cauda tres pollices cum undecim lineis ; pes quatuordecim cum semi lineas ; digitorum anticorum extimus cum ungue quindecim cum semi lineas , intimus decem cum semi lineas ; posteriorum extimus tredecim cum semi lineas , intimus septem lineas. Alis expansis , extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum & trium linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Caput , guttur , collum , pectus & medium ventrem vestiunt pennæ splendide nigræ , ad chalybis politi colorem vergentes. In utroque tamen capitis latere , circa aures , majuscula extat macula flavo-aurea. In collo superiore color niger taniâ terminatur transversâ flavo - aurantiâ , torquem quodammodo efficiens. Dorsum , uropygium ; superiores caudæ tectrices , venter (medio ipsius excepto) & latera viridi-olivaceo

tinguntur. Crura viridi-olivaceo & castaneo variegantur. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt coccineæ. Testrices alarum inferiores albo-flavicantes : alarum superiores, sicut & pennæ scapulares, virides. Remiges subtus cinereæ, interiùs albo-flavicante marginatæ, superne verò majores fuscæ, oris exterioribus viridibus, interioribus albo-flavicantibus : minores in latere exteriori virides, in interiori fuscæ, albo-flavicante fimbriatæ. Cauda decem constat rectricibus superne viridibus, infernè fuscis, apice castaneis. Binæ intermediæ lateraliū longitudinem excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque binis intermediis unius pollicis & sex linearum longitudine cedentem. Nares in materia ipsa cornea, ad mandibulæ superioris exortum, collocatæ sunt & conspicuæ. Mandibula superior exiguo intervallo ad basim rubra, in reliqua longitudine nigra : mandibula inferior ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque rubra, à medietate ad apicem nigra. Rostrum satis conspicuè den-

de la queue sont d'un rouge vif. Celles du dessous des ailes sont d'un blanc-jaunâtre : celles du dessus des ailes, ainsi que les plumes scapulaires, sont vertes. Les plumes de l'aile sont en-dessous cendrées & bordées intérieurement de blanc-jaunâtre ; mais en-dessus les grandes sont brunes, bordées extérieurement de verd, & intérieurement de blanc-jaunâtre : les moyennes sont vertes du côté extérieur, brunes & bordées de blanc-jaunâtre du côté intérieur. La queue est composée de dix plumes vertes en-dessus, brunes en-dessous, & terminées de marron. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de dix-huit lignes que les deux du milieu. Les narines sont situées sur la matière cornée, à l'origine du demi-bec supérieur, & sont apparentes. Le demi-bec supérieur est rouge dans un petit espace à sa base, & noir dans le reste de sa longueur : le demi-bec inférieur est rouge depuis son origine jusques vers la moitié de sa longueur, le reste est noir. La dentelure du bec est assez apparente. Les pieds sont.

de couleur de plomb ; & les ongles noirs. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Effars*.

ticulatum. Pedes plumbeo colore imbuti ; ungues verò nigri. Habitat in *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. des Effars*.

II. LE TOUCAN JAUNE.

Tucana dilutè lutea ; taniâ utrinque longitudinali à rostro ad pectus usque nigrâ ; rectricibus alarum superioribus minimis luteis ; rectricibus albo & nigro variis **TUCANA LUTEA.**

Xochitenacatl. Jonst. Avi. pag. 119.

Charlet. Exer. pag. 116. N^o. V.

Charlet. Onomazt. pag. 112. N^o. 5.

Alia Xochitenacatl. Euf. Nieremb. pag. 209.

Alia Xochitenacatl, h. e. Tucanæ, seu Picæ Brasiliæ species. Willugh. Ornith. pag. 298.

Il est de la grandeur & de la grosseur d'un *Pigeon*. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un jaune clair. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Une bande longitudinale noire s'étend de chaque côté depuis le bec jusqu'à la poitrine. Les plus petites couvertures du dessus des aîles sont jaunes : les moyennes & les grandes, les plumes scapulaires & les plumes de l'aîle même sont variées de blanc & de noir. La queue est composée de dix plumes de la même couleur que celles de l'aîle. Les

Magnitudine & crassitie *Columbam* adæquat. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ dilutè luteæ. Quæ caudam superne & infernè obtegunt, eodem imbuuntur colore. Utrinque extat tania longitudinalis nigra, à rostro ad pectus usque protensa. Superiores alarum rectrices minimæ sunt luteæ : mediæ & majores, pennæ scapulares, sicut & ipsæ remiges, ex albo & nigro variegatæ. Caudam componunt decem rectrices remigibus concolores. Oculi sunt nigri : ipsorum irides luteæ.

Iuteæ. Rostrum nigrum. Pe- yeux sont noirs ; & leur iris est
des fuscî ; unguës verò ex jaune. Le bec est noir. Les
albo nonnihil lutescentes. pieds sont bruns ; & les ongles
Habitat in Mexico, d'un blanc tirant un peu sur
le jaune. On le trouve au *Me-*
xique.

12. LE TOUCAN BLEU.

Tucana in toto corpore cœruleo & cinereo varia . . .
TUCANA CÆRULEA.

Pica Bressilica secunda. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 803, in qua hujus
icon à Nierembergio mutuata.

Pica Xochitenacatl dicta. Jonst. Avi. pag. 157.

Xochitenacatl. Jonst. Avi. pag. 126. hujus icon à Nierembergio mutuata
Tab. 56, sub titulo, Pica Brasîlica alia, Altera Xochitenacatl.

Altera Xochitenacatl. Euf. Nieremb. pag. 209, in qua hujus icon minimè
accurata.

Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 47. cap. CLXVI.

Les Mexiquains l'appellent XOCHITENACATL. Fern.

Magnitudine & crassitie
cum præcedente convenit.
In toto corpore cœruleo &
cinereo variegatur. Oculi
sunt nigri ; ipsorum irides ex
luteo rubescentes. Mandi-
bula superior lutea ; inferior
verò subnigra , & in purpu-
reum colorem vergens. Ha-
bitat in *Mexico* , ibique ma-
ris littora frequentat, & *Pis-*
cibus victitat.

Il est de la grandeur & de
la grosseur du précédent. Il est
varié par tout le corps de bleu
& de cendré. Ses yeux sont
noirs ; & leur iris est d'un jaune-
rougeâtre. Le demi-bec supé-
rieur est jaune ; l'inférieur est
d'un noirâtre tirant un peu sur
le pourpre. On le trouve au
Mexique , sur le bord de la mer ,
où il se nourrit de *Poissons*.





2. Toucan à gorge blanche de Cayenne .





Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Toucan à gorge jaune de Cayenne. 2. Toucan à gorge blanche de Cayenne.



2. Toucan à collier de Cayenne .





Dessiné et gravé par Martini.

1. Toucan à gorge jaune du Brésil.

2. Toucan à collier de Cayenne.






Fig. 2.

2. Toucan vert du Brésil.






Desorme et Gravé par Martinet.

1. Toucan verd de Cayenne .

2. Toucan verd du Brésil.





ORDO XIV. ORDRE XIV.

A V E S

LES OISEAUX

Digitis quatuor, membranis destitutis, tribus scilicet anticis, uno postico; medio trium anteriorum cum extimo digito trium articulorum spatio, cum intimo primi tantum articuli intervallo artè cohærente: & cruribus ad calcaneum usque plumosis præditæ.

Qui ont quatre doigts, dénués de membranes, trois devant, un derriere; celui du milieu des trois antérieurs étroitement uni au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation, & au doigt intérieur jusqu'à la première: & les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon.

IUJUS Ordinis Avium aliæ rostro donantur brevi, & versùs apicem lateraliter compresso: aliæ rostro conico, ferræ instar denticulato; utriusque mandibulæ apice deorsum incurvo: aliæ rostro recto, longiusculo: aliæ rostro arcuato, acuto: aliæ tandem rostro crasso, falciformi. In quinque sectiones dividuntur: in prima continentur illæ quæ rostrum habent breve, & versùs apicem lateraliter com-

PARMI les Oiseaux de cet Ordre les uns ont le bec court, & comprimé par les côtés vers le bout: d'autres ont le bec conique, dentelé comme une scie; & le bout des deux mandibules courbé en-enbas: d'autres ont le bec droit & assez long: d'autres ont le bec courbé en arc & pointu: d'autres enfin ont le bec gros & en forme de faux. Je les divise en cinq sections: dans la première sont ceux qui ont le bec court, & comprimé par les côtés vers le

bout, comme le *Cog-de-Roche*, le *Manakin* : dans la seconde ceux qui ont le bec conique, dentelé comme une scie ; & le bout des deux mandibules courbé en-enbas, comme le *Momot* : dans la troisième ceux qui ont le bec droit & assez long, comme le *Martin-pêcheur*, le *Todier* : dans la quatrième ceux qui ont le bec courbé en arc & pointu, comme le *Guépier* : & dans la cinquième ceux qui ont le bec gros & en forme de faux, comme le *Calao*.

pressum, ut *Rupicola*, *Manacus* : in secunda illæ quæ rostro donantur conico, serræ instar denticulato ; utriusque mandibulæ apice deorsum incurvo, ut *Momotus* : in tertia ex quæ rostrum habent rectum, longiusculum, ut *Ispida*, *Todus* : in quarta illæ quæ rostro arcuato & acuto præditæ sunt, ut *Apiaſter* : in quinta tandem ex quæ rostrum habent crassum & falciforme, ut *Hydrocorax*.

SECTION I.

Ceux dont le bec est court, & comprimé par les côtés vers le bout.

IL y a dans cette section deux genres d'Oiseaux. Les uns ont la tête ornée d'une hupe longitudinale de plumes, formant un demi-cercle, comme le *Cog-de-roche* : & les autres ont la tête simple, comme le *Manakin*.

Tous les Oiseaux de cette section ont la queue très-courte.

SECTIO I.

Ex quæ rostrum habent breve, & versùs apicem lateraliter compressum.

IN illa sectione duo continentur Avium genera. Aliæ capite donantur ornato corollæ longitudinali plumosa, semicirculari, ut *Rupicola* : aliæ verò capite simpliciori, ut *Manacus*.

Omnes hujus sectionis Alites caudam habent brevissimam.

L V.

L V.

Genus Rupicolæ. (1).

Le genre du Coq-de-Roche. (1).

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis
 destituti; tres scilicet anti-
 ci, posticus unus; medius
 trium anteriorum cum ex-
 timo digito trium articu-
 lorum spatio, cum intimo
 primi tantum articuli in-
 tervallo arcte cohærens :
 Crura ad calcaneum usque
 plumosa :
 Rostrum breve, versus api-
 cem lateraliter compres-
 sum :
 Caput corollâ longitudina-
 li plumosâ, semicircu-
 lari ornatum.

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de mem-
 branes; trois devant, un der-
 rière ; celui du milieu des
 trois antérieurs étroitement
 uni au doigt extérieur jus-
 qu'à la troisième articula-
 tion, & au doigt intérieur
 jusqu'à la première :
 Les jambes couvertes de plu-
 mes jusqu'au talon :
 Le bec court, & comprimé
 par les côtés vers le bout :
 La tête ornée d'une hupe lon-
 gitudinale de plumes, for-
 mant un demi-cercle.

(1) Nomen à me illi inditum ob
 habitationem in rupibus.

(1) On l'appelle ainsi parce qu'il se tient
 sur les rochers.

** I. LE COQ-DE-ROCHE.

Voyez Pl. XXXIV. Fig. 1.

Rupicola aurantia ; corolla taniâ purpureâ præcincta ; rec-
 tricibus decem intermediis primâ medietate aurantiis, ex-
 terius intensius, interius pallidius, alterâ medietate fuscis,
 apice dilute aurantio marginatis, utrinque extimâ fuscâ,
 apice dilute aurantio fimbriatâ, interius primâ medietate
 pallide aurantiâ RUPICOLA.

Gallus ferus, saxatilis, croceus, cristam è plumis constructam gerens.
Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 132.

Upupa crocea. Linn. Systh. Nat. ed. 6, Gen. 45. sp. 2.

Upupa Americana, crocea, saxatilis. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXI.
sp. 2.

Les François de la Guiane l'appellent Coc DES ROCHES. Barr.

Il est de la grosseur d'un *Pigeon Romain*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue trois pouces deux lignes; son pied seize lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes; l'extérieur de ceux de devant quatorze lignes, l'intérieur un pouce; & celui de derrière est de la même longueur que ce dernier. Il a deux pieds un pouce de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les plumes scapulaires sont d'un très-bel orange. Les couvertures du dessus de la queue sont fort longues, & paroissent comme coupées quarrément par le bout: les barbes du bout de ces plumes, soit les extérieures, soit les intérieures, sont longues & réflé-

Cum Columba Romana crassitie convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices æquat, & ad extremos unguis decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda tres pollices cum lineis binis; pes sexdecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas; anticorum extimus quatuordecim lineas, intimus unum pollicem; posticus autem eandem obtinet longitudinem ac anticorum intimus. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & pollicis unius; alæ verò complicatæ tres quartas longitudinis caudæ partes attingunt. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ elegantissimè aurantiæ. Quæ caudam superne & infernè cooperiunt, sicut & scapulares, concolores. Superiores caudæ rectrices maximam obtinent longitudinem & in extremitate quasi

quadratum abscissæ videntur: istarum tectricum extremitatis pinnulæ, tam exteriores quàm interiores, longæ sunt & ad latera reflexæ. Caput ornat corolla longitudinalis plumis conflata aurantiis, octodecim circiter lineas longis, simul referentibus semicirculum, quem versùs ipsius margines cingit stricta tania eleganter purpurea, & cujus deinde margines sunt dilutè aurantiæ. Tectrices alarum inferiores, superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur aurantio ac dorsum ipsum tingitur: sequentes, eæ scilicet quæ medium locum occupant, sunt in latere exteriori aurantiæ, in interiori fuscæ, aurantio diluto terminatæ; quæ omnes ultimæ tectrices, sicut & majores corpori viciniore, in apice quasi quadratum abscissæ apparent: majores tandem alarum tectrices à corpore remotiores fuscæ, albo-flavicante terminatæ. Alam componunt novemdecim remiges fuscæ: sex tamen primores sunt in latere interiori ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque candidæ: reliquæ om-

chies vers les côtés. La tête est ornée d'une hupe longitudinale de plumes orangées, longues d'environ dix-huit lignes, qui forment ensemble un demi-cercle, lequel est entouré vers ses bords d'une étroite bande d'un beau pourpre, & bordé ensuite d'orangé clair. Les couvertures du dessous des aîles, les petites du dessus & les grandes les plus proches du corps sont du même orangé que le dos: les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont orangées du côté extérieur, brunes du côté intérieur, & terminées d'orangé clair; ces dernières, ainsi que les grandes les plus proches du corps, paroissent toutes comme coupées quarrément par le bout: enfin les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & terminées de blanc-jaunâtre. L'aîle est composée de dix-neuf plumes brunes: cependant les six premières sont blanches du côté intérieur depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur: toutes les autres ont aussi une grande partie de leur côté intérieur blanc, & cela vers leurs bords: six des premières, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la septième inclusivement, sont pareillement blanches du côté extérieur,

mais dans leur milieu seulement : les trois suivantes , savoir depuis la huitième jusqu'à la dixième inclusivement , sont fort étroitement bordées du côté extérieur d'un blanc tirant sur l'orangé : les cinq qui suivent , savoir depuis l'onzième jusqu'à la quinzième inclusivement , ont aussi du côté extérieur une assez large bordure d'orangé clair : les trois suivantes , savoir depuis la seizième jusqu'à la dix-huitième inclusivement sont bordées extérieurement d'un bel orangé : la dix-neuvième enfin a tout son côté extérieur de cette dernière couleur. De plus sept des plumes du milieu de l'aile , savoir depuis la septième jusqu'à la treizième inclusivement , sont bordées de blanc sale par le bout : les six suivantes , savoir depuis la quatorzième jusqu'à la dix-neuvième inclusivement , sont aussi bordées par le bout d'un orangé qui est d'autant plus foncé , que la plume est plus proche du corps ; ces six dernières plumes paroissent comme coupées quarrément par le bout ; & de celles-là les quatre plus proches du corps ont leurs barbes extérieures fort longues & réfléchies vers le côté. Les barbes intérieures de la première des plumes de l'aile de-

nes similiter in lateris interioris maxima parte , idque versùs margines , albæ : ex remigibus primoribus sex , à secunda scilicet ad septimam usque inclusivè , simili albo in latere exteriori imbutæ , sed tantùm in ipsarum medio : tres quæ sequuntur , ab octava scilicet ad decimam usque inclusivè , exteriùs stric-
tissimis donantur marginibus ex albo ad aurantium inclinantibus : quinque sequentes , ab undecima scilicet ad decimam-quintam usque inclusivè , in latere quoque exteriori latiusculis marginibus dilutè aurantiis præditæ sunt : tres proximæ , à decima - sexta scilicet ad decimam-octavam usque inclusivè , sunt exteriùs elegantè aurantio fimbriatæ : decima-nona tandem in tota lateris exterioris superficie eleganter aurantia : septem insuper intermediæ remiges , à septima scilicet ad decimam-tertiam usque inclusivè , sunt in apice sordidè albo marginatæ : sex quæ sequuntur , à decima-quarta scilicet ad decimam - nonam usque inclusivè , marginibus quoque donantur in apice aurantiis eò saturationibus , quò remix fit corpori vicinior ; quæ
sex

Sex ultimæ remiges in apice quasi quadratim abscissæ videntur; & ex istis quatuor corpori finitimæ pinnulas habent exteriores longissimas & ad latera reflexas. Primoris remigis pinnulæ interiores fiunt subito valdè brevès, idque ab ipsius apice ad unius pollicis distantiam: quam remigem in icone paululum ab illis remotam esse curavi, ut magis esset conspicua. Remix ista sequentibus nonnihil longitudine cedit: quarta & quinta reliquarum omnium longitudinem antecellunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum decem intermediæ ab ipsarum exortu ad mediam circiter longitudinem usque in latere exteriori elegantè aurantiæ, in interiori aurantiæ quidem, sed valdè pallidè, alterâ medietate fuscæ, apice dilutè aurantio marginatæ: utrinque extrema fusca, attamen in latere interiori ab ipsius exortu ad mediam circiter longitudinem usque pallidè aurantia, & decem rectricum intermediarum instar, apice dilutè aurantio fimbriata. Duodecim rectrices in apice quasi quadratim abscissæ videntur. Rostrum, pedes, unguesque lutei. Habitat in *Surina* & *Guiana* tota. *Ex museo D. Aubry.*

viennent tout-à-coup extrêmement courtes, & cela à un pouce de distance de son bout: j'ai fait un peu écarter cette plume des autres dans la figure, afin qu'on la vit plus aisément. Cette plume est un peu plus courte que les suivantes: la quatrième & la cinquième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes: les dix du milieu sont depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur d'un bel orangé du côté extérieur; & d'un orangé très-pâle du côté intérieur; l'autre moitié est brune, & bordée par le bout d'un orangé clair: la plus extérieure de chaque côté est brune, excepté son côté intérieur, qui est d'un orangé pâle depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur; elle est aussi, comme les dix du milieu, bordée par le bout d'un orangé clair. Les douze plumes de la queue paroissent comme coupées quarrément par le bout. Le bec, les pieds & les ongles sont jaunes. On le trouve à *Surinam* & dans toute la *Guiane*. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

Le Genre du Manakin. (1).

Genus Manaci. (1).

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant , un derrière ; celui du milieu des trois antérieurs étroitement uni au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation , & au doigt intérieur jusqu'à la première :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

Le bec court & comprimé par les côtés vers le bout :

La tête simple.

(1) *Manakin* nom qu'ont donné les Hollandais à quelques espèces de ce genre.

Hujus character est
Digiti quatuor , membranis destituti ; tres scilicet antici , posticus unus ; medius trium anteriorum cum extremo digito trium articularum spatio , cum intimo primi tantum articuli intervallo arcte cohaerens :

Crura ad calcaneum usque plumosa :

Rostrum breve , versus apicem lateraliter compressum :

Caput simplex.

(1) *Manacus* nomen latinum ex nomine Belgico *Manakin* à me constatum.

** I. LE MANAKIN.

Manacus superne nigricans , infernè albus ; capite superiore nigro ; collo superiore torque albo cincto ; rectricibus alarum superioribus minoribus candidis ; rectricibus superne nigricantibus , subtus saturatè cinereis . . . MANACUS.

Avis anonyma secunda. Marcgr. Hist. Br. pag. 219.

Jonst. Avi. pag. 150.

Manakin chaperonné de noir. Edwards. Glanur. pag. 107. Chap. L ; avec une figure exacte Pl. 260.

Les Anglois l'appellent BLACK-CAPPED MANAKIN. Edwards.

Il est à peu près de la grosseur du *Becfigue*. Sa longueur Crassitie *Ficedulam* circiter aemulatur. Ipsi longi-

tudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues quatuor pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex lineas longum est; cauda quatuordecim lineas; pes septem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex lineas : laterales paulò sunt breviores; posticus autem anticorum medium longitudine ferè adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est octo pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ ad caudam ferè extremam pertingunt. Vertex capitis & occipitium nigri sunt coloris. Colli superioris suprema pars, dorsum, uropygium, superiores caudæ rectrices & scapulares pennæ sunt nigricantes. Genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam subtus obtegentes, alarumque rectrices minores superiores & inferiores albicant. Albedo autem supra colli superioris partem infimam protenditur, ibique taniam transversam efficit, quæ torquem quodammodo efformat. Tec-

depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces cinq lignes. Son bec a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche six lignes de long; sa queue quatorze lignes; son pied sept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est presque aussi long que celui du milieu de ceux de devant. Il a huit pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête & l'occiput sont noirs. Le haut de la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont noirâtres. Les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, les petites du dessus & du dessous de l'aile & les côtés sont blancs. Cette couleur s'étend sur le bas de la partie supérieure du col en une bande transversale, & y forme une espece de collier. Les grandes couvertures du dessus des aîles sont noirâtres : les grandes

du dessous sont d'un cendré foncé. Les plumes de l'aile sont noirâtres en - dessus, & d'un cendré foncé en - dessous. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles de l'aile. Le bec est noir. Les pieds sont d'un jaune-orangé; & les ongles noirâtres. On le trouve au *B Brésil* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

trices alarum majores superiores sunt nigricantes : majores inferiores saturatè cinereæ. Remiges superne nigricant, subtus cinereo tinguntur saturato. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concoloris. Rostrum nigrum. Pedes flavo - aurantii; ungues verò nigricantes. Habitat in *Brasilia* & *Cayana*, unde in *musæum Reaumurianum* missus à *D. des Essars*.

** 2. LE MANAKIN A GORGE BLANCHE.

Voyez *Pl. XXXVI. Fig. 1.*

Manacus nigro - chalybeus ; gutture & collo inferiore candidis ; remigibus decem primoribus interiùs plus minùs albis ; reëtricibus nigris , exteriùs nigro - chalybeo marginatis *MANACUS GUTTURE ALBO.*

Il est beaucoup moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pouces huit lignes , & jusqu'à celui des ongles de trois pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatre lignes & demie de long ; sa queue quatorze lignes ; son pied six lignes & demie ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle ,

Præcedenti multùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pollices & octo lineas explet , & ad extremos ungues tres pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor cum semi lineas longum est ; cauda quatuordecim lineas ; pes sex cum semi lineas ; & trium digito-

rum anticorum medius cum ungue quinque lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem cum anticorum intimo longitudine convenit. Alis expansis , extremitates majorum remigum sex pollicum & totidem linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ caudam extremam , exceptâ tamen duarum cum semî linearum distantîâ , pertingunt. Caput , partem colli superiorem , dorsum & uropygium vestiant pennæ nigræ splendentes , chalybis politi colore refulgentes. Quæ caudam superne cooperiunt , tectrices alarum superiores minores , sicut & scapulares , concolores. Guttur & collum inferius candore nitent : qui candor supra pectus in acumen extenditur. Reliquum pectus , venter , latera , crura , inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes nigro quoque imbuuntur chalybis politi colore refulgente , sed minùs quàm in dorso splendido. Superiores alarum tectrices majores sunt in latere exteriori & apice dorso concolores , in latere interiori penitus nigræ. Novemdecim remigibus ala conflatur : de-

cinq lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a six pouces six lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à deux lignes & demie de distance du bout de la queue. La tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les couvertures du dessus de la queue , les petites du dessus des aîles & les plumes scapulaires sont d'un noir qui brille d'une couleur d'acier poli. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches : cette couleur descend en pointe sur la poitrine. Le reste de la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un noir qui brille aussi d'une couleur d'acier poli , mais moins éclatante que sur le dos. Les grandes couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur que le dos du côté extérieur & à leur bout , & tout-à-fait noires du côté intérieur. L'aîle est composée de dix-neuf plumes : les dix premières sont noires , & bordées extérieurement , mais très-étroitement , d'une couleur d'acier poli : ces dix plumes sont blanches du côté intérieur , mais

elles le sont d'autant moins, qu'elles sont plus éloignées du corps ; de façon que la première n'a qu'une très-étroite bordure blanche, tandis que cette couleur traverse toute la largeur des neuvième & dixième plumes : les neuf autres sont noires, & bordées extérieurement & par le bout d'une couleur d'acier poli, cette bordure étant beaucoup plus large que celle des premières. La queue est composée de douze plumes noires, bordées extérieurement de couleur d'acier poli. Le demi-bec supérieur est noirâtre, & l'inférieur est blanc. Les pieds & les ongles sont rouges. *Du cabinet de Madame de Bandeville, & de celui de M. Mauduyt.*

cem primores nigræ ; exteriùs chalybis polito colore fimbriatæ, idque strictissimè : decem istæ remiges sunt in latere interiore albæ ; sed eò minorem obtinent albedinem, quò fiunt à corpore remotiores ; ita ut prior strictissimâ tantùm margine albâ prædita sit, dum albedo in remige nona, sicut & in decima, per totam latitudinem extenditur : novem reliquæ nigræ, in latere exteriore & apice chalybis polito colore marginatæ, quæ margo multò majorem quàm in præcedentibus remigibus obtinet latitudinem. Cauda duodecim constat rectricibus nigris, exteriùs nigro-chalybeo marginatis. Mandibula superior nigricans, inferior alba. Pedes, unguesque rubri. *Ex museis D. de Bandeville & D. Mauduyt.*

** 3. LE MANAKIN A TESTE BLANCHE.

Voyez Pl. XXXV. Fig. 2.

Manacus nigro-chalybeus ; capite superiore candido ; rectricibus lateralibus fuscis, exteriùs nigro-chalybeo marginatis MANACUS ALBO-CAPILLUS.

Passer toto corpore niger ; vittâ albâ. Klein. Avi. pag. 50. N°. 17. Avicula de Cacatotoatl, toto corpore nigrâ, cum vitta alba. Seb. Vol. II. pag. 102. hujus icon satis accurata Tab. XCVI. fig. 5.

Avicula anonyma. Marcgr. Hist. Br. pag. 205.

Jonst. Avi. pag. 140.

Manakin chaperonné de blanc. *Edwards. Glanur. pag. 107. Chap. L;*
avec une figure passable, mais pas assez bien coloriée. *Pl. 260.*

Les Anglois l'appellent WHITE-CAPPED MANAKIN. *Edwards.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pollices & quatuor lineas æquat, & ad extremos ungues tres pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor cum semi lineas longum est; cauda decem lineas; pes quinque lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet : laterales multò sunt breviores; & posticus anticorum intimi longitudinem æmulatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est septem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad duas usque lineas ultra caudæ extremitatem protenduntur. Capitis superior pars tota candore nitet. In universo reliquo corpore, capite scilicet ad latera, gutture, collo, dorso, uropygio, pectore, ventre, lateribus & cruribus, nigro imbitur splendido, chalybis politi colore resurgente. Pennæ scapula-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatre lignes & demie de long; sa queue dix lignes; son pied cinq lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle; a aussi cinq lignes de longueur: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a sept pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux lignes au-delà du bout de la queue. Toute la partie supérieure de la tête est d'un beau blanc. Tout le reste du corps, sçavoir les côtés de la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes, est d'un noir qui brille d'une couleur d'acier poli. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & cel-

les du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les plumes de l'aile sont brunes, & bordées extérieurement d'un noir qui brille d'une couleur d'acier poli. La queue est composée de douze plumes brunes en-dessous ; mais en-dessus les deux du milieu sont de la même couleur que le dos : toutes les latérales sont brunes, & bordées extérieurement d'un noir qui brille d'une couleur d'acier poli. Le bec est d'un gris-brun. Les pieds & les ongles sont rougeâtres. On le trouve au Brésil & à Surinam. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

res, alas superne & inferne vestientes, rectricesque caudæ superiores & inferiores eodem colore tinguntur. Remiges sunt fuscae, oris exterioribus nigris, chalybis polito colore resplendentibus præditæ. Caudam componunt duodecim rectrices subtus fuscae ; superne verò binæ intermediae dorso concolores : laterales omnes fuscae, exteriùs nigro-chalybeo marginatæ. Rostrum griseo-fuscum. Pedes, unguesque rubescentes. Habitat in *Brazilia & Surina. Ex museo D. Aubry.*

** 4. LE MANAKIN A TESTE D'OR.

Voyez Pl. XXXIV. Fig. 2.

Manacus nigro-chalybeus ; capite aureo, coccineo mixto ; cruribus albis, exteriùs in infima parte coccineis ; rectricibus lateralibus nigris, exteriùs nigro-chalybeo marginatis . . . MANACUS AURO-CAPILLUS.

Linaria Mexicana. Klein. Avi. pag. 94. N°. 7.

Parus auro-capillus. Klein. Avi. pag. 86. N°. 13.

Avicula nigra, capite è luteo croceo. Petiv. Gaz. Nat. hujus icon satis accurata (exceptis pedibus) Tab. XLVI. fig. 13.

Avicula Mexicana de Chichiltototl. Seb. Vol. I. pag. 96. hujus icon satis accurata (exceptis pedibus) Tab. LX. fig. 7.

Mésange noire à la tête dorée. *Edwards. Tom. I. pag. XXI ; avec une assez bonne figure Pl. 21.*

Il est à peu près de la grosseur des deux précédens. Sa

Crassitie præcedentes binos circiter adæquat. Ipsius longitudo

longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem tres pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues tres pollices cum octo lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque lineas longum est; cauda novem lineas; pes sex lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque lineas : laterales paulò sunt breviores; posticus autem cum anticorum intimo longitudine convenit. Alis expansis, extremitates majorum remigum sex pollicum & totidem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput vestiunt pennæ elegantissimo aureo colore resplendentes, cum aliqua coccineæ mixtura, præsertim in occipite, in quo pennæ apicibus dominantur coccineis. Quæ totum obtegunt reliquum corpus, guttur scilicet, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem & latera, sicut & pennæ scapulares, caudam superne & infernè cooperientes, tectrices alarum inferiores & minores superiores, sunt splendidè nigræ, chalybis politi colore refulgentes. Crura alba, attamen

Tom. IV.

longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a cinq lignes de long; sa queue neuf lignes; son pied six lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a six pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête est couverte de plumes d'une belle couleur d'or, mêlée d'un peu de rouge vif, sur-tout vers l'occiput, où les plumes sont terminées de cette couleur. Celles qui couvrent tout le reste du corps, sçavoir la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre & les côtés, ainsi que les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les petites du dessus, sont d'un noir qui brille d'une couleur d'acier poli. Les jambes sont blanches, excepté dans la partie inférieure de leur côté extérieur, où elles sont d'un

rouge vif. Les grandes couvertures du dessus des ailes & toutes les plumes de l'aile sont noirâtres, & bordées extérieurement d'un noir du même brillant que celui du dos. La queue est composée de douze plumes noirâtres en-dessous ; mais en-dessus les deux du milieu sont de la même couleur que le dos : toutes les latérales sont noirâtres, & bordées extérieurement d'un noir qui brille d'une couleur d'acier poli. Le bec est blanchâtre. Les pieds & les ongles sont jaunes. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

in lateris exterioris infima parte coccinea. Rectrices alarum superiores majores, sicut & remiges omnes, sunt nigricantes, oris exterioribus eodem imbutis nigro splendenti ac dorsum ipsum tingitur. Caudam componunt duodecim rectrices subtus nigricantes, superne verò binæ intermediæ dorso concolores : laterales omnes nigricantes, exterius nigro-chalybeo marginatæ. Rostrum candicans. Pedes, unguesque lutei. Habitat in *Cayana*, unde in museum *Realmurianum* missus à *D. des Essars*.

5. LE MANAKIN A TESTE ROUGE.

Manacus nigro-chalybeus ; capite coccineo ; cruribus albis, exterius in infima parte coccineis ; rectricibus lateralibus nigricantibus, exterius nigro-chalybeo marginatis . . .
MANACUS RUBRO-CAPILLUS.

Linaria Mexicana. Klein. Avi. pag. 94. N°. 7.

Avicula Mexicana de Chichiltototl, altera. Seb. Vol. I. pag. 96. hujus icon satis accurata (exceptis pedibus) Tab. LX. fig. 8.

Tangara. Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 557.

Jonst. Avi. pag. 125.

Tangaræ secunda species Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 215.

Jonst. Avi. pag. 147.

Tangaræ alia species. Raj. Syn. Avi. pag. 84. N°. 14.

Tangara Brasiliensibus secunda species Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 177.

Les Brasiliens l'appellent TANGARA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Il est de la même grosseur *Manacum auro-capillum*

crassitie circiter æmulator. Ipsi-
us longitudo ab apice
rostri ad caudæ extremitatem
tres pollices & quatuor cir-
citer lineas æquat, & ad ex-
tremos unguës tres pollices
& octo lineas. Rostrum ab
ipsius apice ad oris angulos
quinque lineas longum est ;
cauda novem lineas ; pes sex
lineas ; & trium digitorum
anticorum medius cum un-
gue quinque lineas : latera-
les paulò sunt breviores ; pos-
ticus autem anticorum inti-
mi longitudinem adæquat.
Alæ complicatæ ad caudam
firmè extremam pertingunt.
Caput obtegunt pennæ coc-
cinæ. Quæ totum vestiunt
reliquum corpus, guttur sci-
licet, collum, dorsum, uro-
pygium, pectus, ventrem &
latera, sicut & pennæ sca-
pulares, quæ caudam super-
ne & infernè cooperiunt,
tectrices alarum inferiores,
& minores superiores, nigro
imbuuntur splendido, chaly-
bis polito colore refulgente.
Crura alba sunt, exceptâ ta-
men lateris exterioris infimâ
parte, in qua coccineo co-
lore tinguntur. Tectrices ala-
rum superiores majores, si-
cut & remiges omnes, ni-
gricant, orisque donantur
exterioribus eodem imbutis

que le *Manakin à tête d'or*. Sa
longueur depuis le bout du bec
jusqu'à celui de la queue est
d'environ trois pouces quatre
lignes, & jusqu'à celui des on-
gles de trois pouces huit lig-
nes. Son bec depuis son bout
jusqu'aux coins de la bouche a
cinq lignes de long ; sa queue
neuf lignes ; son pied six lignes ;
& celui du milieu des trois
doigts antérieurs, joint avec
l'ongle, cinq lignes : les laté-
raux sont un peu plus courts ;
& celui de derriere est de la
même longueur que l'intérieur
de ceux de devant. Ses aîles,
lorsqu'elles sont pliées, s'éten-
dent presque jusqu'au bout de
la queue. La tête est couverte
de plumes d'un rouge vif. Cel-
les qui couvrent tout le reste
du corps, sçavoir la gorge,
le col, le dos, le croupion,
la poitrine, le ventre & les cô-
tés, ainsi que les plumes sca-
pulaires, les couvertures du
dessus & du dessous de la queue,
celles du dessous des aîles &
les petites du dessus, sont d'un
noir qui brille d'une couleur
d'acier poli. Les jambes sont
blanches, excepté dans la par-
tie inférieure de leur côté ex-
térieur, où elles sont d'un rou-
ge vif. Les grandes couvertu-
res du dessus des aîles & tou-
tes les plumes de l'aîle sont

noirâtres , & bordées extérieurement d'un noir du même brillant que celui du dos. La queue est composée de douze plumes noirâtres en-dessous ; mais en-dessus les deux du milieu sont de la même couleur que le dos : toutes les latérales sont noirâtres , & bordées extérieurement d'un noir qui brille d'une couleur d'acier poli. Les yeux sont noirs. Le bec est d'un jaune obscur. Les pieds & les ongles sont cendrés. On le trouve au *Brésil* & au *Mexique*.

nigro splendenti ac dorsum ipsum tingitur. Cauda duodecim constat rectricibus subtus nigricantibus ; superne autem binæ intermediae sunt dorso concolores : laterales omnes nigricant , & in latere exteriori nigro marginantur splendido , chalybis politici colore refulgente. Oculi sunt nigri. Rostrum obscurè luteum. Pedes , unguisque cinerei. Habitat in *Brasilia* & *Mexico*.

** 6. LE MANAKIN ROUGE.

Voyez *Pl. XXXIV. Fig. 3.*

Manacus nigro-chalybeus ; capite , gutture , collo & pectore sive coccineis sive aurantiis ; medio ventre rubro mixto ; marginibus alarum luteis ; remigibus interiùs maculâ candidâ notatis ; rectricibus lateralibus nigricantibus , exteriùs nigro-chalybeo marginatis *MANACUS RUBER*.

Avicula fortè *Surinamenfis* è nigro rubroque mixta. *Petiv. Gaz. Nat. hujus icon satis accurata (exceptis pedibus) Tab. XLVI. fig. 12.*

Il est à peu près de la grosseur du *Becfigue*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pouces neuf lignes , & jusqu'à celui des ongles de trois pouces onze lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six lignes de long ; sa queue un pouce ; son

Craillie *Ficedulam* circiter adæquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pollices & novem lineas explet , & ad extremos ungues tres pollices & undecim lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex lineas longum est ; cauda unum polli-

cem; pes sex cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus cum anticorum intimo longitudine convenit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est septem pollicum & totidem linearum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput, guttur, collum & pectus tingit color in aliis coccineus, in alteris elegantissimè aurantius. In individuïs quorum partes istæ coccineo tinguntur colore, basim rostri ambiunt plumulæ aurantiæ. In utrisque omnes istæ pennæ sunt in exortu candidæ; qui candor, dum pennæ aliæ aliis incumbunt, nullo modo est conspicuus. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, rectrices caudæ superiores & inferiores, venter & latera splendido imbuuntur nigro, chalybis politi colore refulgente: nigredini autem in medio ventre paululùm rubri admiscetur. Crura sunt grisea. Inferiores alarum rectrices pallidè flavæ. Alarum margines, versùs articulum

pied six lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a sept pouces sept lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col & la poitrine sont d'un rouge vif dans les uns, & d'un très-bel orangé dans d'autres. Dans ceux dont ces parties sont rouges, la bâte du bec est entourée de petites plumes orangées. Dans les uns & les autres toutes ces plumes sont blanches à leur origine; mais cette couleur ne paroît pas lorsqu'elles sont couchées les unes sur les autres. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes, celles du dessus & du dessous de la queue, le ventre & les côtés sont d'un noir qui brille d'une couleur d'acier poli: cette couleur est mêlée au milieu du ventre d'un peu de rouge. Les jambes sont grises. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un jaune pâle. Le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, est jaune. Les plumes de

l'aîle sont noirâtres , & bordées extérieurement d'un noir qui brille d'une couleur d'acier poli : de plus toutes sont marquées du côté intérieur d'une tache blanche , qui est d'autant plus grande , que la plume est plus proche du corps. La queue est composée de douze plumes noirâtres en-dessous ; mais en-dessus les deux du milieu sont de la même couleur que le dos : toutes les latérales sont noirâtres , & bordées extérieurement d'un noir qui brille d'une couleur d'acier poli. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont rouges. On le trouve à Cayenne , d'où il a été envoyé à M. de Reaumur par M. des Effars.

carpo humano respondentem , luteæ. Remiges nigricantes , in latere exteriori nigro - chalybeo marginatæ : omnes insuper sunt interioribus maculâ notatâ candidâ , eò majore , quò remix fit corpori vicinior. Caudam componunt duodecim rectrices subtus nigricantes ; superne verò binæ intermediæ dorso concolores : laterales omnes nigricantes , exterioribus nigro-chalybeo marginatæ. Rostrum nigrum. Pedes , unguesque rubri. Habitat in Cayenna , unde in museum Reaumurianum missus à D. des Effars.

7. LE MANAKIN ORANGÉ.

Manacus niger ; capite , gutture , collo , pectore , ventre & marginibus alarum aurantiis ; remigibus interioribus maculâ candidâ notatis ; rectricibus nigris MANACUS AURANTIUS.

Manakin noir & jaune. *Edwards. Tom. II. pag. LXXXIII ; avec une figure exacte Pl. 83.*

Il est de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ trois pouces neuf lignes , & jusqu'à celui des ongles de trois pouces onze lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la

Cum præcedente crassitie convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pollices & novem circiter lineas æquat , & ad extremos ungues tres pollices & undecim lineas. Rostrum ab ipsius apice ad

oris angulos usque sex lineas longum est; cauda unum pollicem; pes sex cum semi lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue quinque cum semi lineas; laterales multò sunt breviores; posticus autem anteriorum intimum longitudine æmulatur. Alæ complicatæ ferè ad caudæ extremitatem usque protenduntur. Caput, guttur, collum, pectus, ventrem & latera vestiunt pennæ aurantiæ. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores nigro tinguntur colore. Crura aurantio & nigro variegantur. Inferiores alarum tectrices, sicut & ipsarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, sunt fordidè aurantiæ. Remiges nigre, in latere interiore maculâ notatæ candidâ, eò majore, quò remix fit corpori vicinior. Duodecim rectricibus nigris cauda conflatur. Rostrum candidum. Pedes, unguesque obscurè fusci. Habitat in *Americæ meridionalis* calidis regionibus.

bouche a six lignes de long; sa queue un pouce; son pied six lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre & les côtés sont orangés. Le dos & le croupion sont noirs. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les jambes sont variées d'orangé & de noir. Les couvertures du dessous des aîles, ainsi que le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, sont d'un orangé sale. Les plumes de l'aîle sont noires, & marquées du côté intérieur d'une tache blanche, qui est d'autant plus grande, que la plume est plus proche du corps. La queue est composée de douze plumes noires. Le bec est blanc. Les pieds & les ongles sont d'un brun obscur. On le trouve dans les pays chauds de l'*Amérique méridionale*,

8. LE MANAKIN A COLLIER.

Manacus niger ; capite coccineo ; collo torque aureo cincto ;
 alis saturatè cœruleis , rectricibus nigris *MANACUS*
TORQUATUS.

Avis germinis Maizy de Miacatototl , Brasiliensis. Seb. Vol. I. pag. 92.
hujus icon non satis accurata Tab. LVII. fig. 3.
Les Brasiliens l'appellent MAIZI DE MIACATOTOTL. Seb.

Il est à peu près de la grosseur du *Manakin à tête d'or*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ trois pouces cinq lignes , & jusqu'à celui des ongles de trois pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatre lignes & demie de long ; sa queue dix lignes ; son pied cinq lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , quatre lignes & demie : les latéraux sont beaucoup plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête est d'un rouge vif : cette couleur est suivie d'une bande de couleur d'or , qui entoure la gorge & le col , & forme une espèce de collier. Le col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , la poitrine ,

Manacum auro-capillum
 crassitie circiter æmulatur. Iplius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tres pollices & quinque circiter lineas æquat , & ad extremos ungues tres pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor cum semi lineas longum est ; caudæ decem lineas ; pes quinque lineas ; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue quatuor cum semi lineas : laterales multò sunt breviores ; & pollicis cum anteriorum intimo longitudine convenit. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput coccineo imbuatur colore ; quem sequitur tania aureo colore refulgens , guttur columque cingens , & torque quodammodo efformans. Collum , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , pectus , venter , latera , crura ,

ra, rectricesque caudæ superiores & inferiores nigri sunt coloris. Superiores alarum rectrices, sicut & remiges, sunt saturatè cœruleæ. Duodecim rectricibus nigris cauda constat. Rostrum, pedes, unguisque dilutè lutei. Habitat in *Brasilia*.

le ventre, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les côtés sont noirs. Les couvertures du dessus des aîles, ainsi que les plumes de l'aîle, sont d'un bleu foncé. La queue est composée de douze plumes noires. Le bec, les pieds & les ongles sont d'un jaune clair. On le trouve au *Brésil*.

** 9. LE MANAKIN A FRONT BLANC.

Voyez Pl. XXXVI. Fig. 2.

Manacus splendidè niger; syncipite primùm albo-argenteo, dein cœruleo-beryllino; uropygio splendidè cyaneo; ventre aurantio; rectricibus caudæ inferioribus viridi-olivaceis; rectricibus splendidè nigris MANACUS ALBA FRONTE.

Cum *Manaco albo-capillo* crassitie circiter convenit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues tres pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex lineas longum est; cauda unum pollicem; pes sex cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem lateraliùm

Tom. IV.

Il est à peu près de la grosseur du *Manakin à tête blanche*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six lignes de long; sa queue un pouce; son pied six lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est un peu plus

M m m

long que ces derniers. Il a six pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue & même au-delà. Le synciput est couvert de petites plumes noires à leur origine , ensuite d'un bleu d'Aigue-marine , & terminées d'un blanc-argenté ; mais de façon qu'il n'y a presque que cette dernière couleur qui paroisse : cependant de ces plumes les plus proches du sommet de la tête n'ont point de blanc , & sont terminées de bleu d'Aigue-marine. Tout le reste de la tête , la gorge , le col , la poitrine , le dos , les plumes scapulaires , & les couvertures du dessus & du dessous des ailes sont d'un noir de velours. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un bleu très-éclatant. Le ventre est d'un orangé très-brillant. Les plumes qui couvrent les côtés , sont variées d'orangé & de noir. Les jambes sont noires. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd-d'olive. Les plumes de l'aile sont d'un noir de velours. La première est extrêmement courte : la troisième est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles des

longitudinem paululum excedit. Alis expansis , extremitates majorum remigum sex pollicum & totidem linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes usque , & etiam ultrà , protenduntur. Synciput cooperiunt plumulæ in exortu nigræ , dein cœruleo-beryllinæ , ad apicem albo-argenteæ ; ita tamen ut albo-argenteus color ferè solus sit conspicuus : at tamen inter plumulas istas capitis vertici viciniores nil habent albi , sed cœruleo-beryllino terminantur. Totum reliquum caput , guttur , collum , pectus , dorsum , pennæ scapulares , alarumque tectrices superiores & inferiores nigro tinguntur holoserici villosi instar splendido. Uropygium & superiores caudæ tectrices sunt splendidissimè cyanæ. Venter lucidissimè aurantius. Latera vestiunt pennæ aurantio & nigro variegatæ. Crura sunt nigra. Inferiores caudæ tectrices viridi-olivaceæ. Remiges nigro holoserici villosi instar splendenti imbutæ. Remix prima valdè brevis est : tertia reliquas omnes longitudine superat. Caudam componunt duodecim

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XIV.* 459
 rectrices remigibus concoloribus. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in Cayana. Ex museis D. de Bandeville & D. Mauduyt. ailes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à Cayenne. Du cabinet de Madame de Bandeville, & de celui de M. Mauduyt.

** 10. LE MANAKIN NOIR HUPÉ.

Voyez Pl. XXXV. Fig. 1.

Manacus cristatus, splendide niger; cristâ clypeiformi, coccineâ; dorso supremo & tectricibus alarum superioribus minimis dilute cœruleis; rectricibus splendide nigris...
 MANACUS CRISTATUS NIGER.

Tije-guacu Brasiliensibus. Marcgr. *Hist. Br. pag. 212, in qua hujus icon pessima.*

Jonst. Avi. pag. 145. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 60, sub titulo, Tangara.

Tije-guacu Brasiliensibus Marcgravii. Willugh. *Ornith. pag. 159.*
 Les Brasiliens l'appellent TIJE-GUACU. Marcgr. *Jonst. Willugh.*

Craffitie *Manacum rubrum* nonnihil antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues quatuor pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex cum semi lineas longum est; cauda quindecim lineas; pes octo lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; posticus autem cum anticorum intimo lon-

Il est un peu plus gros que le *Manakin rouge*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six lignes & demie de long; sa queue quinze lignes; son pied huit lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'intérieur de ceux

M m m ij

de devant. Il a huit pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête , la gorge , le col , la partie inférieure du dos , le croupion , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessus & du dessous de la queue , & celles du dessous des ailes sont d'un beau noir de velours. Sur la tête est une espece de hupe , en forme de bouclier , composée de plumes longues & étroites , d'un rouge très-vif. La partie supérieure du dos , les plumes scapulaires & les plus petites couvertures du dessus des ailes , sçavoir , celles qui sont depuis le pli de l'aile qui répond à celui du poignet , jusqu'au corps , sont d'un bleu clair. Les moyennes & les grandes couvertures du dessus des ailes sont d'un noir de velours. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres : les moyennes sont , comme leurs couvertures , d'un beau noir de velours. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aile. L'iris des yeux est d'un bleu de Saphir. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont rouges. On le trouve au *Bresil* & à *Cayenne* , d'où il a été en-

gitude convenit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est octo pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput , guttur , collum , dorso partem infimam , uropygium , pectus , ventrem , latera & crura vestiunt pennæ nigræ holoserici villosi instar splendentes. Quæ caudam superne & infernè cooperiunt , alarumque tectrices inferiores concolores. Quamdam in capite gerit cristam clypeiformem , pennis conflata longis , strictioribus & coccineis. Dorsi suprema pars , pennæ scapulares & tectrices alarum superiores minimæ , illæ scilicet quæ alam ab articulo carpo humano respondente ad corpus usque vestiunt , sunt dilutè cœruleæ. Tectrices alarum superiores mediæ & majores nigro holoserici villosi instar splendido imbutæ. Remiges majores nigricantes : minores , ut ipsarum tectrices , nigræ holoserici villosi instar splendentes. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores. Oculorum irides cœruleo Saphirino imbutæ. Rostrum nigrum. Pedes , unguesque

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XIV.* 451
 rubri. Habitat in *Brasilia* & voyé à *M. de Reaumur* par *M.*
Cayana, unde in *musæum* des *Essars*.
Realmurianum missus à *D.*
 des *Essars*.

II. LE MANAKIN ROUX HUPÉ.

Manacus cristatus, rufo-luteus; cristâ luteâ; rectricibus alarum superioribus dilutè flavis; remigibus, rectricibusque cœruleis. . . . MANACUS CRISTATUS RUFUS.

Falcinellus Rubetra. Klein. Avi. pag. 108. N°. 10.
Avis Americana, cristata, Rubetra dicta. Seb. Vol. I. pag. 160. hujus icon non satis accurata Tab. CII. fig. 4.

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & tres lineas explet. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex cum semi lineas longum est; cauda quindecim lineas. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Partem capitis superiorem obtegunt pennæ luteæ, longiusculæ, cristam efficientes. Reliquum caput, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crura, rectricesque caudæ superiores & inferiores ex rufo lutescunt. Guttur rufum est. Superiores alarum rectrices sunt dilutè flavæ. Remiges splendidè cœruleæ.

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six lignes & demie de long; sa queue quinze lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes jaunes, assez longues, & qui forment une hupe. Le reste de la tête, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un roux - jaunâtre. La gorge est brune. Les couvertures du dessus des ailes sont

d'un jaune clair. Les plumes de l'aile sont d'un bleu éclatant. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec est jaune. On le trouve en *Amérique*.

Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Rostrum flavo imbutum. Habitat in *America*.

12. LE MANAKIN ROUGE HUPÉ.

Manacus cristatus, purpureus; cristâ luteâ; rectricibus rubris *MANACUS CRISTATUS RUBER*.

Passer cristatus, rostro rubro. *Klein. Avi. pag. 90. N^o. 14.*

Avis Piciciti Brasiliensis, minima, cristata. *Seb. Vol. I. pag. 95. hujus icon non satis accurata Tab. LIX. fig. 4.*

Les Brasiliens l'appellent PICICITLI. Seb.

Il est un peu moins gros que le *Manakin à collier*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatre lignes & demie de long; sa queue quinze lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes jaunes, assez longues, & qui forment une hupe. Le reste de la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus & du

Manaco torquato nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tres pollices & sex lineas æquat. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor cum semi lineas longum est; cauda quindecim lineas. Alæ complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ luteæ, longiusculæ, cristant efficientes. Reliquum caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crura, pennæ scapulares, quæ alas superne & infernè cooperiunt, rectricesque caudæ superiores & inferiores purpureo colore

quibusdam in partibus saturato, in aliis dilutiore tinguntur. Remiges concoloribus. Duodecim rectricibus rubris cauda conflatur. Rostrum similiter rubrum. Habitat in *Brasilia*.

deffous de la queue sont d'un pourpre foncé dans quelques endroits, & plus clair dans d'autres. Les plumes de l'aîle sont de la même couleur. La queue est composée de douze plumes rouges. Le bec est de la même couleur. On le trouve au *Bresil*.

13. LE MANAKIN GRIS HUPÉ.

Manacus cristatus, superne griseus, infernè dilutè flavus; syncipite luteo; rectricibus alarum superioribus minoribus dilutè flavis, majoribus rubris; rectricibus griseis . . .

MANACUS CRISTATUS GRISEUS.

Passer in occipite cristatus, cristâ plumaceâ dependente. *Klein. Avi. pag. 90. N^o. 16.*

Coquantototl, *Avicula cristata*, formâ *Passeris*. *Seb. Vol. II. pag. 74. hujus icon accurata Tab. LXX. fig. 7.*

Craffitie *Manacum aurocapillum* circiter æmulatur. Ipsiùs longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem tres pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues tres pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor lineas longum est; cauda novem lineas; pes sex lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum intimum longitudine adæquat. Alæ

Il est à peu près de la grosseur du *Manakin à tête d'or*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatre lignes de long; sa queue neuf lignes; son pied six lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'intérieur de ceux

de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Sur le synciput est une tache jaune. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont gris. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. Les plumes de l'occiput sont un peu plus longues que les autres, & forment une petite huppe. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les petites du dessous sont d'un jaune clair. Les grandes couvertures du dessus des aîles sont rouges. Les plumes de l'aîle sont d'un cendré-gris. La queue est composée de douze plumes grises. Le bec est jaune. On le trouve en *Amérique*.

complicata ferè ad caudæ extremitatem usque protenduntur. In syncipite macula extat lutea. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ griseæ. Scapulares & superiores caudæ tectrices concolores. Pennæ occipitium vestientes reliquas longitudine paululùm excedunt, exiguanque cristam efficiunt. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam subtus obregentes, tectrices alarum inferiores, sicut & minores superiores, dilutè flavo imbuuntur colore. Superiores alarum tectrices majores tingit color ruber. Remiges sunt cinereo-griseæ. Duodecim rectoribus griseis cauda constat. Rostrum luteum. Habitat in *America*.

SECTION. II.

SECTIO II.

Ceux qui ont le bec conique, dentelé comme une scie; & le bout des deux mandibules courbé en-enbas.

Ex quæ rostro donantur conico, serræ instar denticulato; utriusque mandibulæ apice deorsum incurvo.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui du *Momot*.

UNICO genere, *Momot* scilicet, constituitur hæc sectio.

L VII.

L VII.

Genus Momoti. (1).

Le genre du Momot. (1).

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis
 destituti; tres scilicet anti-
 ci, posticus unus; medius
 trium anteriorum cum ex-
 timo digito trium articu-
 lorum spatio, cum intimo
 primi tantum articuli in-
 tervallo arcuè cohærens:
 Crura ad calcaneum usque
 plumosa:
 Rostrum conicum; ferræ
 instar denticulatum:
 Apex utriusque mandibulæ
 deorsum incurvus.

Son caractere est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de mem-
 branes; trois devant, un der-
 rière; celui du milieu des
 trois antérieurs étroitement
 uni au doigt extérieur jus-
 qu'à la troisième articula-
 tion, & au doigt intérieur
 jusqu'à la première:
 Les jambes couvertes de plu-
 mes jusqu'au talon:
 Le bec conique, dentelé com-
 me une scie:
 Le bout des deux mandibules
 courbé en en-bas.

(1) *Momotus*, nomen latinum ex
 nomine Mexicano *Momot* à me con-
 flatum.

(1) *Momot*, nom que les *Mexiquains*
 donnent à la première espèce de ce genre.

** I. LE MOMOT.

Voyez Pl. XXXV. Fig. 3.

Momotus viridis, superne splendidius, infernè obscurius;
 syncipite cœruleo-beryllino; occipitio cœruleo-violaceo;
 vertice & maculâ per oculos splendide nigris; fasciculo
 pennarum nigro, ad latera cœruleo in medio pectore;
 rectricibus subtus nigricantibus, superne tribus utrinque
 extimis viridibus, sex intermediis primum viridibus, dein
 cœruleo-violaceis, quatuor intermediis nigricante termi-
 natis MOMOTUS.

Momot. Euf. Nieremb. pag. 209.
Willugh. Ornith. pag. 298.
Raj. Syn. Avi. pag. 164.
Tom. IV,

N n n

Motmot. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 52. cap. CXCVI.*

Ispidæ, seu Meropi affinis, Guira-Guainumbi Brasiliensibus Tupinambis Marcgravio. *Willugh. Ornith. pag. 103. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XXIV.*

Raj. Syn. Avi. pag. 49. N^o. 5.

Guira - Guainumbi. *Pison. Hist. Nat. pag. 93, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*

Guira-Guainumbi Brasiliensibus Tupinambis. *Marcgr. Hist. Br. pag. 193, in qua hujus icon non satis accurata.*

Jonst. Avi. pag. 132. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 57.

Merula. *Moehr. Avi. Gen. 112.*

Les Mexiquains l'appellent MOMOT ; MOTMOT. Nieremb. Fern.

Les Brasiliens Toupinambous, GUIRA-GUAINUMBI. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Il est à peu près de la grosseur d'une *Pie*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce neuf lignes de long; sa queue dix pouces cinq lignes; son pied douze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'extérieur neuf lignes & demie, l'intérieur sept lignes; & celui de derrière six lignes. Il a un pied sept pouces trois lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent que jusqu'à deux pouces de distance au-delà de l'origine de la queue. Le synciput est d'un bleu d'Aigue-marine éclatant; & cette couleur s'é-

Craissie *Picam* circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem quinque pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues novem pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est; cauda decem pollices cum quinque lineis; pes unum pollicem; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim cum semi lineas, extimus novem cum semi lineas, intimus septem lineas; posticus autem sex lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis septem pollicum & trium linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duorum tantum pol-

licum distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Synciput splendenti imbuitur cœruleo-beryllino; qui color utrinque ad capitis verticis medium usque protenditur. Occiput tingit color cœruleus, Sapphiri instar splendens, violaceo - Amethystino splendidissimo varians; qui color utrinque sursum ducitur & cœruleo-beryllinum colorem pertingit. Bini colores isti maculam ambiunt nigram, holoserici villosi instar splendens, in medio vertice positam. In utroque capitis latere altera extat macula longitudinalis eodem nigro holoserici villosi instar splendido tincta, per oculos ducta, versùsque collum in acumen protensa: binæ istæ maculæ supra basim mandibulæ superioris coadunantur. Infra maculas istas quædam sunt plumulæ cœrulæ. Infra occipitium paululùm castanei admiscetur. Colli superior pars, dorsum, uropygium, superiores caudæ tectrices & scapulares pennæ sunt eleganter virides. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, inferioresque caudæ tectrices tingit color obscurè viridis.

tend de chaque côté jusqu'au milieu du sommet de la tête. L'occiput est d'un bleu de Saphir changeant en violet d'Amethyste très-brillant; cette couleur remonte de chaque côté; & va joindre le bleu d'Aigue-marine. Ces deux couleurs entourent une tache d'un noir de velours, placée sur le milieu du sommet de la tête. De chaque côté de la tête est une autre tache longitudinale du même noir de velours, qui passe par les yeux, & s'étend en pointe vers le col: ces deux taches se réunissent sur la bête du demi-bec supérieur. Audessous de ces taches sont quelques petites plumes bleues. Audessous de l'occiput il y a un peu de marron. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un beau verd. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd obscur. Au milieu de la poitrine est un petit paquet de plumes noires, bordées extérieurement de bleu. Les jambes sont vertes. Les petites couvertures du dessous des ailes sont de la même couleur: les grandes sont d'un verd obscur. Les pe-

rites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même verd que le dos : les grandes les plus éloignées du corps & l'aîle bâtarde sont d'un verd changeant en bleu. Les plumes de l'aîle sont en-dessous d'un cendré foncé ; mais en-dessus les grandes sont d'un verd qui change d'autant plus en bleu, que la plume est plus éloignée du corps, & elles ont la plus grande partie de leur côté intérieur d'un cendré foncé : les moyennes sont vertes, ayant aussi une partie de leur côté intérieur d'un cendré foncé : plus la plume est proche du corps, moins elle a de cette dernière couleur ; les trois plus proches sont même en-dessus tout-à-fait vertes. La queue est composée de douze plumes noirâtres en-dessous ; mais en-dessus les six du milieu sont d'abord vertes, ensuite d'un bleu changeant en violet, ces deux couleurs se perdant insensiblement l'une dans l'autre ; & de ces six plumes les quatre du milieu sont terminées de noirâtre : les trois plus extérieures de chaque côté sont vertes dans toute leur longueur. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues de trois pouces huit lignes que celle qui les

In medio pectore fasciculus extat pennis constans nigris, exterius cœruleo marginatis. Crura sunt viridia. Teñtrices alarum inferiores minores concolores : majores obscurè virides. Superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbutæ viridi ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores, sicut & alanotha, virides, cœruleo colore variantes. Remiges subtus saturatè cinereæ ; superne verò majores sunt virides quidem, sed colore cœruleo eò magis variantes, quò fiunt à corpore remotiores ; in latere insuper anteriore sunt maximâ parte saturatè cinereæ : minores virides, partim quoque in latere anteriore saturatè cinereo tinctæ ; attamen in illis color cinereus eò minus spatium occupat, quò remix fit corpori vicinior ; tres enim corpori finitimæ sunt superne penitus virides. Cauda duodecim conflatur rectricibus subtus nigricantibus ; superne verò sex intermediae sunt primum virides, dein cœruleo-violaceæ, duobus istis coloribus sensim atque sensim inter se mixtis ; & ex sex istis rectricibus quatuor inter-

mediae sunt nigricante terminatae : tres utrinque extremae per totam longitudinem virides. Binae rectrices intermediae utrinque proximè sequentem trium pollicum & octo linearum longitudine excedunt : laterales gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis octo pollicum & quatuor linearum longitudine cedentem. Oculorum pupilla est nigra ; ipsorum irides luteae. Rostrum nigrum. Pedes , unguesque fusci. Habitat in *Mexico*, *Brasilia* & *Cayana*, unde in *musèum Realmurianum* missus à *D. des Essars*.

2. LE MOMOT VARIÉ.

Momotus viridi, cyaneo, fulvo & cinereo variegatus ; rectricibus subtus nigricantibus, superne tribus utrinque extremis viridibus, sex intermediis primùm viridibus, dein cœruleo-violaceis, quatuor intermediis nigricante terminatis MOMOTUS VARIUS.

Avis caudata. Euf. Nieremb. pag. 209.

Yayauhquitototl, seu Avis caudata. Willugh. Ornith. pag. 298.

Yayauhquitototl. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 55. cap. CCXVI.

Raj. Syn. Avi. pag. 167.

Jajauquitototl. Jonst. Avi. pag. 119.

Les Mexiquains l'appellent YAYAUHQUITOTOTL. Fern.

Crassitie Sturnum æmulatur ; sed caudâ multò longiori donatur. Per universum corpus viridi, cyaneo, fulvo & cinereo variegatur. Caudam componunt duode-

Il est de la grosseur d'un *Etourneau* ; mais il a la queue beaucoup plus longue. Il est varié par tout le corps de verd, de bleu, de fauve & de cendré. La queue est composée de douze

plumes noirâtres en-dessous ; mais en-dessus les six du milieu sont d'abord vertes, ensuite d'un bleu changeant en violet, ces deux couleurs se perdant insensiblement l'une dans l'autre ; & de ces six plumes les quatre du milieu sont terminées de noirâtre : les trois plus extérieures de chaque côté sont vertes dans toute leur longueur. Les deux plumes du milieu de la queue sont beaucoup plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. On le trouve au *Mexique*.

cim rectrices subtus nigricantes ; superne verò sex intermediae sunt primum virides, dein caeruleo-violaceae, duobus istis coloribus sensim atque sensim inter se mixtis ; ex sex istis rectricibus quatuor intermediae nigricante terminantur : tres utrinque extremae sunt per totam longitudinem virides. Binæ rectrices intermediae lateralium longitudinem multum excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Habitat in *Mexico*.

SECTION III.

SECTIO III.

Ceux qui ont le bec droit & assez long.

Eæ quæ rostrum habent rectum, longiusculum.

CETTE section est composée de deux genres d'Oiseaux. Les uns ont le bec gros & pointu, comme le *Martin-pêcheur* : & les autres ont le bec applati horizontalement & obtus ; comme le *Todier*.

DUO Avium genera sectionem istam constituunt. Aliæ rostro donantur crasso, acuto, ut *Ispida* : aliæ rostrum habent horizontaliter planum & obtusum, ut *Todus*.



à tête d'Or. 3. Manakin rouge.



Designé et Gravé par Martinet.

1. Coq-de-Roche. 2 Manakin à tête d'Or. 3. Manakin rouge.



akin à tête blanche .

3. Momot .



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Manakin noir hupé.

2. Manakin à tête blanche.

3. Momot.

LVIII.

LVIII.

Genus Ispidæ.

Le genre du Martin-pêcheur.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis
 destituti; tres scilicet an-
 tici, posticus unus; me-
 dius trium anteriorum
 cum extimo digito trium
 articularum spatio, cum
 intimo primi tantum ar-
 ticuli intervallo arcuè co-
 hærens :

Crura ad calcaneum usque
 plumosa :

Rostrum rectum, longiuscu-
 lum, crassum, acutum.

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de mem-
 branes; trois devant, un der-
 rière; celui du milieu des
 trois antérieurs étroitement
 uni au doigt extérieur jus-
 qu'à la troisième articula-
 tion, & au doigt intérieur
 jusqu'à la première :

Les jambes couvertes de plu-
 mes jusqu'au talon :

Le bec droit, assez long, gros
 & pointu.

** I. LE MARTIN-PESCHEUR.

Ispida superne saturatè viridis, infernè rufa; medio dorso &
 uropygio cœruleo-beryllinis; capite & collo superiore ma-
 culis transversis cœruleis insignitis; duplici utrinque maculâ
 in capite rufâ; tectricibus alarum superioribus majoribus
 saturatè cœruleis, cœruleo splendidiore punctulatis; rec-
 tricibus superne saturatè cœruleis, subtus fuscis . . .
 ISPIDA.

Ispida. Gesn. Avi. pag. 571, in qua hujus icon non satis accurata.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 518. hujus icon non satis accurata pag. 520.

Jonst. Avi. pag. 107. hujus icon ab Olina mutuata Tab. 31.

Willugh. Ornith. pag. 101. hujus icon ab Olina mutuata Tab. XXIV.

Raj. Syn. Avi. pag. 48. N. A. 1.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.

Moehr. Avi. Gen. 20.

Ispida apud Recentiores. Gesn. icon. Avi. pag. 100, in qua hujus icon non satis accurata.

Ispida nostras. Klein. Avi. pag. 33. N°. 1.

- Ispida, Alcyon fluviatilis, vulgò Piscator Regis. *Charlet. Exer. pag. 111, N^o. XIII.*
Charlet. Onomazt. pag. 105. N^o. XIII.
 Ispida, seu Alcyon fluviatilis; Alcyon riparia; Alcedo; Plombina; Avis. S. Mariæ, vulgò Regis Piscator; Martinus Piscator. *Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 386.*
 Alcedo muta, dorso cœlio, pectore fulvo. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. III. sp. 1.*
 Alcedo fluviatilis. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 193.*
 Halcedo muta, sive major, *Bellonii.*
 Alcyon. *Gesn. Avi. pag. 85.*
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 497.
 Alcyon, Alcedo. *Charlet. Exer. pag. 111. N^o. XII.*
Charlet. Onomazt. pag. 105. N^o. XII.
 Halcyon & Alcedo. *Jonst. Avi. pag. 107.*
 Picus Marinus. *Gesn. Avi. pag. 713.*
 Uccello pescatore. *Olina. pag. 39, in qua hujus icon satis accurata, exceptis pedibus.*
 Martin-pêcheur. *Alb. Tom. I. pag. 48; avec une figure mal coloriée Pl. 54.*
 Martinet pêcheur. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 218; avec une figure très-peu exacte pag. 219.*
 Pêcheur, Martinet pêcheur, Tartarin, Artre, Monnier. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 50 b, dans laquelle est la même figure.*
 Les Auvergnacs l'appellent MERLE D'EAU. *Aldrov.*
 Les Arabes, CHEREN. *Gesn. Aldrov.*
 Les Grecs, Ἀλκυὼν. *Gesn. Aldrov. Ἀλκυὼν ἄφρωνος. Bel.*
 Les Grecs modernes, Φασίδωνες: ils appellent le mâle Κῆνυξ; Κηρύλος; Κερύει Jonst.
 Les Espagnols, ARVELA. *Gesn. Aldrov.*
 Les Catalans, ARNÉ. *Barr.*
 Les Italiens, UCCELLO PESCATORE. *Olina. UCCELLO DEL PARADISO. Bel. Gesn. Aldrov. PESCATORE DEL RE; PIOMBINO. Bel. Gesn. Aldrov. Olina. PLUMBINO; PICUPIOLO. Gesn.*
 Les Italiens aux environs du Lac majeur, VITRIOLO. *Bel. Gesn. Aldrov.*
 Les Italiens aux environs du Lac de Come, MARTINO PESCATORE. *Bel. Gesn. Aldrov.*
 Les Romains, UCCELLO DI SANTA MARIA; UCCELLO DELLA MADONNA. *Olina.*
 Les Toscans, UCCELLO DI SANTA MARIA. *Bel. Gesn. Aldrov. Olina; UCCELLO DELLA MADONNA. Olina.*
 Les Milanois, PESCATORE. *Bel. Gesn. Aldrov. Olina.*
 Les Génois, MARTINO PESCATORE. *Jonst.*
 Les Lombards, MERLO ACQUAROLO. *Olina.*

Les Allemands, YSS-VOGEL; EISS-VOGEL. *Gesn. Aldrov.* EYS-VOGEL.

Rzac. WASSER HEUNLIN; SEE-SCHWALME. *Schwenck.*

Les Silésiens, EYSZ-VOGEL. *Schwenck.*

Les Poméraniens, YSENGART. *Gesn. Aldrov.* EYSENGARTT. *Schwenck.*

Les Polonois, ZIMORODEK RZECZNY. *Rzac.*

Les Anglois, KING-FISHER. *Gesn. Aldrov.* Willugh. *Raj. Sibbald.* KING-FISHER. *Charlet. Alb.* HALCYON. *Charlet.*

Cum *Alauda* crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & undecim lineas longum est; cauda quindecim lineas; pes quatuor lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septem cum semi lineas: extimus paulò brevior est; intimus quatuor tantum lineas longus; & posticus adhuc illo intimo longitudine cedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem pollicum & duarum linearum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput superius & ad latera, columque superius sunt saturatè viridia, maculis transversis cœruleis insignita. In utroque capitis latere macula extat rufa, narem in-

Tom. IV.

Il est à peu près de la longueur d'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces sept lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce onze lignes de long; sa queue quinze lignes; son pied quatre lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes & demie: l'extérieur est un peu plus court; l'intérieur n'a que quatre lignes de long; & celui de derrière est encore plus court que ce dernier. Il a dix pouces deux lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure & les côtés de la tête, ainsi que la partie supérieure du col, sont d'un verd foncé; marqué de taches transversales bleues. De chaque côté de la tête, entre la narine & l'œil, est une tache rousse, au-dessous

O o o

de laquelle en est une noire. Derrière l'œil il y a une autre tache rousse, qui s'étend tout le long de la joue, & qui est suivie d'une longue tache d'un blanc mêlé d'une légère teinte de roux. La gorge est aussi d'un blanc mêlé de même d'une légère teinte de roux. Le milieu du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un beau bleu d'Aigue-marine. Les côtés du dos, les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un verd foncé; cependant les plus longues des scapulaires sont d'un verd-bleu. Les grandes couvertures du dessus des ailes sont d'un bleu foncé, & terminées de petits points d'un bleu éclatant. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont roux. Le milieu du ventre est cependant d'une couleur un peu plus claire & blanchâtre. Les plumes de l'aile sont brunes en-dessous; mais en-dessus leur côté extérieur est d'un bleu foncé, & leur côté intérieur est brun. La troisième des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un bleu foncé en-dessus, &

ter & oculum posita, infra quam est macula nigra. Ponè oculum altera adest macula rufa, secundum genæ longitudinem ducta, quamque sequitur longa macula alba, aliquid rufi admixtum habens. Guttur simili albo, aliquid rufi admixtum habente, tingitur. Medium dorsum, uropygium, superioresque caudæ rectrices sunt splendide cœruleo-beryllinæ. Dorsum ad latera, pennæ scapulares & rectrices alarum superiores minores saturatè virides; attamen ex scapularibus pennis longissimæ sunt viridi-cœruleæ. Rectrices alarum superiores majores saturatè cœruleæ, punctulis cœruleo splendidiore tinctis terminatæ. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes rufi sunt coloris: attamen color rufus in medio ventre paulò dilutior est & quasi candicat. Remiges sunt subtus fuscæ, superne verò in latere exteriori saturatè cœruleæ, in interiore fuscæ. Remix tertia reliquas omnes longitudine superat. Cauda duodecim constat rectricibus superne saturatè cœ-

ruleis, subtus fuscis. Rostrum nigrum, attramen circa oris angulos candicans : os intus croceo colore imbutum. Pedes rubri; ungues verò nigri. Circa flumina & rivulos versatur. *Ex museo Realmuriano.* brunes en-dessous. Le bec est noir, excepté vers les coins de la bouche, où il est blanchâtre : le dedans de la bouche est de couleur de safran. Les pieds sont rouges ; & les ongles noirs. On le trouve le long des rivières & des petits ruisseaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

2. LE MARTIN-PESCHEUR DE BENGALE.

Ispida superne cœruleo-viridis, infernè rufa; capite saturatè cœruleo transversim striato; taniâ utrinque per oculos rufa; gutture candido; rectricibus alarum superioribus cœruleo-viridibus, cœruleo splendidiore punctularis; rectricibus subtus fuscis, superne cœruleo-viridibus, lateralibus interiùs fuscis ISPIDA BENGALENSIS.

Ispida Bengalensis. *Klein. Avi. pag. 34. N^o. 2.*

Petit Martin-pescheur des Indes. *Edwards. Tom. I. pag. XI; avec une figure exacte (excepté les pieds) Pl. II. (figure inférieure).*

Les Anglois l'appellent LITTLE INDIAN KING-FISHER. *Edwards.*

Crassitie *Ficedulam* non antecellit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues quatuor pollices & cinq lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda decem lineas; pes tres lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue cinque cum semi lineas, extimus cinque

Il n'est guères plus gros qu'un *Becfigue*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quatre pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces cinq lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue dix lignes; son pied trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes & demie, l'extérieur cinq lignes, & l'intérieur trois lignes :

O o o ij

celui de derriere est le plus court de tous. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un bleu-verd. La tête est rayée de bandes transversales d'un bleu plus foncé. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale rousse, qui part des coins de la bouche, passe par les yeux, & s'étend tout le long des côtés du col. La gorge est blanche. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont roux : cette couleur est cependant variée d'un peu de verd sur les côtés du ventre. Les couvertures du dessus des ailes sont d'un bleu-verd, & terminées chacune par un petit point d'un bleu beaucoup plus brillant. Les plumes de l'aile sont brunes en-dessous ; mais en-dessus elles sont d'un bleu-verd, & ont une grande partie de leur côté intérieur brune, excepté cependant les deux ou trois plus proches du corps dont tout le dessus est d'un bleu-verd. La

lineas, intimus tres lineas ? posticus autem omnium brevissimus. Alæ complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, superiores caudæ teñtrices & scapulares pennæ sunt cœruleo-virides. Caput autem taniis transversis saturatiùs cœruleis striatum est. In utroque capitis latere tania extat longitudinalis rufa, ab oris angulis orta, per oculos ducta, & secundum colli latera protensa. Guttur albicat. Partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crura, inferiores caudæ teñtrices & pennas alas subtus obtegentes tingit color rufus : qui tamen color ad ventris latera pauco viridi variegatur. Teñtrices alarum superiores sunt cœruleo-virides, punctulis cœruleo multò splendidiorè tinctis terminatæ. Remiges subtus fuscæ, superne verò cœruleo-virides, attamen in latere interiore maximâ parte fuscæ, exceptis duabus tribusve corpori finitimis quarum tota superna facies est cœruleo-viridis. Caudam componunt duodecim rectrices subtus fuscæ ; superne

verò binæ intermediae sunt
cœruleo - virides : laterales
omnes in latere exteriori
concolores , in interiori fuf-
cæ. Rostrum nigrum , attamen
ad basim mandibulæ
inferioris incarnato colore
imbutum : nigredo autem,
versus rostri apicem procedendo,
fit saturior. Pedes
fordidè rubri ; unguis verò
nigri. Habitat in *Bengalensi*
Regno.

queue est composée de douze
plumes brunes en-dessous ; mais
en - dessus les deux du milieu
sont d'un bleu-verd : toutes les
latérales sont de la même couleur
du côté extérieur, & brunes
du côté intérieur. Le bec
est noir, excepté la bête du demi-
bec inférieur, qui est de
couleur de chair : le noir est un
peu plus foncé vers le bout du
bec qu'ailleurs. Les pieds sont
d'un rouge terni ; & les ongles
noirs. On le trouve dans le
Royaume de *Bengale*.

3. LE PETIT MARTIN-PESCHEUR DE BENGAL.

Ispida superne cœrulea , cœruleo splendidiore punctulata , infernè rufa ; maculâ utrinque duplici , aliâ prope basim rostri , alterâ ponè aures rufâ ; remigibus , rectricibusque obscurè fuscis *ISPIDA BENGALENSIS MINOR.*

Ispida Bengalensis. Klein. Avi. pag. 34. N°. 2.

Petit Martin-pescheur des Indes. *Edwards. Tom. I. pag. XI; avec une figure exacte (excepté les pieds) Pl. II. (figure supérieure).*

Les Anglois l'appellent LITTLE INDIAN KING-FISHER. Edwards.

Præcedenti nonnihil craf-
sitie cedit. Ipsius longitudo
ab apice rostri ad caudam ex-
tremam quatuor pollices &
tres circiter lineas æquat , &
ad extremos ungues quatuor
pollices cum lineis binis.
Rostrum ab ipsius apice ad
oris angulos quindecim li-
neas longum est ; cauda no-
vem lineas ; pes tres lineas ;

Il n'est pas tout-à-fait si gros
que le précédent. Sa longueur
depuis le bout du bec jusqu'à
celui de la queue est d'environ
quatre pouces trois lignes, &
jusqu'à celui des ongles de qua-
tre pouces deux lignes. Son bec
depuis sa pointe jusqu'aux coins
de la bouche a quinze lignes de
long ; sa queue neuf lignes ; son
pied trois lignes ; celui du mi-

lieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes, l'extérieur quatre lignes & demie, & l'intérieur deux lignes & demie : celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un beau bleu, les bouts de chaque plume étant terminés par un petit point d'un bleu encore plus brillant. De chaque côté de la tête sont deux taches rousses, placées l'une auprès de la bête du demi-bec supérieur, & l'autre derrière les oreilles. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont roux. Toutes les plumes de l'aîle sont d'un brun sombre. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec est d'un jaune-orangé. Les pieds & les ongles sont d'un orangé terni. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*,

trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque lineas, extimus quatuor cum semi lineas, intimus binas cum semi lineas : posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Alæ complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ tectrices sunt eleganter cœruleæ, unaquaque pennâ punctulo cœruleo splendidiore imbuta in apice terminatâ. In utroque capitis latere duplex extat macula rufa, alia prope basim mandibulæ superioris, altera pone aures posita. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ rufæ. Quæ caudam subtus obtegunt, inferioresque alarum tectrices eodem colore tinguntur. Remiges omnes sunt obscure fuscæ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Rostrum luteo-aurantium. Pedes, unguesque sordide aurantii. Habitat in *Bengalensi* Regno.

4. LE MARTIN-PESCHEUR DES INDES.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 1. A.

Ispida superne splendide viridis, inferne rufa; capite superiore, gutture & taniâ per oculos splendide cœruleis; utrinque taniâ supra oculos candidâ, maculâ infra oculos rufescente; rectricibus subtus nigricantibus, superne splendide viridibus, lateralibus interius nigricantibus
ISPIDA INDICA.

Speciem istam nondum mihi videre contigit. Ipsi descriptionem desumpsi ex icone à *D. Poivre* in *India* depicta; & sic eam æri incultram esse curavi.

Ispidam Bengalensem crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quatuor pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues quatuor pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; caudæ decem lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue quinque cum semi lineas; extimus quinque lineas, intimus tres lineas: posticus omnium brevissimus. Alæ complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem pertingunt. Caput superius

Je n'ai jamais vû cette espèce: je l'ai décrite & fait graver d'après un dessin fait dans les *Indes* par *M. Poivre*.

Il est à peu près de la grosseur du *Martin-pêcheur de Bengale*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quatre pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces cinq lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes & demie, l'extérieur cinq lignes, & l'intérieur trois lignes: celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supé-

rière de la tête & la gorge sont d'un bleu éclatant. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale de la même couleur, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, passe par les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. Au-dessus de cette bande en est une blanche, qui s'étend par-dessus les yeux, au-dessous desquels est une tache roussâtre. Le derrière de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un verd très-brillant. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont roux. Les plumes de l'aile sont noirâtres en-dessous; mais en-dessus elles sont d'un bleu très-éclatant du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur. La queue est composée de douze plumes, toutes noirâtres en-dessous; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un verd brillant: les latérales sont de la même couleur du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur. Le bec, les pieds & les ongles sont rouges. On le trouve dans les *Indes Orientales*.

& guttur sunt splendide cœrulea. In utroque capitis latere tænia extat longitudinalis concolor, ab exortu mandibulæ superioris orta, per oculos ducta, & versus occipitium usque protensa; supra quam tæniam altera adest tænia candida, supra oculos producta; infra oculos autem macula rufescens extat. Caput posterius, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ rectrices splendidissimo viridi tinguntur. Collum inferius, pectus, venter, latera, crura; rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus obtegentes rufi sunt coloris. Remiges subtus nigricantes, superne verò in latere exteriori splendidissime cœruleæ, in interiore nigricantes. Cauda duodecim constat rectricibus, omnibus subtus nigricantibus; superne verò binæ intermediae sunt splendide virides: laterales in latere exteriori concolores, in interiore nigricantes. Rostrum, pedes, unguesque rubri. Habitat in *India Orientali*.

5. LE MARTIN-PESCHEUR A COLLIER DES INDES.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 2. A.

Ispida superne splendide cœrulea, infernè rufa; uropigio & rectricibus alarum superioribus splendide viridibus; utrinque taniâ supra oculos candidâ, maculâ infra oculos rufescente; collo superiore torque albo cincto; rectricibus subtus nigricantibus, superne splendide cœruleis, laterali-bus interiùs nigricantibus. . . . ISPIDA INDICA TORQUATA.

Speciem istam nondum vidi: ipsius descriptionem desumpsi ex icone in *India* à *D. Poivre* depicta; & sic eam æri insculptam esse curavi.

Ispidam nostratem crassitie multum superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & novem circiter lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices & lineas binas. Rostrum, quod in exortu quinque lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & octo lineas longum est; cauda unum pollicem; pes sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas, extimus octo lineas, intimus quinque cum semî lineas: posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Alæ

Tom. IV.

Je n'ai jamais vu cette espèce: je l'ai décrite & fait graver d'après un dessin fait dans les *Indes* par *M. Poivre*.

Il est beaucoup plus gros que notre *Martin-pêcheur*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ six pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces deux lignes. Son bec, qui a à son origine cinq lignes d'épaisseur, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche un pouce huit lignes de long; sa queue un pouce; son pied six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes, l'extérieur huit lignes, & l'intérieur cinq lignes & demie: celui de derrière est le plus court de tous. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étend-

Ppp.

dent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un bleu très-éclatant. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale blanche, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, passe par-dessus les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. Un peu au-dessous des yeux est une tache roussâtre. La partie supérieure du col est entourée d'une bande blanche, qui forme une espèce de collier. Le croupion, les couvertures du dessus de la queue & celles du dessus des ailes sont d'un verd brillant; les grandes du dessus des ailes les plus éloignées du corps sont cependant marquées d'un peu de blanc. La gorge est roussâtre. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont roux. Les plumes de l'aile sont noirâtres en-dessous; mais en-dessus elles sont d'un bleu très-éclatant du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur. La queue est composée de douze plumes, toutes noirâtres en-dessous; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un bleu très-éclatant: les latérales sont de

complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Caput, partem colli superiorem & dorsum vestiunt pennæ splendidissimè cœruleæ. Scapulares eodem imbuuntur colore. In utroque capitis latere tænia extat longitudinalis candida, ab exortu mandibulæ superioris orta, supra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Paulò infra oculos macula rufescens adest. Collum superius cingit tænia alba, torquem quodammodo efficiens. Uropygium, superiores caudæ rectrices & pennæ alas superne vestientes sunt splendidè virides: majores tamen alarum rectrices superiores à corpore remotiores pauco insigniuntur candido. Guttur rufescit. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam subtus obtegentes, alarumque rectrices inferiores rufo tinguntur colore. Remiges sunt subtus nigricantes, superne verò in latere exteriori splendidissimè cœruleæ, in interiori nigricantes. Caudam componunt duodecim rectrices, omnes subtus nigricantes, superne autem binæ intermediæ splendidissimè

cœruleæ : laterales in latere exteriori eodem imbuuntur colore, in interiore nigricant. Rostrum in exortu griseum, versus extremitatem nigricans. Pedes grisei; ungues verò nigricantes. Habitat in *India Orientali*. la même couleur du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur. Le bec est gris à son origine & noirâtre vers le bout. Les pieds sont gris; & les ongles noirâtres. On le trouve dans les *Indes Orientales*.

** 6. LE MARTIN-PESCHEUR HUPÉ DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 3.

Ispida cristata, superne splendide cœrulea, infernè dilutè rufa; capite & collo superioribus viridescentibus, nigro transversim striatis; taniâ utrinque ponè oculos cœruleo-violaceâ; rectricibus alarum superioribus fusco-violaceis; cœruleo punctulatis; rectricibus subtus fuscis, superne violaceis, lateralibus interiùs fuscis . . . *ISPIDA PHILIPPENSIS CRISTATA*.

Ispida rostro luteo. Klein. Avi. pag. 35. N°. 5.

Alcedo Amboinenfis, cristata. Seb. Vol. I. pag. 100. hujus icon non satis accurata Tab. LXIII. fig. 4.

Les Habitans d'Amboine l'appellent TOHORKEY & HITO. Seb.

Les Habitans des Philippines, VINTSI.

Crassitie *Ficedulam* non multùm antecellit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & undecim lineas æquat, & ad extremos ungues quinque pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & quinque cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem; pes quatuor

Il n'est guères plus gros qu'un *Becfigue*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces onze lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes & demie de long; sa queue un pouce; son pied quatre lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint

avec l'ongle , six lignes , l'extérieur cinq lignes & demie , & l'intérieur quatre lignes : celui de derrière est le plus court de tous. Il a sept pouces huit lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont verdâtres , & rayées transversalement de noir. Les plumes du sommet de la tête sont un peu plus longues que les autres , & forment une petite hupe. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale d'un bleu-violet très-éclatant , qui part du grand angle de l'œil , & s'étend tout le long des côtés du col. Le dos , le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un bleu très-brillant. Les plumes scapulaires sont d'un bleu-violet éclatant. Les joues sont rousses : cette couleur s'étend le long des côtés du col. La gorge est d'un blanc-roussâtre. La partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous des ailes sont d'un roux clair. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un roux un peu plus foncé. Celles du dessus des ailes sont d'un brun tirant sur le violet , & ter-

lineas ; trium digitorum anteriorum medius cum ungue sex lineas , extimus quinque cum semi lineas , intimus quatuor lineas : posticus omnium brevissimus. Alis expansis , extremitates majorum remigum septem pollicum & octo linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Partes capitis & colli superiores vestiunt pennæ viridescentes , nigro transversim striatæ. Quæ summum caput obtegunt , reliquas longitudine paululum excedunt , exiguamque cristam efformant. In utroque capitis latere tania extat longitudinalis splendidissimè cœruleo-violacea , à magno oculi cantho orta , & secundùm colli latera protensa. Dorsum , uropygium , superioresque caudæ rectrices sunt splendidissimè cœruleæ. Pennæ scapulares splendidè cœruleo-violacæ. Genæ rufæ : rufus autem color secundùm colli latera protenditur. Guttur ex albo rufescit. Collum inferius , pectus , ventrem , latera , crura , alarumque rectrices inferiores tingit color dilutè rufus. Pennæ caudam subtus obte-

gentes rufo imbuuntur non-nihil dilutiore. Superiores alarum rectrices sunt fuscae, ad violaceum inclinantes, punctulo splendidissime cœruleo terminatae. Remiges majores fuscae : minores subtus eodem imbutae colore, superne verò in latere exterioriore violaceae, in interioriore fuscae : majores insuper, sicut & minores, oris donantur interioribus rufescentibus. Remix tertia reliquas omnes longitudine excedit. Cauda duodecim constat rectricibus, omnibus subtus fuscis; superne verò binæ intermediæ sunt violaceae : laterales exteriorius & apice concolores, interiorius fuscae. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque rubescentes. Habitat in *Amboinensi* & *Philippensibus Insulis*, unde in *museum Reaumurianum* allata à *D. Poivre*.

minées chacune par un petit point bleu fort brillant. Les grandes plumes de l'aile sont brunes : les moyennes sont en-dessous de la même couleur ; mais en-dessus elles sont violettes du côté extérieur, & brunes du côté intérieur : de plus les grandes & les moyennes sont bordées intérieurement de rouffâtre. La troisième plume de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes, toutes brunes en-dessous ; mais en-dessus les deux du milieu sont violettes : les latérales sont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & brunes du côté intérieur. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont rougeâtres. On le trouve à l'*Isle d'Amboine* & aux *Philippines*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

** 7. LE MARTIN-PESCHEUR DU SÉNÉGAL.

Voyez *Pl. XXXIX. Fig. 1.*

Ispida superne cœruleo-beryllina, fusco in dorso admixto ; infernè fulva ; capite & collo superiore obscure viridibus, viridi splendidiore punctulatis ; duplici utrinque maculâ in capite fulvâ ; rectricibus alarum superioribus obscure viridibus, viridi-beryllino punctulatis ; rectricibus subtus fuscis, superne viridi-cœruleis, lateralibus interiorius fuscis
ISPIDA SENEGALENSIS.

Il est à peu près de la grosseur du *notre*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce huit lignes de long; sa queue quatorze lignes; son pied trois lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes, l'extérieur six lignes & demie, & l'intérieur trois lignes & demie: celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a huit pouces dix lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont couvertes de plumes d'un verd obscur, terminées chacune par un petit point d'un verd plus clair & brillant. De chaque côté de la tête sont deux taches fauves, placées, l'une derrière l'œil, & l'autre entre la narine & l'œil: cette dernière est très-petite. Le dos est d'un assez beau bleu d'Aigue-marine mêlé d'un peu de brun. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un bleu d'Aigue-marine éclatant. La gorge est

Cum *Ispida nostrate* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & octo lineas longum est; cauda quatuordecim lineas; pes tres cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue septem lineas, extimus sex cum semi lineas, intimus tres cum semi lineas: posticus anticorum intimum longitudine æmulatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est octo pollicum & decem linearum; alæ verò compliatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput & partem colli superiorem vestiunt pennæ obscurè virides, punctulo viridi quidem, sed dilutiore & splendidiore, terminatæ. In utroque capitis latere binæ sunt maculæ fulvæ, alia ponè oculum, altera narem inter & oculum posita: quæ ultima est valde exigua. Dorsum tingit color cœruleo-beryllinus elegans, pauco fusco mixtus. Uropygium, superio-

resque caudæ rectrices sunt splendide cœruleo-beryllina. Guttur dilutè fulvum. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam subtus obtegentes & rectrices alarum inferiores fulvo colore tinguntur. Pennæ scapulares sunt obscurè virides. Superiores alarum rectrices concolores; quælibet tamen punctulo diluto, splendidissimoque viridi-beryllino terminatur. Remiges majores fuscæ, oris exterioribus obscurè viridibus, interioribus fulvis: minores subtus fuscæ, superne verò in latere exteriori obscurè virides, in interiori fuscæ, attamen interius superne & infernè maximâ parte fulvæ. Cauda duodecim constat rectricibus subtus fuscis; superne verò binis intermediis viridi-cœruleis: lateralibus in latere exteriori & apice concoloribus, in latere interiori fuscæ. Rostrum similiter fuscum. Pedes, unguesque rubescentes. Habitat in *Senegalensi* regione, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Adanson*.

d'un fauve clair. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont fauves. Les plumes scapulaires sont d'un verd obscur. Les couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur; mais chacune est terminée par un petit point d'un verd d'Aigue-marine clair & très-brillant. Les grandes plumes de l'aile sont brunes, bordées extérieurement de verd obscur, & intérieurement de fauve: les moyennes sont brunes en-dessous; mais en-dessus elles sont d'un verd obscur du côté extérieur, & brunes du côté intérieur, ayant cependant la plus grande partie de leur côté intérieur fauve dessus & dessous. La queue est composée de douze plumes, toutes brunes en-dessous; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un verd-bleu: les latérales sont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & brunes du côté intérieur. Le bec est brun. Les pieds & les ongles sont rougeâtres. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

** 8. LE MARTIN-PESCHEUR DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE,

Voyez Pl. XXXVI. Fig. 3.

Ispida superne obscurè cœruleo-viridescens, ad cinereum inclinans, infernè sulva; capite superiore cinereo, ad fulvum vergente; collo fulvo; dorso infimo & uropygio dilutè cœruleo-beryllinis; rectricibus subtus cinereis, superne cœruleo-viridescens, lateralibus interiùs cinereo marginatis . . . ISPIDA CAPITIS BONÆ SPEI.

Il est un peu plus gros qu'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces. Son bec, qui a à son origine onze lignes & demie d'épaisseur, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche trois pouces cinq lignes de long; sa queue trois pouces neuf lignes; son pied sept lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes & demie, l'extérieur quinze lignes, l'intérieur onze lignes; & celui de derrière huit lignes & demie. Il a un pied neuf pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un cendré tirant un peu sur le fauve. La partie supérieure du dos,

Merulam crassitie paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices. Rostrum, quod in exortu undecim cum semi lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & quinque lineas longum est; cauda tres pollices & novem lineas; pes septem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim cum semi lineas, extimus quindecim lineas, intimus undecim lineas; posticus autem octo cum semi lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & novem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tertiam longitudinis

gitudinis caudæ partem extenduntur. Capitis superior pars ex cinereo nonnihil ad fulvum vergit. Pars dorſi ſuprema, pennæ ſcapulares & ſuperiores alarum rectrices ex obſcurè cœruleo-virideſcente paululùm ad cinereum inclinant. Dorſum infimum, uropygium & ſuperiores caudæ rectrices tingit color cœruleo-beryllinus dilutus & ſplendidus. Guttur, collum, pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam ſubtus obtegentes & rectrices alarum inferiores fulvi ſunt coloris. Remiges ſunt ſubtus cinereæ, ſuperne verò in latere exteriori & apice cœruleo-virideſcentes, in latere interiori ad ſcapum cinereæ, ad margines fulvæ, cinereo & fulvo latus interior obliquè dividitibus. Caudam componunt duodecim rectrices, omnes ſubtus cinereæ; ſuperne autem binæ intermediæ cœruleo-virideſcentes: laterales omnes eodem imbutæ colore, ſed interiùs cinereo marginatæ. Remigum, ſicut & rectricum, ſcapi ſuperne nigricant, infernè albicant. Roſtrum rubrum, excepto apice nigricante. Pedes, unguesque rubri. Habitat in

Tom. IV.

les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus des aîles ſont d'un bleu-verdâtre ſombre & tirant un peu ſur le cendré. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un bleu d'Aigue-marine clair & brillant. La gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du deſſous de la queue & celles du deſſous des aîles ſont fauves. Les plumes de l'aîle ſont cendrées en deſſous; mais en-deſſus elles ſont d'un bleu-verdâtre du côté extérieur & à leur bout; leur côté intérieur eſt cendré vers la tige de la plume, & fauve vers ſes bords, ces deux couleurs le coupant obliquement. La queue eſt compoſée de douze plumes, toutes cendrées en-deſſous; mais en-deſſus les deux du milieu ſont d'un bleu-verdâtre: toutes les latérales ſont de la même couleur, & bordées intérieurement de cendré. Les tiges des plumes de l'aîle & de celles de la queue ſont noirâtres en-deſſus, & blanches en-deſſous. Le bec eſt rouge, excepté ſa pointe, qui eſt noirâtre. Les pieds & les ongles ſont rouges. On le trouve au *Cap de Bonne Eſpérance*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le

conserve dans son cabinet. *Capite Bonæ Spei, unde missa in museum D. Aubry.*

9. LE MARTIN-PESCHEUR VERD D'AMÉRIQUE;

Ispida superne viridis, infernè alba; taniâ utrinque supra oculos, gutture, collo inferiore & lateribus aurantiis; fasciâ in pectore transversâ viridi; remigibus nigricantibus, maculis flavo-rufescentibus in utroque latere variis; rectricibus subtus fuscis; superne viridibus, lateralibus interiùs albo maculatis . . . ISPIDA AMERICANA VIRIDIS.

Petit Martin- pêcheur vert & orange. *Edwards. Glanur. pag. 73. Chap. XXXV; avec une figure passable Pl. 245.*
Les Anglois l'appellent LITTLE GREEN AND ORANGE-COLOURED KING-FISHER. Edwards.

Il n'est pas si gros que notre *Martin- pêcheur*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue un pouce cinq lignes; son pied trois lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes & demie: l'extérieur est un peu plus court; l'intérieur n'a que trois lignes de long; & celui de derrière est encore plus court que ce dernier. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie su-

Ispidæ nostrati crassitie cedit. *Ipsius* longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem quinque circiter pollices æquat, & ad extremos ungues quatuor pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda unum pollicem & quinque lineas; pes tres lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque cum semilineas: extimus paulò minorem obtinet longitudinem; intimus tres tantum lineas longus; & posticus adhuc intimo brevior. Alæ complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, partem colli supe-

riorem, dorsum & uropygium tingit color viridis. Pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ rectrices concolores. In utroque capitis latere exigua extat tania longitudinalis aurantia, ab exitu mandibulæ superioris orta, & supra oculos ducta. Guttur & pars colli inferior aurantii sunt coloris. Pectus latè insignitur taniâ transversâ eodem imbutâ viridi ac dorsum ipsum tingitur. Venter, crura & inferiores caudæ rectrices albicant. Lateralia aurantia tinguntur vivo & ad rubrum vergente. Rectrices alarum inferiores sunt dilutè aurantiæ. Ipsarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, concolores. Remiges obscurè fuscæ sive nigricantes, & tam in latere interiore quàm in exteriori maculis flavo-rufescentibus variæ; ex istis tamen excipiendæ sunt minores quædam remiges corpori viciniore superne eodem ac in dorso viridi imbutæ & immaculatæ. Cauda duodecim constat rectricibus subtus fuscis; superne verò binæ intermediæ sunt virides: laterales omnes eodem colore

périeure du col, le dos & le croupion sont verts. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une petite bande longitudinale orangée, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, & s'étend jusqu'au-dessus des yeux. La gorge & la partie inférieure du col sont orangées. Une large bande du même verd que celui du dos traverse la poitrine. Le ventre est blanc, ainsi que les jambes & les couvertures du dessous de la queue. Les côtés sont d'un orangé vif & tirant sur le rouge. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un orangé clair. Le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, est de la même couleur. Les plumes de l'aîle sont d'un brun obscur ou noirâtres, & variées, tant du côté intérieur que du côté extérieur, de taches d'un jaune-roussâtre; il faut cependant en excepter quelques-unes des moyennes plumes les plus proches du corps; qui sont en-dessus du même verd que le dos & sans taches. La queue est composée de douze plumes, toutes brunes en-dessous; mais en-dessus les deux du milieu sont vertes: toutes

les latérales sont de la même couleur, & variées de taches blanches du côté intérieur seulement. Les plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. Le bec est noirâtre, excepté la base du demi-bec inférieur, qui est rougeâtre. Les pieds sont de couleur de chair; & les ongles noirâtres. On le trouve en *Amérique*.

tinctæ, & in latere inferiore tantum maculis albis variegatæ. Rectrices intermedia lateralium longitudinem paululum excedunt. Rostrum nigricans, attamen in basi mandibulæ inferioris rubescens. Pedes carneo colore imbuti; ungues verò nigricantes. Habitat in *América*.

** 10. LE MARTIN-PESCHEUR DE CAYENNE.

Ispida superne cœrulea, infernè alba; taniâ transversâ infra occipitium nigricante; collo candido; uropygio cœruleo-beryllino; rectricibus subtus nigris, superne cœruleis, lateralibus interiùs nigris . . . ISPIDA CAYANENSIS.

Il approche de la grosseur d'un *Etourneau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces cinq lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces huit lignes. Son bec, qui a à son origine cinq lignes d'épaisseur, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche deux pouces de long; sa queue trois pouces six lignes; son pied six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes & demie, l'extérieur neuf lignes, & l'intérieur huit lignes: celui de derrière est de la même longueur

Ad *Sturni* crassitiem accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem novem pollices & quinque lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices & octo lineas. Rostrum, quod in exortu quinque lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices longum est; cauda tres pollices cum sex lineis; pes sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem cum semi lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas: posticus autem cum antico-

rum intimo longitudine con-
venit. Alis expansis, extre-
mitates majorum remigum
duodecim pollicum & sex li-
nearum intervallo distant;
alæ verò complicatæ me-
diam caudæ longitudinem
non attingunt. Pars colli su-
perior, dorsum & scapula-
res pennæ eleganti cœruleo
tinguntur. Uropygium & su-
periores caudæ tectrices sunt
splendidissimè cœruleo-be-
ryllinæ. Infra occipitium tæ-
nia extat transversa nigri-
cans. Guttur, collum, pec-
tus, venter, latera, crura,
inferiores caudæ tectrices &
pennæ alas subtus obregen-
tes albore nitent. Tectrices
alarum superiores minores,
sicut & majores corpori fi-
nitimæ, sunt cœruleæ : ma-
jores à corpore remotiores
in latere exteriore conco-
lores, in interiore nigræ. Re-
miges omnes subtus nigræ ;
superne verò majores in la-
tere exteriore cœruleæ, in
interiore nigræ : minores eo-
dem imbutæ cœruleo ac dor-
sum ipsum tingitur. Caudam
componunt duodecim rec-
trices, omnes infernè nigræ ;
superne verò binæ interme-
diæ cœruleæ : laterales in
latere exteriore concolores,
in interiore nigræ. Mandi-

que l'intérieur de ceux de de-
vant. Il a douze pouces six lig-
nes de vol ; & ses aîles, lors-
qu'elles sont pliées, ne s'éten-
dent pas tout-à-fait jusqu'à la
moitié de la longueur de la
queue. La partie supérieure de
la tête, le dos & les plumes
scapulaires sont d'un beau bleu.
Le croupion & les couvertures
du dessus de la queue sont d'un
bleu d'Aigue-marine fort bril-
lant. Au-dessous de l'occiput
est une bande transversale noi-
râtre. La gorge, le col, la poi-
trine, le ventre, les jambes,
les couvertures du dessous de
la queue, celles du dessous des
aîles & les côtés sont blancs.
Les petites couvertures du des-
sus des aîles, ainsi que les gran-
des les plus proches du corps,
sont bleues : les grandes les plus
éloignées du corps sont de la
même couleur du côté exté-
rieur, & noires du côté inté-
rieur. Toutes les plumes de
l'aîle sont noires en-dessous ;
mais en-dessus les grandes sont
bleues du côté extérieur, &
noires du côté intérieur : les
moyennes sont du même bleu
que le dos. La queue est com-
posée de douze plumes, toutes
noires en-dessous ; mais en-des-
sus les deux du milieu sont
bleues : les latérales sont de la
même couleur du côté exté-

rieur, & noires du côté intérieur. Le demi-bec supérieur est noir : l'inférieur est rouge. Les pieds sont de cette dernière couleur ; & les ongles noirs. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

bula superior nigra : inferior rubra. Pedes simili rubro tincti ; ungues verò nigri. Habitat in Cayana, unde in museum Realmurianum missa à D. Artur.

** 11. LE GRAND MARTIN-PESCHEUR DU SÉNÉGAL :

Voyez Pl. XL. Fig. 1.

Ispida superne cœruleo-beryllina, infernè alba ; capite, gutture & collo cinereo-albis ; taniâ utrinque rostrum inter & oculum, & rectricibus alarum superioribus nigris ; remigibus interiùs in exortu candidis ; rectricibus subtus nigris, superne cœruleo-beryllinis, lateralibus interiùs nigris. . . .
ISPIDA SENEGALENSIS MAJOR.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces neuf lignes. Son bec, qui a à son origine cinq lignes & demie d'épaisseur, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche deux pouces une ligne de long ; sa queue trois pouces ; son pied six lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes & demie, l'extérieur neuf lignes, & l'intérieur huit lignes :

Præcedentem crassitie circiter adæquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices explet, & ad extremos ungues septem pollices & novem lineas. Rostrum, quod in exortu quinque cum semi lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices cum linea una longum est ; cauda tres pollices ; pes sex lineas ; digitorum anteriorum medius cum ungue decem cum semi lineas, externus novem lineas, intimus octo lineas : posticus autem

cum anticorum intimo longitudine convenit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem usque protenduntur. Caput, guttur, collumque colore tinguntur cinereo-albo, in capite magis quàm in aliis prædictis partibus saturato. In utroque capituli latere tania extat longitudinalis nigra, ab exortu mandibulæ superioris orta, & ad oculum usque protensa. Dorsum, uropygium, superiores caudæ rectrices & scapulares pennæ sunt cœruleo-beryllinæ. Pennæ, venter, latera, crura, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes albescent. Rectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt nigrae : majores à corpore remotiores exterius cœruleo-beryllinæ, interiorius nigrae. Remiges majores subtus nigrae, attamen interiorius in exortu candidæ ; superne verò in latere interiori ad exortum candidæ, in reliqua longitudine nigrae, in latere exteriori cœruleo-beryllinæ, ad apicem nigrae ; minores interiorius su-

celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a douze pouces six lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge & le col sont d'un gris-blanc, qui est plus foncé sur la tête qu'ailleurs. De chaque côté de la tête est un bande longitudinale noire, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, & s'étend jusqu'à l'œil. Le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un bleu d'Aigue-marine. La poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps sont noires : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un bleu d'Aigue-marine du côté extérieur, & noires du côté intérieur. Les grandes plumes de l'aile sont noires en-dessous, excepté à leur origine du côté intérieur ; où elles sont blanches ; mais en-dessus leur côté intérieur est blanc à l'origine de la plume, ensuite noir dans tout le reste de sa longueur, & leur côté extérieur

est d'un bleu d'Aigue-marine, & terminé de noir : les moyennes sont blanches & terminées de noir dessus & dessous du côté intérieur ; mais leur côté extérieur est noir en-dessous, d'un bleu d'Aigue-marine en-dessus, & terminé de noir. La queue est composée de douze plumes, toutes noires en-dessous ; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un bleu d'Aigue-marine : toutes les latérales sont de la même couleur du côté extérieur, & noires du côté intérieur. Le demi-bec supérieur est rouge : l'inférieur est noir. Les pieds & les ongles sont de cette dernière couleur. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

perne & inférieure candidæ, nigro terminatæ, exterius verò subtus nigræ, superne cœruleo - beryllinæ, apice nigro præditæ. Caudam componunt duodecim rectrices, omnes subtus nigræ ; superne autem binæ intermediæ sunt cœruleo - beryllinæ : laterales omnes in latere exteriore concolores, in interiori nigræ. Mandibula superior rubra : inferior nigra. Pedes, unguesque similiter nigri. Habitat in *Senegallensi* regione, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Adanson*.

** 12. LE MARTIN - PESCHEUR BLEU DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XXXVIII. Fig. 2.

Ispida superne cœruleo-beryllina, inférieure castanea ; capite & collo castaneis ; gurgure sordide albo-flavicante ; rectricibus alarum superioribus corpori finitimis nigro-violaceis ; remigibus decem primoribus interius in exortu candidis ; rectricibus subtus nigris, superne cœruleo-beryllinis, laterales interius nigricante marginatis ISPIDA MADAGASCARIENSIS CÆRULEA.

Ispida. Klein. Avi. pag. 35. N°. 7.

Grand Martin-pêcheur de la Rivière de Gambia. Edwards. Tom. I. pag. VIII ; avec une figure pas assez bien coloriée Pl. 8.

Crassitie

Craffitie præcedentem multum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices æquat, & ad extremos ungues octo pollices & undecim lineas. Rostrum, quod in exortu septem lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda duos pollices & decem lineas; pes sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem, extimus novem cum semi lineas, intimus sex cum semi lineas: posticus autem adhuc est anticorum intimo paulò brevior. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est sexdecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad mediam caudæ longitudinem pertingunt. Caput, collum, pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes elegantis sunt castanei coloris, in capite & collo superiore paulò magis quàm in aliis prædictis partibus saturati. Guttur ex sordidè albo flavicat. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæque caudam superne cooperiunt, sunt splendidi

Tom. IV.

Il est beaucoup plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces onze lignes. Son bec, qui a à son origine sept lignes d'épaisseur, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche deux pouces six lignes de long; sa queue deux pouces dix lignes; son pied six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce, l'extérieur neuf lignes & demie, & l'intérieur six lignes & demie: celui de derrière est encore un peu plus court que l'intérieur de ceux de devant. Il a seize pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un beau marron: cette couleur est un peu plus foncée sur la tête & la partie supérieure du col qu'ailleurs. La gorge est d'un blanc sale & jaunâtre. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un bleu d'Aigue-marine très-brillant. Les petites & les grandes

R r r

couvertures du dessus des aîles les plus proches du corps sont d'un noir - violet : les petites les plus éloignées du corps sont d'un bleu d'Aigue - marine : les grandes aussi les plus éloignées du corps sont de la même couleur du côté extérieur, & noires du côté intérieur. Toutes les plumes de l'aîle sont noires en-dessous ; mais en-dessus les dix premières sont à leur origine d'un bleu d'Aigue - marine du côté extérieur, blanches du côté intérieur, & ensuite noirâtre des deux côtés dans toute leur longueur ; cette dernière couleur occupe dans chaque plume d'autant plus d'espace, que la plume est plus éloignée du corps : toutes les autres sont d'un bleu d'Aigue-marine très-brillant, & bordées intérieurement de noirâtre. La queue est composée de douze plumes, toutes noires en-dessous ; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un bleu d'Aigue-marine : toutes les latérales sont de la même couleur, & bordées intérieurement de noirâtre. Le bec & les pieds sont rouges ; & les ongles bruns. On le trouve le long de la Rivière de *Gambia*, & à *Madagascar*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

dissemé cœruleo-beryllinæ. *Tectrices alarum superiores majores & minores corpori finitimæ nigro-violaceæ : minores à corpore remotiores cœruleo-beryllinæ : majores pariter à corpore remotiores in latere exteriori concolores, in interiori nigræ. Remiges omnes inferne nigræ ; superne autem decem primores sunt in exortu exterius cœruleo-beryllinæ, interiori candidæ, dein per reliquam longitudinem in utroque latere nigricantes ; quæ nigredo eò majus in qualibet remige spatium occupat, quò remix fit à corpore remotior : reliquæ omnes splendidissimè cœruleo-beryllinæ, interiori nigricante fimbriatæ. Caudam componunt duodecim rectrices, omnes subtus nigræ ; superne verò binæ intermediae sunt cœruleo-beryllinæ : laterales omnes eodem colore imbutæ, interiori nigricante marginatæ. Rostrum, pedesque rubri ; ungues verò fusci. Habitat ad ripam fluminis *Gambensis*, & in *Madagascaria*, unde in *museum Realmurianum* allata à *D. Poivre*.*

13. LE MARTIN-PESCHEUR DE SMYRNE.

Ispida superne obscurè viridis, infernè castanea; capite & collo castaneis; gutture & taniâ transversâ in pectore candidis; rectricibus subtus nigricantibus, superne obscurè viridibus, lateralibus interiùs nigricante marginatis
ISPIDA SMYRNENSIS.

Martin-pêcheur de Smyrne. *Alb. Tom. III. pag. II; avec une figure passable Pl. 27.*

Les Anglois l'appellent SMYRNA KING-FISHER. Alb.

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & tres lineas. Rostrum, quod in exortu quinque lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices cum linea unica longum est; cauda unum pollicem & decem lineas; pes sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus novem lineas, intimus septem cum semi lineas: posticus adhuc anticorum intimo brevior. Alæ complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Caput, collum, pectus, venter, latera & crura pennis vestiuntur eleganter castaneis. Quæ caudam sub-

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces trois lignes. Son bec, qui a à son origine cinq lignes d'épaisseur, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche deux pouces une ligne de long; sa queue un pouce dix lignes; son pied six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes, l'extérieur neuf lignes, & l'intérieur sept lignes & demie: celui de derriere est encore plus court que ce dernier. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue &

Rrij

celles du dessous des ailes sont d'un beau marron. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd obscur. La gorge est blanche. Sur la poitrine est une bande transversale de la même couleur, qui a environ six lignes de large. Les petites couvertures du dessous des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un verd obscur : les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & noirâtres du côté intérieur. Toutes les plumes de l'aile sont noirâtres en-dessous ; mais en-dessus les grandes sont d'un verd obscur du côté extérieur & à leur bout, & noirâtres du côté intérieur : les moyennes sont des deux côtés d'un verd obscur, mais leur bord intérieur est noirâtre. La queue est composée de douze plumes, toutes noirâtres en-dessous, mais en-dessus les deux du milieu sont d'un verd obscur : les latérales sont de la même couleur, & bordées intérieurement de noirâtre. L'iris des yeux est blanchâtre. Le bec & les pieds sont rouges ; & les ongles noirâtres. On le trouve aux environs de *Smyrne*.

tus cooperiunt, alarumque teatrices inferiores concolores. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ teatrices obscurè viridi tinguntur. Guttur albicat. Pectus tæniâ insignitur transversâ similiter albicante, sex circiter lineas latâ. Superiores alarum teatrices minores, sicut & majores corpori viciniore, sunt obscurè virides : majores à corpore remotiores in latere exteriori & apice eodem imbutæ colore, in latere interiori nigricantes. Remiges omnes infernè quoque nigricant ; superne verò majores sunt in latere exteriori & apice obscurè virides, in latere interiori nigricantes : minores in utroque latere tingit color obscurè viridis, sed interiùs nigricante marginantur. Cauda duodecim constat rectricibus, omnibus subtus nigricantibus, superne verò binis intermediis obscurè viridibus : lateraliibus eodem colore imbutis ; attamen interiùs nigricante fimbriatis. Oculorum irides candicantes. Rostrum, pedesque rubri sunt ; ungues autem nigricant. Habitat circa *Smyrnam*.

14. LE GRAND MARTIN-PESCHEUR DE BENGALE.

Ispida superne dilutè viridi-cœrulescens, inferne alba; capite, collo superiore, imo ventre & tectricibus alarum superioribus majoribus corpori finitimis castaneis; ventre supremo utrinque ad latera quinque maculis fuscis vario; rectricibus subtus nigricantibus, superne dilutè viridi-cœrulescentibus, lateralibus interiùs nigricante marginatis....
ISPIDA BENGALENSIS MAJOR.

Grand Martin-pêcheur de Bengale. *Alb. Tom. III. pag. 11; avec une figure passable Pl. 28.*

Cum *Ispida Madagascariensis* cœrulea crassitie circiter convenit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & quinque lineas. Rostrum, quod in exortu septem circiter lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & novem lineas longum est; cauda duos pollices cum decem lineis; pes sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem, extimus decem lineas, intimus septem lineas: posticus autem adhuc anticorum intimo longitudine cedit. Alæ complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput & pars colli su-

Il est à peu près de la grosseur du *Martin-pêcheur bleu de Madagascar*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces cinq lignes. Son bec, qui a à son origine environ sept lignes d'épaisseur, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche deux pouces neuf lignes de long; sa queue deux pouces dix lignes; son pied six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce, l'extérieur dix lignes, & l'intérieur sept lignes: celui de derriere est encore plus court que l'intérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête & la partie supérieure

du col font d'un beau marron : cette couleur s'étend un peu sur la partie supérieure du dos. Le dos , le croupion , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue font d'un verd clair & bleuâtre. La gorge, la partie inférieure du col , la poitrine & le haut du ventre font blancs. Chacun des côtés du ventre est varié de cinq taches brunes assez grandes. Le bas-ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés font de couleur de marron. Les plus petites couvertures du dessus des ailes , ainsi que les grandes les plus éloignées du corps, font d'un verd clair & bleuâtre : toutes les autres font d'un beau marron. Toutes les plumes de l'aile font noirâtres en-dessous ; mais en-dessus les grandes font d'un verd clair & bleuâtre du côté extérieur & à leur bout, & noirâtres du côté intérieur : les moyennes font des deux côtés d'un verd clair & bleuâtre ; mais leur bord intérieur est noirâtre. La queue est composée de douze plumes, toutes noirâtres en-dessous ; mais en-dessus les deux du milieu font d'un verd clair & bleuâtre : les latérales font de la même couleur, & bordées intérieurement de noirâtre. L'iris des yeux est d'un beau jaune. Le bec est d'un

perior elegantis sunt castanei coloris : qui color paululum supra partem dorsi supremam protenditur. Dorsum , uropygium , pennæ scapulares ; superioresque caudæ rectrices sunt dilutè viridi-cœrulescentes. Guttur , pars colli inferior , pectus & venter supremus albicant. Ventris utrumque latus variegant quinque maculæ majusculæ , fuscæ. Imum ventrem , latera , crura & pennas caudam subtus cooperientes tingit castaneus color. Superiores alarum rectrices minimæ , sicut & majores à corpore remotiores , sunt dilutè viridi-cœrulescentes : reliquæ omnes eleganter castaneæ. Remiges omnes infernè nigricant ; superne verò majores sunt in latere exteriori & apice dilutè viridi-cœrulescentes , in latere interiori nigricantes : minores in utroque latere ex dilutè viridi cœrulescunt , orisque donantur interioribus nigricantibus. Caudam componunt duodecim rectrices , omnes subtus nigricantes ; superne autem binæ intermediæ dilutè viridi-cœrulescentes : laterales concolores , interiùs nigricante marginatæ. Oculorum irides eleganter luteæ.

Rostrum coccineum. Pedes, rouge vif. Les pieds & les ongles sont orangés. On le trouve in *Bengalensi* Regno. dans le Royaume de *Bengale*.

15. LE MARTIN-PESCHEUR A COLLIER DE BENGALE.

Ispida supernè obscure cœrulea, infernè lutea; capite superiore & uropygio sordidè rubris; maculâ in syncipite luteâ; taniâ utrinque per oculos nigrâ, ponè oculos obscurè cœruleâ; gutture & torque in collo superiore candidis; remigibus cinereo-griseis; rectricibus superne sordidè rubris...
ISPIDA BENGALENSIS TORQUATA.

Petit Martin-pêcheur de Bengale. *Alb. Tom. III. pag. 12; avec une figure passable (excepté les pieds) Pl. 29.*

Les Anglois l'appellent BENGALL KING-FISHER. *Alb.*

Ispidam nostratam crassitie circiter æmulatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem sex pollices & tres circiter lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum lineis binis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est; cauda quindecim lineas; pes quatuor cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas, extimus septem lineas, intimus quatuor cum semi lineas: posticus autem anticorum intimi longitudinem circiter adæquat. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque pro-

Il est à peu près de la grosseur de notre *Martin-pêcheur*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ six pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue quinze lignes; son pied quatre lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes, l'extérieur sept lignes, & l'intérieur quatre lignes & demie: celui de derrière est à peu près de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur

de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un rouge terni. Sur le synciput est une tache jaune. De chaque côté de la tête part de l'origine du bec une bande noire, qui passe par les yeux; derrière lesquels est une autre bande longitudinale d'un bleu sombre. La partie supérieure du col est entourée d'une bande transversale blanche, qui forme une espèce de collier. Le reste du dessus du col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un bleu sombre. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un rouge terni. La gorge est blanche. Les côtés de la tête au-dessous des yeux, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau jaune. Les couvertures du dessus des ailes sont d'un cendré-gris. Les plumes de l'aile sont de la même couleur. La queue est composée de douze plumes, qui sont en-dessus d'un rouge terni. Le bec, les pieds & les ongles sont d'un rouge vif. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*.

tenduntur. Capitis superior pars est sordidè rubra. In syncipite macula extat lutea. In utroque capitis latere ab exortu rostri oritur tænia nigra, per oculos ducta; & ponè oculos altera adest tænia longitudinalis obscurè cœrulea. Partem colli superiorem cingit fascia transversa candida, torquem quodammodo efficiens. Colli superioris reliqua pars, dorsum & scapulares pennæ sunt obscurè cœruleæ. Uropygium & superiores caudæ tectrices sordidè rubræ. Guttur candidum. Caput ad latera, idque infra oculos, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & pennæ caudam subtus obtegentes eleganti luteo tinguntur. Superiores alarum tectrices sunt cinereo-griseæ. Remiges eodem imbutæ colore. Cauda duodecim confatur rectricibus superne sordidè rubris. Rostrum, pedes, unguesque coccinei. Habitat in *Bengalensi* Regno.

16. LE MARTIN-PESCHEUR BLEU D'AMÉRIQUE.

Ispida superne cœruleo-violacea, infernè dilutè lutea; capite & collo superiore spadiceo-purpureis; remigibus cinereo-griseis; rectricibus superne cœruleo-violaceis, subtus cinereis . . . ISPIDA AMERICANA CÆRULEA.

Ispida rostro albo. Klein. Avi. pag. 35. N°. 4.

Alcedo Americana, seu Apialtra. Seb. Vol. I. pag. 87. hujus icon accurata Tab. LIII. fig. 3.

Præcedenti crassitie cedit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem & ad extremos ungues quatuor pollices & decem circiter lineas æquat. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & quatuor cum semi lineas longum est; cauda decem lineas; pedes tres lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue sex lineas, extimus quinque cum semi lineas, intimus quatuor lineas: & posticus anticorum intimo paululum adhuc longitudine cedit. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput & pars colli superior ex spadiceo ad purpureum inclinant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ rectrices sunt splendide cœruleo-violacæ. Guttur, partem colli inferiorem, pec-

Tom. IV.

Il n'est pas si gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue & jusqu'à celui des ongles est d'environ quatre pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce quatre lignes & demie de long; sa queue dix lignes; son pied trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes, l'extérieur cinq lignes & demie, & l'intérieur quatre lignes: celui de derrière est encore un peu plus court que l'intérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont d'un rouge-bai tirant sur le pourpre. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un bleu-violet éclatant. La gorge, la

Sff

partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un jaune clair. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré-gris. Les plumes de l'aile sont de cette dernière couleur. La queue est composée de douze plumes d'un bleu-violet éclatant en-dessus, & cendrées en-dessous. Le bec est blanchâtre. *Seba* n'a rien dit de la couleur des pieds. On le trouve en *Amérique*.

tus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ dilutè luteæ. Quæ caudam subtus cooperiunt, concolores. Superiores alarum rectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores sunt cinereo-griseæ. Remiges simili cinereo-griseo tinctæ. Cauda duodecim constat rectricibus superne splendidè cœruleo-violeis, subtus cinereis. Rostrum candicans. De colore pedum nulla apud *Sebam* facta est mentio. Habitat in *America*.

17. LE MARTIN-PESCHEUR HUPÉ DES INDES.

Ispida cristata, superne cœruleo-violacea, infernè saturatè lutea; capite superiore nigro transversim striato; rectricibus alarum superioribus cœruleo-beryllinis; rectricibus superne cœruleo-violaceis, subtus nigris . . . *ISPIDA INDICA CRISTATA*.

Ispida cristata. *Klein. Avi. pag. 34. N° 3.*

Alcedo cristata, *Orientalis*, elegantissimè picta. *Seb. Vol. I. pag. 104. hujus icon non satis accurata Tab. LXVII. fig. 4.*

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces quatre lignes. Son bec

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues quinque pollices & quatuor

lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindécim cum semi lineas longum est ; cauda quatuordecim lineas ; pes tres cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue septem lineas , extimus sex cum semi lineas , intimus tres cum semi lineas : posticus autem anticorum intimum longitudine æmuletur. Alæ complicatæ tres circiter quartas longitudinis caudæ partes attingunt. Caput , pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares & superiores caudæ teñtrices sunt splendidissimè cœruleo-violaceæ. Pennæ caput superius vestientes longæ sunt , striatior , nigro transversim striatæ , & quodammodo cristam efformant. Guttur , pars colli inferior , pectus , venter , latera , crura & pennæ caudam subtus obtegentes luteo imbuuntur saturato. Superiores alarum teñtrices minores , sicut & majores corpori viciniore , sunt dilutè quidem , sed splendidissimè , cœruleo-beryllinæ : majores à corpore remotiores in latere exteriori concolores , in interiori nigræ. Remiges omnes subtus nigræ ; superne autem majores

depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes & demie de long ; sa queue quatorze lignes ; son pied trois lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , sept lignes , l'extérieur six lignes & demie , & l'intérieur trois lignes & demie : celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un bleu - violet très-éclatant. Les plumes du dessus de la tête sont longues , étroites , rayées transversalement de noir , & forment une espèce de hupe. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un jaune foncé. Les petites couvertures du dessus des ailes , ainsi que les grandes les plus proches du corps , sont d'un bleu d'Aigue - marine clair , mais très-brillant : les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur du côté extérieur , & noires du côté in-

térieur. Toutes les plumes de l'aile sont noires en-dessous ; mais en-dessus les grandes sont bleues du côté extérieur , & noires du côté intérieur : les moyennes sont bleues des deux côtés. La queue est composée de douze plumes d'un bleu-violet en-dessus , & noires en-dessous. Le bec est d'un rouge clair. *Seba* n'a pas parlé de la couleur des pieds. On le trouve aux *Indes Orientales*.

sunt exterius cœruleæ , interiorius nigrae : minores in utroque latere cœruleæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus superne cœruleo-violeceis , subtus nigris. Rostrum dilute rubrum. De colore pedum *Seba* nequaquam locutus est. Habitat in *India Orientali*.

** 18. LE MARTIN-PESCHEUR DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XXXVIII. Fig. 1.

Ispida superne rufa , infernè albo-rufescens ; gutture & collo inferiore candidis ; remigibus nigricantibus , exterius rufo marginatis ; rectricibus subtus nigricantibus , superne rufis , lateralibus interiorius nigricantibus *ISPIDA MADAGASCARIENSIS*.

Il est à peu près de la grosseur du *Martin-pêcheur hupé des Philippines*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes & demie de long ; sa queue un pouce ; son pied quatre lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint

Ispidam Philippensem cristatam crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & tres lineas explet , & ad extremos ungues quinque pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim cum semi lineas longum est ; cauda unum pollicem ; pes quatuor cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum un-

gue septem cum semi lineas; extimus sex cum semi lineas, intimus quinque lineas : & posticus anticorum intimo paululum longitudine cedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est septem pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ mediam circiter longitudinem caudæ pertingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, superiores caudæ rectrices & scapulares pennæ rufo tinguntur colore. Guttur & collum inferius sunt candida. Pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes albescent, & aliquid rufescentis admixtum habent. Superiores alarum rectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt rufæ : majores à corpore remotiores in latere exteriori concolores, in interiore nigricantes. Remiges quoque nigricant, & marginibus donantur exterioribus rufis : quæ margines eò majorem obtinent latitudinem, quò remix fit corpori vicinior. Caudam componunt duodecim rectrices, omnes subtus nigricantes ; superne verò binæ intermediæ rufæ : laterales in latere exteriori

avec l'ongle, sept lignes & demie, l'extérieur six lignes & demie, & l'intérieur cinq lignes : celui de derrière est un peu plus court que l'intérieur de ceux de devant. Il a sept pouces six lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont roux. Les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont de la même couleur. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un blanc mêlé d'une légère teinte de roux. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont rouffes : les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur du côté extérieur, & noîrâtres du côté intérieur. Les plumes de l'aîle sont de cette dernière couleur, & bordées extérieurement de roux : cette bordure est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps. La queue est composée de douze plumes, toutes noîrâtres en-dessous ; mais en-

dessus les deux du milieu sont rousses : les latérales sont de la même couleur du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur. Le bec, les pieds & les ongles sont rouges. On le trouve aux *Philippines* & à *Madagascar*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

concolores, in interiore nigricantes. Rostrum, pedes, unguisque rubri. Habitat in *Philippensibus Insulis* & *Madagascaria*, unde in *museum Realmurianum* allata à *D. Poivre*.

19. LE MARTIN-PESCHEUR DU BRÉSIL:

Ispida superne rufescens, spadiceo, fusco & albo mixta, infernè alba; taniâ utrinque per oculum fusca; remigibus, rectricibusque rufescentibus, maculis transversis albis notatis ISPIDA BRASILIENSIS.

*Avis anonyma prima. Marcgr. Hist. Br. pag. 219.
Jonst. Avi. pag. 150.*

Il est à peu près de la même grandeur & de la même grosseur que le *notre*. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un roussâtre mêlé de rouge-bai, de brun & de blanc. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. De chaque côté de la tête est une bande brune, qui part de l'origine du bec, & passe par les yeux.

Magnitudine & crassitie cum *Ispida nostrate* circiter convenit. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ rectrices sunt rufescentes, spadiceo, fusco & albo mixtæ. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus obtegentes albi sunt coloris. In utroque capitis latere taniâ extat fusca, ab exortu rostri orta, & per oculum ducta. Remiges rufescunt, maculisque trans-

versis albis notantur. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concoloris. Oculi sunt nigri. Rostrum similiter nigrum. Pedes, unguisque fusci. Habitat in *Brasilia*.

Les plumes de l'aile sont roussâtres, & marquées de taches transversales blanches. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles de l'aile. Les yeux sont noirs, ainsi que le bec. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve au *Brésil*.

20 LE MARTIN-PESCHEUR HUPÉ DU BRÉSIL.

Ispida cristata, superne splendide ferruginea, inferne alba; maculâ utrinque prope oculum & torque in collo superiore candidis; remigibus, rectricibusque ferrugineis, maculis transversis albis notatis *ISPIDA BRASILIENSIS CRISTATA*.

Alcedo muta, cirrata, subviridis. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 122.*

Alcedo Americana, cirrata, subviridis. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. III.*

sp. 3.

Ispidæ affinis, Jaguacati guacu Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag. 49.*

Nº. 2.

Ispidæ affinis, Jaguacati guacu Brasiliensibus Marcgravio. *Willugh.*

Ornith. pag. 102. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XXIV.

Jaguacati guacu Brasiliensibus, Papa piexe Lusitanis. *Marcgr. Hist. Br. pag. 194, in qua hujus icon minùs accurata.*

Jonst. Avi. pag. 133. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 57.

Jaguacati guacu Brasiliensibus Marcgravii. *Moehr. Avi. Gen. 113.*

Les Portugais l'appellent PAPA PIEXE. *Marcgr. Jonst. Willugh. Barr.*

Les Brasiiliens, JAGUACATI GUACU. *Marcgr. Jonst. Willugh. Moehr.*

Turdelam crassitie circiter æquat. Rostrum habet ab ipso apice ad oris angulos usque tres fermè pollices longum; caudam duos pollices longam. Alæ complicatæ ad mediam circiter longitudinis caudæ partem extendun-

Il est à peu près de la grosseur d'une *Litorne*. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a presque trois pouces de long; & sa queue deux pouces. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la

longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'une couleur ferrugineuse, mais brillante. De chaque côté de la tête est une tache blanche, placée auprès de l'œil. Le dessus du col est entouré d'une bande transversale de la même couleur, qui forme une espece de collier. Les plumes de l'occiput sont un peu plus longues que les autres, & forment une hupe. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont de la même couleur. Les plumes de l'aile sont d'un ferrugineux marqué de taches transversales blanches. La queue est composée de douze plumes colorées comme celles de l'aile. Les yeux sont noirs. Le bec, les pieds & les ongles sont de la même couleur. Il se nourrit de *Poissons*. On le trouve dans la *Guiane* & au *Brésil*.

tur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superioresque caudæ rectrices sunt ferruginei coloris & splendentis. In utroque capitis latere macula extat candida, prope oculum posita. Tania transversa concolor collum superius cingit, & torquem quodammodo efficit. Pennæ in occipitio reliquas longitudine superant, & cristam efformant. Guttur, collum inferius, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ albæ. Quæ caudam subtus obtegunt, alarumque rectrices inferiores similiter albicant. Remiges sunt ferrugineæ, maculis transversis albis notatæ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Oculi nigri sunt coloris. Rostrum, pedes, unguesque similiter nigri. *Piscibus* viçitat. Habitat in *Guiana* & *Brasilis*.

21. LE MARTIN-PESCHEUR HUPÉ DE LA CAROLINE.

Ispida cristata, superne cinereo-cœrulescens, internè alba; maculâ utrinque duplici; aliâ propè basim rostri, alterâ infra

infra oculum candida; torque albo; colli inferioris parte infimâ cinereo-cœrulescente; tæniâ transversâ in pectore castaneâ; remigibus majoribus nigris, interiùs maculis transversis albis notatis, & maculâ albâ terminatis; rectricibus subtus nigris, superne cinereo-cœrulescentibus, maculâ albâ terminatis ISPIDA CAROLINENSIS CRISTATA.

Ispida. Klein. Avi. pag. 35. N°. 6.

Alcyon. Catesb. Tom. I. pag. 69; avec une assez bonne figure (excepté les pieds) Pl. 69.

Les Anglois l'appellent KING-FISHER. Catesb.

Crassitie *Merulam* paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & tres lineas. Rostrum, quod in exortu novem lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda tres pollices; pes sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus decem lineas, intimus septem lineas: posticus autem adhuc est anticorum intimo paulò brevior. Alæ complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ rectri-

Tom. IV.

Il est un peu plus gros qu'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces trois lignes. Son bec, qui a à son origine neuf lignes d'épaisseur, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche deux pouces six lignes de long; sa queue trois pouces; son pied six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur dix lignes, & l'intérieur sept lignes: celui de derrière est encore un peu plus court que ce dernier. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue

T t t

font d'un cendré-bleuâtre. Les plumes de l'occiput sont assez longues, & forment une espèce de lupe. De chaque côté de la tête sont deux taches blanches, l'une placée auprès de la base du demi-bec supérieur, & l'autre au-dessous de l'œil. La gorge, la partie inférieure du col qui en est la plus voisine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Le col est entouré d'un collier de la même couleur. Le bas de la partie inférieure du col est d'un cendré-bleuâtre. Sur la poitrine est une bande transversale d'un beau marron, d'environ neuf lignes de largeur. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un cendré-bleuâtre : les grandes sont de la même couleur, & terminées par une petite tache blanche. Les grandes plumes de l'aile sont noires, marquées du côté intérieur de taches transversales blanches, & terminées par une petite tache de la même couleur : les moyennes sont noires en-dessous, d'un cendré-bleuâtre en-dessus, & terminées par une petite tache blanche. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aile. Le bec est

ces ex cinereo cœrulescunt. Pennæ occipitium vestientes sunt longiusculæ, & cristam quodammodo efficiunt. In utroque capitis latere binæ sunt maculæ candidæ, alia prope basim mandibulæ superioris, altera infra oculum posita. Guttur, pars colli inferior ipsi finitima, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores albicant. Torquis similiter albus collum cingit. Collum inferius in parte infima ex cinereo cœrulescit. Pectus taniâ insignitur transversâ eleganter castaneâ, novem circiter linearum latitudinem obtinente. Superiores alarum rectrices minores sunt cinereo-cœrulescentes : majores eodem imbutæ colore, exiguâ maculâ candidâ terminatæ. Remiges majores nigræ, in latere interiore maculis transversis albis notatæ, minutâque maculâ concolore terminatæ : minores subtus nigræ, superne cinereo-cœrulescentes, minutâ maculâ albâ in extremitate insignitæ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque fusci. *Lacertis,*

sicut & *Piscibus*, viſitat. noir. Les pieds & les ongles
Habitat in *Carolina*. ſont bruns. Il ſe nourrit de *Lézards*, ainſi que de *Poiſſons*. On
le trouve à la *Caroline*.

** 22. LE MARTIN-PESCHEUR HUPÉ DE S. DOMINGUE.

Ispida criſtata, ſuperne cinereo - cœruleſcens, infernè alba;
maculâ utrinque duplici, aliâ roſtrum inter & oculum,
alterâ ponè oculum candidâ; torque albo; colli inferioris
parte infimâ cinereo-cœruleſcente, pennis in apice ruſeſ-
cente marginatis; remigibus majoribus nigricantibus, ex-
teriùs maculis tranſverſis albis notatis; rectricibus ſubtus
nigricantibus, ſuperne cinereo-cœruleſcentibus, maculis
tranſverſis albis inſignitis *ISPIDA DOMINICENSIS*
CRISTATA.

Martin-pêcheur de l'Amérique. *Edwards. Tom. III. pag. CXV; avec une*
figure exacte Pl. 115.

Les Anglois l'appellent *AMERICAN KING'S-FISHER. Edwards.*

Cum præcedente craſſi-
tie circiter convenit. Ipius
longitudo à roſtri apice ad
caudæ extremitatem un-
decim pollices & tres li-
neas æquat, & ad extremos
ungues novem pollices &
ſex lineas. Roſtrum, quod
in exortu quinque cum ſemi
lineas craſſum, ab ipſius api-
ce ad oris angulos uſque duos
pollices & quinque lineas
longum eſt; cauda tres pol-
lices & ſex lineas; pes quin-
que cum ſemi lineas; trium
digitorum anticorum me-
dius cum ungue unum pol-
licem, extimus undecim li-
neas, intimus ſeptem cum

Il eſt à peu près de la groſ-
ſeur du précédent. Sa longueur
depuis le bout du bec juſqu'à
celui de la queue eſt d'onze
pouces trois lignes, & juſqu'à
celui dès ongles de neuf pouces
ſix lignes. Son bec, qui a à ſon
origine cinq lignes & demie
d'épaiſſeur, a depuis ſa pointe
juſqu'aux coins de la bouche
deux pouces cinq lignes de
long; ſa queue trois pouces ſix
lignes; ſon pied cinq lignes &
demie; celui du milieu des trois
doigts antérieurs, joint avec
l'ongle, un pouce, l'extérieur
onze lignes, & l'intérieur ſept
lignes & demie: celui de der-
rière eſt encore beaucoup plus

court que ce dernier. Il a un pied sept pouces six lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-bleuâtre. Les plumes du sommet de la tête sont longues & étroites , & forment une espece de hupe. De chaque côté de la tête sont deux petites taches blanches , placées , l'une entre le bec & l'œil , & l'autre derrière l'œil. La gorge , la partie inférieure du col qui en est la plus voisine , la poitrine & le ventre sont blancs : cette couleur remonte de chaque côté de la partie inférieure du col vers la partie supérieure , & forme une espece de collier. Le bas de la partie inférieure du col est d'un cendré-bleuâtre , chaque plume étant bordée de roussâtre par le bout. Les jambes , les couvertures du dessous de la queue , celles du dessous des aîles & les côtés sont variés de blanc & de roux. Les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un cendré bleuâtre : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur , & terminées de blanc :

femi lineas : & posticus adhuc anticorum intimo longitudine cedit. Alis expansis , extremitates majorum remigum unius pedis septem pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Caput , pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , superioresque caudæ tectrices ex cinereo cœrulescunt. Summum caput vestiunt pennæ longæ & strictiores , cristam quodammodo efformantes. In utroque capitis latere binæ extant minutæ maculæ candidæ , alia rostrum inter & oculum , altera ponè oculum posita. Guttur , partem colli inferiorem ipsi finitimam , pectus & ventrem vestiunt pennæ albæ : albedo autem ab utroque colli inferioris latere versùs partem colli superiorem sursum protenditur , & torquem quodammodo efficit. Collum inferius in parte infima obtinent pennæ cinereo-cœrulescentes , in apice rufescente marginatæ. Latera , crura , inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus cooperientes albo & rufo variegantur. Superiores alarum

testrices minores sunt cinereo-cœrulescentes : majores corpori finitimæ concolores, apice albo præditæ : majores tandem à corpore remotiores nigricantes, & simili modo albo terminatæ. Remiges majores nigricant, & in latere exteriori maculis insigniuntur transversis albis ; paucos quoque candidos interiorius in exortu notantur : minores subtus nigricantes ; superne autem sunt in latere exteriori cinereo-cœrulescentes, albo terminatæ, & in latere interiori nigricantes, versus margines albo variegatæ ; quæ albedo cum nigricante colore dentatim immiscetur : ex istis tamen excipiendæ sunt binæ tresque corpori viciniore superius in tota superficie cinereo-cœrulescentes. Caudam componunt duodecim rectrices subtus nigricantes, superne cinereo-cœrulescentes, exteriorius & interiorius maculis transversis albis insignitæ. Rostrum nigricans, attamen in mandibulæ inferioris basi rubescens. Pedes rubri ; ungues verò nigri. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *Museum Realmurianum* missa à *D. Chervain*. Habitat quoque in *Freto Hudsonis*, &

enfin les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & pareillement terminées de blanc. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres, & marquées sur le côté extérieur de taches transversales blanches ; elles ont aussi un peu de blanc à leur origine du côté intérieur : les moyennes sont noirâtres en-dessous ; mais en-dessus leur côté extérieur est d'un cendré-bleuâtre, & terminé de blanc, & leur côté intérieur est noirâtre, & varié vers ses bords de blanc, formant une espèce de dentelure qui s'engrene dans le noirâtre : il faut cependant excepter les deux ou trois plus proches du corps, dont le dessus est entièrement d'un cendré-bleuâtre. La queue est composée de douze plumes noirâtres en-dessous, d'un cendré-bleuâtre en-dessus, & marquées des deux côtés de taches transversales blanches. Le bec est noirâtre, excepté la base du demi-bec inférieur, qui est rougeâtre. Les pieds sont rouges ; & les ongles noirs. On le trouve à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*. On le trouve aussi à la *Baye de Hudson*, & en différents endroits de l'*Amérique*.

variis *Americæ* regionibus.

** 23. LE MARTIN-PESCHEUR HUPÉ DU MEXIQUE.

Voyez Pl. XLI. Fig. 1.

Ispida cristata, superne cinereo-cœrulescens, infernè castanea, torque albo, versùs dorsum in acumen producto; gutture & maculâ utrinque rostrum inter & oculum candidis; remigibus minoribus & rectricibus nigricantibus, maculis transversis albis notatis, exteriùs cinereo-cœrulescente marginatis ISPIDA MEXICANA CRISTATA.

Avis torquata. *Euf. Nieremb. pag. 222.*

Achalactli, seu Piscium voratrix. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 13. cap. III.*

Achalactli, f. Avis Piscium vibratrix. *Jonst. Avi. pag. 128.*

Willugh. Ornith. pag. 301.

Raj. Syn. Avi. pag. 156.

Les Mexiquains l'appellent ACHALALACTLI. Nieremb. Fern. Jonst. Willugh.

Raj. & quelques-uns, MICHALALACTLI. Nieremb. Fern. Jonst. Willugh.

Il est un peu plus gros qu'une Pie. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces dix lignes. Son bec, qui a à son origine neuf lignes d'épaisseur, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche trois pouces huit lignes de long; sa queue quatre pouces six lignes; son pied six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur un pouce, & l'intérieur neuf lignes & demie: celui de derrière n'a que cinq lignes & demie de longueur. Il a deux

Craissie Picam nonnihil antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues duodecim pollices cum sex lineis. Rostrum, quod in exortu novem lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & octo lineas longum est; cauda quatuor pollices cum sex lineis; pes sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extremus unum pollicem, intimus novem cum semi lineas: posticus autem

quinque tantum cum semi lineas longus. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum unius pollicis & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad mediam circiter longitudinem caudæ pertingunt. Caput obtegunt pennæ longæ, strictiores, nonnihil saturatè cinereo-cœrulescentes, collo superiori incumbentes, & cristam quodammodo efficientes. Guttur albicat : albedo autem, torquis in modum, collum ambit, & deinde versùs dorsum in acumen protenditur. In utroque capitis latere macula extat candida, rostrum inter & oculum posita. Dorsum, uropygium, superiores caudæ tectrices & pennæ scapulares minimæ ex cinereo cœrulescunt. Collum inferius, pectus, venter, latera & inferiores caudæ tectrices minores eleganti castaneo tinguntur, pennis tamen in pectore nonnihil ad margines dilutioribus. Crura sunt fulva, candicante variegata. Tectrices caudæ inferiores majores dilutissimè fulvæ, nigro transversim striatæ. Inferiores alarum tectrices minores eleganter castaneæ : pieds un pouce six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête est couverte de plumes longues & étroites, d'un cendré-bleuâtre un peu foncé : ces plumes tombent sur la partie supérieure du col, & forment une espece de hupe. La gorge est blanche : cette couleur entoure le col, en formant un collier, & ensuite descend en pointe jusque vers le dos. De chaque côté de la tête est une tache blanche, placée entre le bec & l'œil. Le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plus petites des plumes scapulaires sont d'un cendré-bleuâtre. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les petites couvertures du dessous de la queue sont d'un beau marron, les bords des plumes de la poitrine étant un peu plus clairs. Les jambes sont d'un fauve varié de blanchâtre. Les grandes couvertures du dessous de la queue sont d'un fauve très-clair, rayé transversalement de noir. Les petites du dessous des aîles sont d'un beau marron : les grandes, ainsi que le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, sont fauves. Les petites couvertures

du dessus des ailes sont joliment variées de cendré-bleuâtre, de noirâtre & de jaunâtre : les grandes les plus proches du corps sont d'un cendré-bleuâtre, tacheté de blanc : & les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & variées de quelques taches blanches sur leur bord extérieur & à leur bout. Les grandes plumes de l'aile sont noires, & variées de taches blanches : les moyennes plumes de l'aile & les grandes scapulaires sont noirâtres, marquées de taches transversales blanches, & bordées extérieurement de cendré-bleuâtre. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aile. La prunelle des yeux est noire ; leur iris est blanchâtre. Le bec est brun, excepté la base du demi-bec inférieur, qui est rougeâtre. Les pieds sont rouges ; & les ongles sont noirs. On le trouve au *Mexique* & à *la Martinique*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

maiores, sicut & alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, fulvæ. Superiores minores cinereo-cœrulescente, nigricante & flavicante elegantè variæ : majores corpori finitimæ cinereo-cœrulescentes, albo maculatæ : majores tandem à corpore remotiores nigricantes, ad margines exteriores & in apice maculis quibusdam candidis variegatæ. Remiges majores nigrae, maculis albis variæ : minores remiges, sicut & scapulares majores nigricantes, maculis transversis albis insignitæ, & exteriùs cinereo-cœrulescente fimbriatæ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores. Oculorum pupilla est nigra ; ipsorum irides candicantes. Rostrum fuscum, attamen in mandibulæ inferioris basi rubescens. Pedes rubri ; ungues verò nigri. Habitat in *Mexico* & *Martinica*, unde missa est in museum *D. Aubry*.

** 24. LE MARTIN-PESCHEUR BLANC ET NOIR.

Voyez Pl. XXXIX. Fig. 2.

Isipida superne albo & nigro varia, infernè alba, pectore & lateribus nigro maculatis ; capite & collo superiore nigris ;
lineolis

lineolis longitudinalibus albis variis ; taniâ utrinque supra oculos candidâ ; rectricibus albis , fasciâ transversâ nigrâ versûs apicem notatis , utrinque extimâ binis maculis semicircularibus nigris insignitâ ISPIDA EX ALBO ET NIGRO VARIA.

Ispida ex atro & albo varia. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 313. N°. LIV. hujus icon minimè accurata Tab. 255. fig. 3.

Raj. Syn. Avi. pag. 182. N°. 14.

Ispida ex albo & nigro varia. Klein. Avi. pag. 36. N°. 8.

Martin-pescheur blanc & noir. Edwards. Tom. 1. pag. IX ; avec une figure pas assez bien coloriée Pl. 9.

Les Anglois de la Jamaïque l'appellent CRAB-CATCHER. Sloane. Raj.

Cum *Ispida Madagascariensi* cœrulea crassitie circiter convenit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & tres lineas æquat , & ad extremos ungues octo pollices & decem lineas. Rostrum , quod in exortu septem lineas crassum , ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & undecim lineas longum est ; cauda duos pollices & decem lineas ; pes quinque lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue novem cum semi lineas , extimus octo cum semi lineas , intimus sex lineas : posticus autem anticorum intimo longitudine cedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & quinque pollicum ;

Tom. IV.

Il est à peu près de la grosseur du *Martin-pêcheur bleu de Madagascar*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles de huit pouces dix lignes. Son bec , qui a à son origine sept lignes d'épaisseur , a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche deux pouces onze lignes de long ; sa queue deux pouces dix lignes ; son pied cinq lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , neuf lignes & demie , l'extérieur huit lignes & demie , & l'intérieur six lignes : celui de derriere est encore plus court que l'intérieur de ceux de devant. Il a un pied cinq pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de

V u u

la queue. La tête & la partie supérieure du col sont couvertes de plumes noires, bordées de blanc des deux côtés; ce qui forme de petites lignes longitudinales de cette couleur. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale blanche, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, & s'étend jusque sur le col, en passant par-dessus les yeux. Les plumes qui couvrent le dos & le croupion, ainsi que les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue, sont variées de noir & de blanc, chacune étant de cette dernière couleur, & marquée vers le bout d'une grande tache ronde noire : ces taches sont très-grandes sur les scapulaires. La poitrine & les côtés sont blancs, & variés de quelques taches noires. La gorge, la partie inférieure du col, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un blanc sans taches. La première des plumes de l'aile est noire, & bordée extérieurement de blanc : les sept suivantes, savoir depuis la seconde jusqu'à la huitième inclusivement, sont blanches à leur origine, & noires vers leur bout : les cinq qui suivent, sa-

alæ verò complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput & partem colli superiorem vestiunt pennæ nigræ, in utroque latere albo marginatæ; quæ albedo lineolas longitudinales concolores efficit. In utroque capitis latere tænia extat longitudinalis candida, ab exortu mandibulæ superioris orta, supra oculos ducta, & ad collum usque protensa. Pennæ dorsum & uropygium obtegentes, scapulares, alas superne vestientes & superiores caudæ testrices albo & nigro variegantur; quælibet scilicet penna alba est, & versus ipsius extremitatem majusculâ maculâ rotundâ nigrâ insignitur : quæ maculæ in scapularibus pennis sunt amplissimæ. Pectus & latera alba sunt, & maculis quibusdam nigris varia. Guttur, collum inferius, venter, crura, testrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus cooperientes albescent, & maculis destituuntur. Remix prima nigra est, exterius albo marginata : septem quæ sequuntur, à secunda scilicet ad octavam usque inclusivè, sunt in exortu albæ,

versus extremitatem nigræ : quinque sequentes , à nona scilicet ad decimam-tertiam usque inclusivè , similiter in exortu albæ , in reliqua longitudine nigræ , attamen in latere interiore versus margines maximâ parte candidæ : reliquæ omnes remiges albæ , exteriùs versus apicem nigro maculatæ : quæ nigredo supra latus interius paululùm extenditur , idque eò magis , quò remix fit corpori vicinior. Remix prima valdè brevis est: tertia & quarta reliquas omnes longitudine excedunt. Caudam componunt decem rectrices albæ , taniâ transversâ nigrâ versus apicem notatæ , quæ tania eò majorem obtinet latitudinem , quò minùs rectrix est extrema ; ita ut tania ista rectricum duarum intermediarum mediam ferè longitudinem occupet : rectrix insuper utrinque extrema supra taniam nigram duabus insignitur minutis maculis similiter nigris , semicircularibus , ad ipsius margines , utrinque scilicet unâ , positis : duodecim rectrices albo insuper terminantur. Rostrum , pedes , unguesque nigri. Habitat in *Jamaica* , *Asia* & *Africa* , A Capite Bonæ Spei

voir depuis la neuvième jusqu'à la treizième inclusivement , sont pareillement blanches à leur origine ; le reste est noir , excepté cependant la plus grande partie du côté intérieur vers ses bords , qui est blanche : toutes les autres plumes de l'aile sont blanches , & marquées de noir vers leur bout du côté extérieur : ce noir s'étend un peu sur le côté intérieur , & s'y étend d'autant plus que la plume est plus proche du corps. La première des plumes de l'aile est extrêmement courte : la seconde & la troisième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes blanches , marquées vers leur bout d'une bande transversale noire , d'autant plus large , que la plume est moins extérieure ; de sorte que dans les deux plumes du milieu cette bande occupe presque la moitié de leur longueur : la plume la plus extérieure de chaque côté est de plus marquée au-dessus de cette bande noire de deux petites taches de même couleur , en forme de demi-cercle , placées sur les bords de la plume , sçavoir une de chaque côté : ces douze plumes sont en outre terminées de blanc. Le bec , les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve

à la Jamaïque, en Asie & en Afrique. Il a été envoyé du Cap de Bonne Espérance à M. de Reaumur par M. l'Abbé de la Caille.

in *musæum Realmurianum* missa est à D. Abbate de la Caille.

25. LE MARTIN-PESCHEUR TACHETÉ DU BRÉSIL.

Ispida superne fusca, pallidè flavo maculata, infernè alba, fusco punctulata; gutture flavo; remigibus, rectricibusque fuscis, maculis transversis pallidè flavis notatis . . . Ispida BRASILIENSIS NÆVIA.

Matuitui. *Pison. Hist. Nat. pag. 95, in qua hujus icon à Maregravio mutuata.* Matuitui Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 217, in qua hujus icon minimè accurata.*

Jonst. Avi. pag. 148. hujus icon à Maregravio mutuata Tab. 60.

Matuitui Brasiliensibus Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 147. hujus icon à Maregravio mutuata Tab. XXXVIII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 165. N^o. 3.

Les Brasiliens l'appellent MATUITUI. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Il est de la grandeur & de la grosseur d'un *Etourneau*. Sa queue est longue de deux pouces six lignes. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun tacheté de jaune pâle. La gorge est jaune. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs, & variés de petits point bruns. Les plumes de l'aile sont brunes, & marquées de taches transversales d'un

Magnitudine & crassitie cum *Sturno* convenit. Caudam habet duos pollices & sex lineas longam. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ fuscae, pallidè flavo maculatae. Scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ rectrices concolores. Guttur flavo imbutur colore. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & inferiores caudæ rectrices albescent, punctulisque variegantur fuscis. Remiges alarum sunt fuscae, maculis transversis pallidè

flavis notatæ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Rostrum rubrum. Pedes, unguisque obscurè cinerei. Habitat in *Brasília*.

jaune pâle. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles de l'aile. Le bec est rouge. Les pieds & les ongles sont d'un cendré obscur. On le trouve au *Bréfil*.

** 26. LE MARTIN-PESCHEUR DE TERNATE.

Voyez Pl. XL. Fig. 2.

Ispida superne fusca, marginibus pennarum saturatè cœruleis, infernè & in uropygio alba, roseo adumbrata; capite, collo superiore & rectricibus alarum superioribus splendidè cœruleis; rectricibus binis intermediis longissimis, in exortu & apice albis, roseo adumbratis, exteriùs versùs exortum maculâ cyaneâ notatis, in medio pinnulis brevissimis cyaneis præditis, lateralibus albis, roseo adumbratis, exteriùs fusco marginatis. . . . ISPIDA TERNATANA.

Avis Paradisiaca, Ternatana. *Seb. Vol. I. pag. 74. hujus icon non satis accurata Tab. XLVI. fig. 3.*

Pica Ternatana. *Klein. Avi. pag. 62. N^o. 8.*

Pyrrhonorax. *Moehr. Avi. Gen. 3.*

Cum *Sturno* crassitie circiter convenit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices & novem lineas. Rostrum, quod in exortu sex cum semi lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est; cauda septem pollices & tres li-

Il est à peu près de la grosseur d'un *Etourneau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces neuf lignes. Son bec, qui a à son origine six lignes & demie d'épaisseur, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche un pouce neuf lignes de long; sa queue sept pouces trois lignes; son pied sept lig-

nes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , onze lignes , l'extérieur dix lignes , l'intérieur six lignes ; & celui de derrière cinq lignes seulement. Il a quatorze pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent que jusqu'à un pouce au-delà de l'origine de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont d'un bleu éclatant : cette couleur est plus foncée aux côtés & plus claire sur le dessus de la tête. Les plumes qui couvrent la partie supérieure du dos , ainsi que les scapulaires , sont brunes , & bordées de bleu foncé. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les jambes , la partie inférieure du dos , le croupion , & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc nuancé d'une très-légère teinte de couleur de rose. Les couvertures du dessous des ailes & les côtés sont variés du même blanc & de brun ; mais sur les côtés le brun tire un peu sur le bleu foncé. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un bleu très-éclatant : les grandes sont d'un bleu plus foncé. Toutes les plumes de l'aile sont brunes en-dessous ; mais en-dessus les grandes sont de la même couleur

neas ; pes septem lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas , extimus decem lineas , intimus sex lineas ; & posticus quinque tantum lineas. Alis expansis , extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad unius tantum pollicis distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Caput & pars colli superior splendido imbuuntur cœruleo : qui color ad capitis latera fit saturatior , in capite superiore dilutior. Pennæ partem dorsi supremam vestientes , sicut & scapulares , sunt fuscæ , marginibus saturatè cœruleis præditæ. Guttur , pars colli inferior , pectus , venter , crura , dorsum infimum , uropygium , tectricesque caudæ superiores & inferiores albent , & levissimo roseo colore adumbrantur. Pennæ alas subtus & latera obtegentes eodem albo roseo adumbrato , & fusco variegantur ; ad latera tamen fuscus color paululum ad saturatè cœruleum inclinat. Superiores alarum tectrices minores sunt splendidissimè cœuleæ : majores saturatiore cœruleo tinctæ. Re-

miges omnes subtus fusca, superne verò majores in latere interiore & apice concolores, in latere exteriori saturate cœruleæ: minores exteriori simili cœruleo saturato imbutæ, interiori fusca. Decem rectricibus cauda conflatur: binæ intermediæ ab ipsarum exortu ad tertiam circiter longitudinis partem usque albæ, levissimo roseo colore adumbratæ, & in latere exteriori maculæ elegantissimè cyaneâ notatæ; dein versùs extremitatem usque eodem cyaneo tinctæ; ad apicem verò, sicut in exortu, albæ, levissimo roseo colore adumbratæ: in tota duarum istarum rectricum longitudinis parte quæ cyaneo tingitur, pinnulæ, sive exteriores, sive interiores, sunt valdè breves: laterales omnes rectrices sunt quoque albæ, levissimo colore roseo adumbratæ, exteriori, sed strictissimè, fusco marginatæ. Binæ rectrices intermediæ utrinque proximè sequentem quatuor pollicum longitudine excedunt: laterales omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque binis intermediis quinque pollicum & sex linearum longitudine cedentem. Rostrum eleganter au-

du côté intérieur & à leur bout, & d'un bleu foncé du côté extérieur: les moyennes sont aussi de cette dernière couleur du côté extérieur, & brunes du côté intérieur. La queue est composée de dix plumes: les deux du milieu sont depuis leur origine jusque vers le tiers de leur longueur d'un blanc nuancé d'une très-légère teinte de couleur de rose, & marquées sur leur côté extérieur d'une tache d'un très-beau bleu; ensuite elles sont de ce même bleu jusque vers leur bout, qui est de la même couleur que leur origine: dans toute la portion bleue de ces deux plumes les barbes, soit extérieures, soit intérieures, sont extrêmement courtes: toutes les plumes latérales sont aussi d'un blanc nuancé d'une très-légère teinte de couleur de rose, bordées extérieurement & très-étroitement de brun. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues de quatre pouces que celle qui les suit immédiatement de chaque côté: toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus courte de cinq pouces six lignes que les deux du milieu. Le bec est d'un bel orangé. Les pieds & les ongles.

font rougeâtres. On le trouve dans l'*Isle de Ternate*, l'une des *Molouques*. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

rantium. Pedes, unguesque rubescentes. Habitat in *Ternata*, ex *Moluccis Insulis* una. Ex museo D. Aubry.

LIX.

Le genre du Todier. (1).

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière; celui du milieu des trois antérieurs étroitement uni au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation, & au doigt intérieur jusqu'à la première :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

Le bec droit, assez long, applati horizontalement & obtus.

(1) *Todier*, nom formé du nom latin *Todus*, que *Browne* a donné à la première espèce de ce genre.

LIX.

Genus Todi. (1).

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; medius trium anteriorum cum extimo digito trium articularum spatio, cum intimo primi tantum articuli intervallo arcte cohaerens :

Crura ad calcaneum usque plumosa :

Rostrum rectum, longiusculum, horizontaliter planum, obtusum.

(1) *Todus*, nomen primæ hujus generis speciei à *Browne* inditum.

** I. LE TODIER.

Voyez Pl. XLI. Fig. 2.

Todus superne viridis, infernè albo-lutescens, roseo adumbratus; gutture rubro; lateribus roseis; rectricibus caudæ inferioribus sulphureis; rectricibus subtus cinereis, superne decem intermediis viridibus, interiùs cinereo marginatis, utrinque extimâ cinereâ *TODUS*.

Todus viridis, pectore rubro, rostro recto. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 476.*

Rubecula

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XIV.* 529

Rubecula viridis elegantissima. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 306. N°.

XXXVI. hujus icon pessima Tab. 263. fig. 1.

Raj. Syn. Avi. pag. 187. N°. 40.

Sylvia gulâ phœniceâ. Klein. Avi. pag. 79. N°. 16.

Moineau verd. Edwards. Tom. III. pag. CXXI ; avec une figure assez exacte Pl. 121. (figure supérieure).

Les Anglois l'appellent GREEN SPARROW ou GREEN HUMMING BIRD. Edwards. Sloane. Raj.

Les Habitans de la Jamaïque, TOM-TIT. Browne.

Crassitie Regulum non multum superat. Ipsi longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem quatuor pollices explet, & ad extremos ungues tres pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octo cum semi lineas longum est ; cauda sexdecim lineas ; pes sex cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor cum semi lineas, extimus quatuor lineas, intimus tres lineas ; & posticus binas tantum cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est sex pollicum & quatuor linearum ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ eleganter virides. Scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ tectri-

Tom. IV.

Il n'est guères plus gros qu'un *Roitelet*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes & demie de long ; sa queue seize lignes ; son pied six lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre lignes & demie, l'extérieur quatre lignes, l'intérieur trois lignes ; & celui de derrière seulement deux lignes & demie. Il a six pouces quatre lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un beau verd. La gorge est couverte de plumes rouges, chacune étant

XXX

terminée par une très-petite tache blanche , fort peu apparente. La partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les jambes & les couvertures du dessous des aîles sont d'un blanc-jaunâtre , mêlé d'une légère teinte de couleur de rose. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un jaune de soufre. Les côtés sont d'un joli couleur de rose. Les plumes de l'aîle sont cendrées en-dessous ; mais en-dessus la première est d'un cendré foncé : toutes les autres sont vertes du côté extérieur , tandis que leur côté intérieur est d'un cendré foncé , & bordé de cendré clair. La queue est composée de douze plumes d'égale longueur , toutes cendrées en - dessous ; mais en-dessus les dix du milieu sont vertes , & bordées intérieurement de cendré , cette bordure étant d'autant plus large , que la plume est plus extérieure : la plus extérieure de chaque côté est cendrée en - dessus comme en-dessous. Le demi-bec supérieur est d'un brun-rougeâtre , l'inférieur est rouge. Les pieds & les ongles sont gris. On le trouve dans toute l'*Amérique Septentrionale*. Il a été envoyé de la *Martinique* à *M. de Reaumur* par *M. Thibault de Chanvalon*.

ces concolores. Quæ guttur obtegunt , sunt rubræ , minutissimâ maculâ albâ , minimè conspicuâ , terminatæ. Collum inferius , pectus , venter , crura & penarum alas subtus vestientes ex albo lutescunt , & aliquid rosei admixtum habent. Inferiores caudæ rectrices sunt sulphureæ. Latéra eleganti roseo colore tincta. Remiges subtus cinereæ ; superne autem prior saturatè cinerea : reliquæ omnes in latere exteriori virides , in interiori saturatè cinereæ , cinereo dilutiori fimbriatæ. Caudam componunt duodecim rectrices æqualem longitudinem obtinentes , omnes subtus cinereæ ; superne verò decem intermediæ virides , marginibus interioribus cinereis præditæ , quæ margines eò latiores sunt , quò rectrix sit exterior : utrinque extrema superne eodem ac infernè cinereo imbuta. Mandibula superior fusco-rubescens , inferior rubra. Pedes , unguisque grisei. Habitat in universa *Septentrionali America*. A *Martinica* in museum *Reaumurianum* missus à *D. Thibault de Chanvalon*.



front blanc. 3. Martin-pêcheur du Cap de Bonne Espérance.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Manakin à gorge blanche. 2. Manakin à front blanc. 3. Martin-pêcheur du Cap de Bonne Espérance.



Fig. 3

r des Indes. 3. Martin-pêcheur hupé des Philippines.




Fig. 1. A.

Fig. 3


Fig. 2. A.



Dessiné et Gravé par Martinet.
1. Martin-pêcheur des Indes. 2. Martin-pêcheur à Collier des Indes. 3. Martin-pêcheur hupé des Philippines.



Fig. 1.



2. *Martin-pêcheur bleu de Madagascar.*

Fig. 1.



Fig. 2.



Designé et Gravé par Martinet.

1. Martin-pêcheur de Madagascar. 2. Martin-pêcheur bleu de Madagascar.



Fig. 1.

2. Martin-pêcheur blanc et noir.





Fig. 2.

Fig. 1.

Designé et Gravé par M. L. J. M. L.

1. Martin-pêcheur du Sénégal.

2. Martin-pêcheur blanc et noir.



Fig. 2.

2. Martin-pêcheur de Ternate.

Fig. 1.

Fig. 2.



Designé et Gravé par Martinet.

1. Grand Martin-pêcheur du Sénégal.

2. Martin-pêcheur de Ternate.



Fig. 2.



Fig. 1.

Fig. 2.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1 Martin-pêcheur hupé du Mexique.

2. Todier.

2. LE TODIER VARIÉ.

Todus cœruleo, nigro & viridi mixtus, viridi dilutiore punctulatus ; capite, gutture & collo ex cœruleo ad nigrum inclinantibus ; remigibus viridibus ; rectricibus nigris, in apice viridi marginatis TODUS VARIUS.

Ispida Indica. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 519. hujus icon pessima pag. 520.*

Ispida ex India allata. *Charlet. Exer. pag. III. N°. I.*

Charlet. Onomazt. pag. 105. N°. I.

Aliud Ispidæ genus quod ex India adfertur. *Jonst. Avi. pag. 108.*

Cum præcedente magnitudine & crassitie circiter convenit. Caput, guttur & collum ex cœruleo ad nigrum inclinant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crura, testricesque caudæ superiores & inferiores cœruleo, nigro & viridi, ad invicem inter se mixtis, variegantur, punctulis tamen quibusdam viridi dilutiore colore imbutis hinc inde reperfis. Superiores alarum testrices sunt virides. Remiges concolores. Caudam habet longiusculam, duodecim conflata rectricibus nigris, in apice viridi marginatis. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *India*, sed quo in loco prorsus ignoro.

Il est à peu près de la même grandeur & de la même grosseur que le précédent. La tête, la gorge & le col sont d'un bleu tirant sur le noir. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les côtés sont variés de bleu, de noir & de verd, mêlés confusément ensemble, & tachetés de quelques petits points d'un verd plus clair, semés çà & là. Les couvertures du dessus des ailes sont vertes. Les plumes de l'aile sont de la même couleur. La queue, qui est assez longue, est composée de douze plumes noires, & bordées de verd par le bout. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve dans les *Indes*, mais je ne sçais en quel endroit.

Xxxij

SECTION IV.

SECTIO IV.

Ceux dont le bec est courbé en arc & pointu.

Eæ quæ rostro arcuato & acuto præditæ sunt.

IL n'y a dans cette section qu'un seul genre, sçavoir celui du *Guêpier*.

IN illa sectione unicum continetur genus, scilicet *Apiastri*.

LX.

LX.

Le genre du Guêpier.

Genus Apiastri.

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière; celui du milieu des trois antérieurs étroitement uni au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation, & au doigt intérieur jusqu'à la première :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

Le bec courbé en arc, & pointu.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; medius trium anteriorum cum extremo digito trium articulorum spatio, cum intimo primi tantum articuli intervallo arcuè cohærens :

Crura ad calcaneum usque plumosa :

Rostrum arcuatum, acutum.

** I. LE GUESPIER.

Apiaster superne dilutè fulvus, castaneo & viridi adumbratus, infernè cœruleo-beryllinus; uropygio viridi-beryllino ad luteum vergente; syncipite primùm cœruleo-beryllino, dein viridi; vertice castaneo, viridi adumbrato; occipitio & collo superiore castaneis; taniâ utrinque per oculos nigra; gutture luteo-aureo; rectricibus superne cœruleo-beryllinis, rufo adumbratis, lateralibus interiùs cinereo marginatis, binis intermediis longioribus, acutis . . . APIASTER.

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XIV.* 533

- Merops pectore & alis cœrulescentibus, tergo leucophæo. (*Mas*).
Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXII. sp. 1.
- Merops pectore albicante, dorso virecente. (*Fœmina*). *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXII. sp. 2.*
- Merops. *Gesn. Avi. pag. 599, in qua hujus icon à Bellonio mutuata.*
Bell. Obs. pag. 16, in qua hujus icon minùs accurata.
Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 871. icones minùs accuratæ, maris pag. 872, & fœminæ pag. 873.
Jonst. Avi. pag. 81. maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. 42.
Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 46. sp. 1.
Moehr. Avi. Gen. 21.
- Merops simpliciter. *Klein. Avi. pag. 110. N^o. 10.*
- Merops, Apiaſter. *Gesn. icon. Avi. pag. 97. hujus icon à Bellonio mutuata pag. 98.*
Charlet. Exer. pag. 94. N^o. 9, in qua hujus icon non satis accurata.
Charlet. Onomazt. pag. 87. N^o. 9.
- Merops, ſive Apiaſter. *Willugh. Ornith. pag. 102. maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXIV.*
Raj. Syn. Avi. pag. 49. N^o. 3.
- Merops, ſeu Apiaſter Charletonis. *Rzac. Auſt. Hiſt. nat. Pol. pag. 434.*
- Merops Ariſtoreli ; Meliſſophago Junio ; Apiaſter Gazæ ; Apiaſtra Servizio ; Florus Geſnero. *Rzac. Hiſt. nat. Pol. pag. 287.*
- Merops flavescens. *Rzac. Auſt. Hiſt. nat. Pol. pag. 393.*
- Iſpida. *Faun. Suec. Linn. N^o. 86.*
- Guépier. *Alb. Tom. II. pag. 29 ; avec une figure mal coloriée Pl. 44.*
- Guelpier. *Bel. Portr. d'Oiſ. pag. 51 b, dans laquelle il y a une figure très-peu exacte.*
- Guelpier nommé Merops. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag. 224 ; avec la même figure pag. 225.*
- Les Grecs l'appellent Μίροψ. Bel. Gesn. Aldrov.*
- Les Grecs modernes, Μελισσοφαγος. Aldrov. Charlet.*
- Les Paysans de Candie, Μελισσοφαγος. Bel. Aldrov. Jonst.*
- Les Eſpagnols, AVEIVRUCO. Gesn. JURUCO. Aldrov.*
- Les Catalans, SIRENA DE MAR ; ABELLEROLA. Barr.*
- Les Italiens, DARDO. Bel. Gesn. JEVOLO ; GAULO. Bel. Gesn. Aldrov. & en quelques endroits, GRALLO. Bel.*
- Les Boulonnois, DARDANO. Aldrov.*
- Les Napolitains, LUPO DEL L'API. Bel. Gesn. Aldrov.*
- Les Siciliens, PICCIAFERRO. Gesn. Aldrov.*
- Les Allemands, IMBEN-WOLFF ; IMBEN-FRASZ. Gesn. BIENEN-WOLF ; GELBER BIENEN-WOLF. Rzac.*
- Les Polonois, ZOLNA ; ZOLNA ZOLTAWA. Rzac.*
- Les Anglois, BEE-EATER. Willugh. Raj. Charlet. Alb.*

Il n'est pas si gros que la *Petite Grive*; mais il a le corps plus allongé. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce neuf lignes de long; sa queue quatre pouces quatre lignes; son pied cinq lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes, l'extérieur sept lignes & demie, l'intérieur six lignes & demie; & celui de derrière quatre lignes seulement. Il a seize pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La base du demi-bec supérieur est entourée de petites plumes d'un blanc sale. Le synciput est d'abord d'un bleu d'Aigue-marine, ensuite verd. La partie supérieure de la tête est d'un marron mêlé d'une légère teinte de verd. L'occiput & la partie supérieure du col sont d'un beau marron: cette couleur s'éclaircit peu à peu en approchant du dos. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale noire, qui part de l'origine du bec, & s'étend jusque vers l'occiput, en pas-

Turdo minori crassitie cedit; sed corpore donatur magis elongato. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices aequat, & ad extremos ungues septem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est; cauda quatuor pollices & totidem lineas; pes quinque cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas, extremus septem cum semi lineas, intimus sex cum semi lineas; & posticus quatuor tantum lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum sexdecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Basim mandibulæ superioris ambiunt plumulæ sordidè albæ. Synciput primum est coeruleo-beryllinum, dein viride. Caput superius castaneum, viridi adumbratum. Occiput & collum superius eleganter castaneo colore imbuta: qui color sensim atque sensim, versus dorsum procedendo, fit dilutior. In utroque capi-

tis latere tania extat longitudinalis nigra, ab exortu rostri orta, per oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Dorsum & scapulares pennæ sunt dilutissimè fulvæ, castaneo & paucò viridi adumbratæ; qui colores plùs minùs conspicuæ fiunt, pro vario quo lucis radii in dorsum incidunt modo. Uropygium & superiores caudæ tectrices ex viridi-beryllino ad luteum vergunt. Guttur luteo-aureo colore tingitur. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, inferioresque caudæ tectrices colore imbuuntur cœruleo-beryllino; qui color sensim atque sensim, versùs imum ventrem procedendo, fit dilutior. Pennæ alas subtus obtegentes ex cinereo-albo ad fulvum inclinant. Superiores alarum tectrices minimæ sunt obscurè virides: mediæ rufæ: majores obscurè virides quidem, sed cum levissima rufi mixtura. Alarum componunt viginti quatuor remiges: decem primores sunt subtus cinereæ, superne autem cœruleo-beryllinæ, oris interioribus cinereis, nonnihil ad fulvum vergentibus: undecima viridis, rufo adum-

sant par les yeux. Le dos & les plumes scapulaires sont d'un fave très-clair, mêlé d'une légère teinte de marron & d'une très-légère teinte de verd; ces couleurs paroissent plus ou moins selon les différens jours auxquels le dos est exposé. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd d'Aigue-marine tirant sur le jaune. La gorge est d'un jaune-doré. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un bleu d'Aigue-marine, qui s'éclaircit peu à peu en approchant du bas-ventre. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un gris-blanc tirant sur le fauve. Les plus petites du dessus sont d'un verd obscur: les moyennes sont rouffes: & les plus grandes sont d'un verd obscur, mêlé d'une très-légère teinte de roux. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes: les dix premières sont cendrées en-dessous; mais en-dessus elles sont d'un bleu d'Aigue-marine, & bordées intérieurement d'un cendré tirant un peu sur le fauve: l'onzième est d'un verd nuancé d'une légère teinte de roux, elle a même la plus grande partie de son côté intérieur rouffe: les sept suivantes, sçavoir de-

puis la douzième jusqu'à la dix-huitième inclusivement, sont rousses, & ont vers leur bout un peu de bleu d'Aigue-marine : la dix-neuvième & la vingtième sont d'un verd nuancé d'une légère teinte de roux, & ont la plus grande partie de leur côté intérieur roussie vers leur origine & cendrée vers leur bout : enfin les quatre plus proches du corps sont d'un verd nuancé d'une légère teinte de roux, & bordées intérieurement de cendré. De plus la plûpart des plumes de l'aîle, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la vingtième inclusivement, sont terminées de noirâtre; & depuis la quatrième jusqu'à la vingt-unième aussi inclusivement, elles sont un peu échancrées en cœur par le bout. La première des plumes de l'aîle est extrêmement courte : la seconde est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes, toutes cendrées en-dessous; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un bleu d'Aigue-marine nuancé d'une légère teinte de roux : toutes les latérales sont de la même couleur, & bordées intérieurement de cendré. Les tiges de ces douze plumes sont brunes en-dessus & blanches en-dessous. Les deux plumes du milieu de

brata, attamen in latere interiore maximâ parte rufa : septem proximè sequentes ; à duodecima scilicet ad decimam-octavam usque inclusivè, rufæ, cum paucis versùs ipsarum extremitates cœruleo-beryllino admixto : decima-nona & vigesima virides, rufo adumbratæ, in latere tamen interiore maximâ parte versùs ipsarum exortum rufæ, versùs extremitates cinereæ : quatuor tandem corpori viciniore virides, rufo adumbratæ, interiùs cinereo marginatæ. Pleræque insuper remiges, à secunda scilicet ad vigesimam usque inclusivè, nigricante terminantur ; & à quarta ad vigesimam-primam usque similiter inclusivè, paululùm sunt in apice cordatim emarginatæ. Remix prima valdè brevis est : secunda reliquarum omnium longitudinem excedit. Cauda duodecim conflatur rectricibus, omnibus subtus cinereis ; superne verò binæ intermediæ sunt cœruleo - beryllinæ, rufo adumbratæ : laterales omnes concolores, interiùs cinereo marginatæ. Duodecim rectricum scapi sunt superne fusci, infernè albicantes. Binæ rectrices intermediæ laterales

terales novem linearum longitudine excedunt, & in acumen desinunt; è contra laterales sunt quasi quadratim abscissæ, & nonnihil in apice cordatim emarginatæ. Oculorum irides rubræ. Rostrum nigrum. Pedes fusco-rubescens; ungues verò nigricantes. *Insectis* victitat. Habitat in meridionali *Europæ* regione, & quidem in meridionalibus *Galliæ* provinciis. *Ex museo Realmuriano.*

la queue sont plus longues de neuf lignes que les latérales; & se terminent en pointe, tandis que les latérales au contraire sont comme coupées quarrément, & tant soit peu échan-crées en cœur par le bout. L'iris des yeux est rouge. Le bec est noir. Les pieds sont d'un brun-rougeâtre; & les ongles noirâtres. Il se nourrit d'*Insectes*. On le trouve dans la partie méridionale de l'*Europe*, & même dans les provinces méridionales de la *France*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

2. LE GUESPIER A TESTE JAUNE.

Apiaster superne castaneus, infernè flavescens; uropygio viridi & flavo mixto; capite & cōllo flavescens; taniâ utrinque per oculos nigrâ; remigibus nigris, apice rubris; rectricibus superne primâ medietate luteis, ultimâ viridibus....
APIASTER ICTEROCEPHALOS.

Merops cinereus, maculis castaneis, linguâ prælongâ. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXII. sp. 4.

Merops ravus, seu griseus; Melissophago Junii. Rac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 394.

Merops alter. Gesn. Avi. pag. 601. hujus icon satis accurata (exceptis pedibus) pag. 602.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 875. hujus icon minùs accurata pag. 876.

Klein. Avi. pag. 110 N°. 12.

Merops alter, seu Meropi congener Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 103.

Raj. Syn. Avi. pag. 49. N°. 4.

Merops alius. Jonst. Avi. pag. 81. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 42, sub titulo, Merops congener.

Merops alius, vel cognata Avis. Gesn. icon. Avi. pag. 98, in qua hujus icon satis accurata (exceptis pedibus).

Merops. Jonst. Avi. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. XXVII. Tom. IV.

Y y

Les Catalans l'appellent FORMIGUÉ. Barr.

Les Allemands aux environs de Strasbourg, SEE-SCHWALM. Gefn. Aldrov. Willugh.

Les Polonois, ZOLNA SZARA. Rzac.

Il est un peu plus grand & plus gros que le précédent. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont jaunâtres. De chaque côté de la tête est une assez large bande longitudinale noire, qui part de l'origine du bec, & s'étend jusque vers le col, en passant par les yeux. Le dos & les plumes scapulaires sont d'un beau marron. Le croupion est varié de verd & de jaune. Les couvertures du dessus de la queue sont variées des mêmes couleurs. Les plus petites du dessus des aîles sont bleues : les moyennes sont variées de bleu & de jaune : & les plus grandes sont entièrement jaunes. Les plumes de l'aîle sont noires, & terminées de rouge. La plupart de celles qui occupent le milieu, sont un peu échancrées en cœur par le bout. La queue est composée de douze plumes jaunes depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & vertes de là jusqu'à leur bout. Le bec & les ongles sont noirs ; & les pieds jaunes. On le trouve en différens endroits de l'*Europe*.

Magnitudine & crassitie præcedentem antecellit. Caput, guttur, collum, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ flavescentes. Inferiores caudæ rectrices concolores. In utroque capitis latere latiuscula extat tænia longitudinalis nigra, ab exortu rostri orta, per oculos ducta, & versùs collum usque protensa. Dorsum & scapulares pennæ elegantè castaneo tinguntur. Uropygium viridi & flavo mixtum. Pennæ caudam superne cooperientes iisdem coloribus variegantur. Superiores alarum rectrices minimæ sunt cœruleæ : mediæ cœruleo & flavo variegatæ : majores penitus flavæ. Remiges nigra, attamen apice rubra. Pleraque ex istis quæ medium locum obtinent, sunt paululùm in apice cordatim emarginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices ab ipsarum exortu ad mediam circiter longitudinem usque luteæ, à medietate ad apicem virides. Rostrum, unguesque nigri ; pedes verò flavi. Habitat in variis *Europæ* regionibus.

3. LE GUESPIER JAUNE.

Apiaster superne flavicans, infernè candicans; capite albo; maculis luteis, aureisque resperso; pectore rubescente; uropygio & remigibus ferrugineis; rectricibus in exortu candicantibus, in reliqua longitudine ferrugineis, binis intermediis longissimis . . . APIASTER FLAVICANS.

Manucodiata capite albo, maculis fulvis. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIX. sp. 2.

Manucodiata secunda species. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 811. hujus icon non satis accurata pag. 812.

Manucodiata secunda Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 56. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XI.

Raj. Syn. Avi. pag. 21. N°. 2.

Klein. Avi. pag. 63. N°. 2.

Manucodiata altera species. Jonst. Avi. pag. 118. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 55, sub titulo, Manucodiata 2 Aldrovandi.

Præcedentem multum crassitie & magnitudine superat. Caput habet album, maculis luteis, aureisque respersum. Pars colli superior, dorsum & scapulares pennæ flavicant. Uropygium & superiores caudæ rectrices ferruginei sunt coloris. Guttur, collum inferius, venter, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus obtegentes sunt candicantes. Pectus rubescit. Superiores alarum rectrices sunt ferrugineæ. Remiges concolores: ex istis autem intermediæ sunt in extremitate nonnihil cordatim emarginatæ. Caudam componunt duo-

Il est beaucoup plus grand & plus gros que le précédent. Sa tête est d'un blanc parsemé de taches jaunes & de taches de couleur d'or. La partie supérieure du col, le dos & les plumes scapulaires sont jaunâtres. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont de couleur ferrugineuse. La gorge, la partie inférieure du col, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont blanchâtres. La poitrine est rougeâtre. Les couvertures du dessus des ailes sont ferrugineuses. Les plumes de l'aile sont de la même couleur: celles

Y y ij

qui occupent le milieu, font un peu échancrées en cœur par le bout. La queue est composée de douze plumes blanchâtres à leur origine, & d'une couleur ferrugineuse dans le reste de leur longueur. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales d'environ huit pouces, & se terminent en pointe. L'iris des yeux est jaune. Le bec, qui a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche deux pouces de longueur, est d'un jaune-verdâtre. J'ignore entièrement en quel pays on le trouve.

decim rectrices in exortu candicantes, in reliqua longitudine ferrugineæ. Binæ intermedia laterales octo circiter pollicum longitudine excedunt, & in acumen desinunt. Oculorum irides luteæ. Rostrum, quod ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices longum, ex luteo viridescit. In qua regione habitat prorsus me latet.

4. LE GUESPIER DU BRÉSIL.

Apiaster superne fusco & nigro varius, inferne splendide ruber; capite rubro; rectricibus alarum inferioribus dilutè luteis; remigibus, rectricibusque dilutè cœruleis . . .
APIASTER BRASILIENSIS.

Merops Brasiliensis. Klein. Avi. pag. 110. N^o. 13.

Pica Brasiliensis. Seb. Vol. I. pag. 102. hujus icon non satis accurata
Tab. LXVI. fig. 1.

Ardea adfinis. Moehr. Avi. Gen. 105.

Il est à peu près de la grosseur du nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue trois pouces. La tête, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre,

Apiastrem nostratem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem circiter pollices explet. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda tres pollices. Caput, guttur, partem colli inferiorem, pectus;

vèntrem , latera & crura vestiunt pennæ rubræ , Rubini instar , splendentes. Inferiores caudæ rectrices concolores. Pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , quæque caudam superne cooperiunt , è fusco & nigro variegantur. Rectrices alarum superiores minores sunt saturatè rubræ : majores iisdem ac dorsum coloribus variæ. Pennæ alas subtus obtegentes dilutè luteæ. Remiges dilutè cœruleæ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Rostrum , pedes , unguisque flavi. Habitat in *Brasilia*.

les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un rouge aussi éclatant que le Rubis. La partie supérieure du col , le dos & le croupion sont variés de brun & de noir. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont variées des mêmes couleurs. Les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un rouge foncé : les grandes sont variées des mêmes couleurs que le dos. Celles du dessous des aîles sont d'un jaune clair. Les plumes de l'aîle sont d'un bleu clair. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec , les pieds & les ongles sont jaunes. On le trouve au *Bresil*.

5. LE GUESPIER DU MEXIQUE.

Apiaster superne griseus , rubro & flavo varius , infernè dilutè luteus , rubro adumbratus ; capite griseo ; rectricibus lateralibus griseis , binis intermediis longissimis , rubris
APIASTER MEXICANUS.

Merops cinereus. *Klein. Avi. pag. 110. N°. 11.*

Curruca. *Mozhr. Avi. Gen. 18.*

Avicula de Quauhcului dicta , caudâ longâ , magnitudine Passeris nostratis. *Seb. Vol. I. pag. 50. hujus icon satis accurata (exceptis pedibus) Tab. XXXI fig. 10.*

Les Mexiquains l'appellent QUAUHCILUI. *Seb.*

Alaudam crassitie non superat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam ex-

Il n'est pas plus gros qu'une Alouette. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la

queue est d'environ neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix-huit lignes de long; sa queue quatre pouces; son pied six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes, l'extérieur sept lignes & demie; l'intérieur six lignes & demie; & celui de derrière est encore plus court que ce dernier. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au quart de la longueur de la queue. La tête est d'un joli gris. Tout le reste du dessus du corps, sçavoir la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue, est d'un gris varié d'un joli rouge & de jaune. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un jaune clair, nuancé de rouge. Les plumes de l'aîle sont grises. Celles qui occupent le milieu, sont tant soit peu échancrées en cœur par le bout. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu, qui sont plus longues que les

tremam novem pollices & tres circiter lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & sex lineas longum est; cauda quatuor pollices; pes sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas, extimus septem cum semi lineas, intimus sex cum semi lineas; posticus autem adhuc intimo brevior. Alæ complicatæ quartam circiter longitudinis caudæ partem attingunt. Caput eleganter griseum est. Reliqua tota superna facies, pars scilicet colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ teatrices, grisea est, rubro amœnissimo & flavo variegata. Guttur, collum inferius, pectus, ventrem, latera, crura & teatrices caudæ inferiores tingit color dilutè luteus, rubro adumbratus. Alarum remiges sunt griseæ. Ex illis autem intermediae sunt in extremitate nonnihil cordatim emarginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediae, quæ quidem reli-

quas duorum pollicum & totidem linearum longitudine antecellunt, sunt prorsus rubræ: laterales verò griseæ. Rostrum splendore viridi refulget. De pedum colore nulla apud *Sebam* mentio facta est. Habitat in *Mexico*.

autres de deux pouces deux lignes, sont tout-à-fait rouges: les latérales sont grises. Le bec est d'un verd brillant. *Seba* n'a rien dit de la couleur des pieds. On le trouve au *Mexique*.

** 6. LE GUESPIER DE L'ISLE DE FRANCE.

Voyez Pl. XLIV. Fig. 2.

Apiaster superne castaneus, infernè & in uropygio dilutè cœruleo-beryllinus; gutture, collo inferiore & pectore intensius cœruleo-beryllinis; taniâ utrinque infra oculos fuscâ; rectricibus superne cœruleis, lateralibus interiùs griseo-fusco marginatis, binis intermediis longissimis . . .
APIASTER EX FRANCIE INSULA.

Alaudam cristatam non multùm crassitie superat; sed corpore donatur multò magis elongato. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & totidem lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est; cauda quinque pollices cum sex lineis; pes quinque cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue septem

Il n'est guères plus gros que l'*Alouette hupée*; mais il est beaucoup plus allongé. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces sept lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue cinq pouces six lignes; son pied cinq lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes & demie, l'extérieur sept lignes, l'intérieur six lignes; & celui de derriere est en-

core un peu plus court que ce dernier. Il a quatorze pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'à deux pouces au-delà de l'origine de la queue. Les parties supérieures de la tête , du col & du dos , & les plumes scapulaires sont d'un beau marron. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale brune , qui part des coins de la bouche , & s'étend jusque vers le col , en passant par-dessous les yeux. La gorge , la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un beau bleu d'Aigue-marine. La partie inférieure du dos , le croupion , le ventre , les côtés , les jambes , & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un bleu d'Aigue-marine beaucoup plus clair. Les couvertures du dessus des ailes sont vertes : celles du dessous sont fauves. L'aile est composée de vingt-quatre plumes , toutes d'un gris-brun en-dessous ; mais en-dessus les vingt premières sont vertes , & ont une grande partie de leur côté intérieur fauve : les quatre plus proches du corps sont entièrement vertes. De plus la plupart de ces plumes , savoir depuis la sixième jusqu'à la dix-neuvième inclusivement , sont terminées de noirâtre ; & depuis

cum semi lineas , extimus septem lineas , intimus sex lineas ; & posticus adhuc anticorum intimo paulo brevior. Alis expansis , extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad duorum circiter pollicum distantiam ultra caudæ exortum protrahuntur. Partes capitis & colli superiores , sicut & dorsi suprema , & scapulares pennæ sunt eleganter castaneæ. In utroque capitis latere tania extat longitudinalis fusca , ab oris angulis orta , infra oculos ducta , & versus collum usque protensa. Guttur , collum inferius & pectus sunt splendide cœruleo beryllina. Dorsum infimum , uropygium , ventrem , latera , crura , rectricesque caudæ superiores & inferiores tingit color cœruleo - beryllinus quidem , sed multò dilutior. Rectrices alarum superiores sunt virides : inferiores fulvæ. Viginti - quatuor remigibus ala conflatur , quæ omnes sunt subtus griseo - fusca ; superne verò viginti primores virides , attamen in latere interiore maximâ parte fulvæ : quatuor corpori finitimæ

timæ penitus virides. Pleræque insuper remiges, à sexta scilicet ad decimam-nonam usque inclusivè, nigricante terminantur; & à sexta ad vigesimam usque pariter inclusivè, sunt paululum apice cordatim emarginatæ. Remix prima brevissima est: tertia reliquas omnes longitudine antecellit. Caudam componunt duodecim rectrices, omnes subtus griseofusca; superne verò binæ intermediæ cœruleæ: laterales omnes concolores, interius griseo-fusco marginatæ. Duodecim rectricum scapi sunt superne fusci, infernè candicantes. Binæ rectrices intermediæ laterales duorum pollicum & totidem linearum longitudine excedunt, & in acumen desinunt; è contra laterales sunt quasi quadratim abscissæ, & paululum in apice cordatim emarginatæ. Rostrum nigrum. Pedes rubescentes; ungues verò nigricantes. Habitat in *Franciæ Insula*, unde missus in *musæum D. Aubry*.

la sixième jusqu'à la vingtième aussi inclusivement, elles sont un peu échancrées en cœur par le bout. La première des plumes de l'aile est extrêmement courte: la troisième est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes; toutes d'un gris-brun en-dessous; mais en-dessus les deux du milieu sont bleues: toutes les latérales sont de la même couleur, & bordées intérieurement de gris-brun. Les tiges de ces douze plumes sont brunes en-dessus & blanchâtres en-dessous. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales de deux pouces deux lignes, & se terminent un peu en pointe, tandis que les latérales au contraire sont comme coupées quarrément, & tant soit peu échancrées en cœur par le bout. Le bec est noir. Les pieds sont rougeâtres; & les ongles noirâtres. On le trouve à l'*Isle de France*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

** 7. LE GUESPIER DE MADAGASCAR.

Voyez *Pl. XLII. Fig. 1.*

Apiaster viridis, superne obscurius, infernè dilutius; vertice castaneo variante; tæniâ utrinque per oculos nigricante;
Tom. IV. Z z z

fasciâ in syncipite albâ , viridi mixtâ , utrinque supra oculos protensâ , alterâ concolore utrinque infra genas productâ ; gutture supremo albo-lutescente , infimo castaneo ; rectoribus superne obscurè viridibus , lateralibus interiùs cinereo marginatis , binis intermediis longissimis , acutis....
APIASTER MADAGASCARIENSIS.

Les Habitans de Madagascar l'appellent PATIRICH TIRICH.

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces quatre lignes , & jusqu'à celui des ongles de sept pouces une ligne. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce neuf lignes de long ; sa queue cinq pouces six lignes ; son pied cinq lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , sept lignes & demie , l'extérieur six lignes & demie , l'intérieur six lignes ; & celui de derrière quatre lignes seulement. Il a quinze pouces huit lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Sur le synciput est une étroite bande transversale d'un blanc mêlé d'une légère teinte de verd , qui s'étend de chaque côté jusque vers l'occiput , en passant par-dessus les yeux. Une bande longitudinale de la même couleur part de l'ori-

Crassitie præcedentem paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & quatuor lineas æquat , & ad extremos ungues septem pollices cum linea una. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est ; cauda quinque pollices & sex lineas ; pes quinque lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue septem cum semi lineas , extremus sex cum semi lineas , intimus sex lineas ; posticus autem quatuor tantum lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensionum distantia est quindecim pollicum & octo linearum ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. In syncipite stricta extat tania transversa alba cum aliqua viridis mixtura , utrinque supra oculos ducta , & ver-

sus occipitium usque protensa. Altera adest tania longitudinalis concolor, ab exortu mandibulae inferioris orta, infra genas ducta, & versus collum usque protensa. Quas binas tanias separant tania nigricans, ab oris angulis orta, per oculos ducta, & versus occipitium usque protensa. Guttur in parte suprema albolutescens, in infima eleganter castanea. Capitis superior pars viridi tingitur obscurissimo, & pro vario quo lucis radii incidunt modo, splendide castaneo variante. Partem colli superiorem, dorsum, uropygium, pennas scapulares, caudam superne cooperientes, alarumque tectrices superiores minores tingit color viridis quidem, sed non ita quam in capite obscurus, quique, versus uropygium procedendo, magis magisque dilutior fit. Superiores alarum tectrices majores sunt eodem viridi imbutae, interius cinereo-fusco marginatae. Partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennae virides quidem, sed quam in dorso multo dilutius; qui color viridis, versus imum ventrem pro-

gine du demi-bec inférieur, & s'étend jusque vers le col, en passant par-dessous les joues. Ces deux bandes sont séparées par une bande noirâtre, qui part des coins de la bouche, passe par les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. Le haut de la gorge est d'un blanc-jau-nâtre; & le bas est d'un beau marron. La partie supérieure de la tête est d'un verd très-obscur, & changeant, selon qu'il est exposé aux rayons de lumière, en un marron brillant. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue & les petites du dessus des ailes sont d'un verd moins obscur que celui de la tête, & qui s'éclaircit encore d'autant plus, qu'il approche davantage du croupion. Les grandes couvertures du dessus des ailes sont du même verd, & bordées intérieurement de cendré-brun. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd beaucoup plus clair que celui du dos, & qui s'éclaircit encore davantage en approchant du bas-ventre. Les couvertures du dessous des ailes sont fauves. L'aile est composée de vingt-quatre

plumes , toutes cendrées en-dessous , & du même verd que celui du dos en-dessus ; cependant les vingt-unes premières sont fauves dessus & dessous dans la plus grande partie de leur côté intérieur : & les trois plus proches du corps sont cendrées dans cet endroit-là. De plus la plupart de ces plumes , sçavoir depuis la seconde jusqu'à la dix-neuvième inclusivement , sont terminées de noirâtre ; & depuis la cinquième jusqu'à la vingtième aussi inclusivement , elles sont un peu échan-crées en cœur par le bout. La première des plumes de l'aile est extrêmement courte : la seconde est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes , toutes cendrées en - dessous ; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un verd obscur : toutes les latérales sont de la même couleur , & bordées intérieure-ment de cendré. Les tiges de ces douze plumes sont brunes en - dessus & blanchâtres en-dessous. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales de deux pouces une ligne , & se terminent en une pointe très-aiguë , tandis que les latérales au contraire sont comme coupées quarrément , & tant soit

cedendo , adhuc magis magisque sit dilutior. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt quoque dilutè virides. Inferiores alarum rectrices fulvæ. Alam componunt viginti quatuor remiges , omnes subtus cinereæ , superne verò eodem imbutæ viridi ac dorsum ipsum tingitur ; attamen uno-viginti primores in latere interiore sunt superne & infernè maximâ parte fulvæ : tres verò corpori viciniore eo in loco cinereæ. Pleraque insuper remiges , à secunda scilicet ad decimam - nonam usque inclusivè , nigricante terminantur ; & à quinta ad vigesimam usque similiter inclusivè , sunt nonnihil in apice cordatim emarginatæ. Remix prima valdè brevis est : secunda omnium longissima. Cauda duodecim conflatur rectricibus , omnibus subtus cinereis ; superne verò binæ intermediæ sunt obscurè virides : laterales omnes eodem colore tinctæ , interiùs cinereo-marginatæ. Duodecim rectricum scapi sunt superne fusci , infernè candicantes. Binæ rectrices intermediæ laterales duorum pollicum & linearum unius longitudine excedunt , & in acu-

tissimum mucronem desinunt; è contrà laterales sunt in apice quasi quadratim abscissæ, & nonnihil cordatim emarginatæ. Rostrum nigrum. Pedes fusci; ungues verò nigricantes. Habitat in *Madagascaria*, unde in *museum Realmurianum* allatus à *D. Poivre*.

peu échancrées en cœur par le bout. Le bec est noir. Les pieds sont bruns; & les ongles noirâtres. On le trouve à *Madagascar*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

** 8. LE GUESPIER A COLLIER DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XLII. Fig. 2.

Apiaster superne viridis, infernè viridi-beryllinus, superne & infernè ad aureum colorem vergens; gutture ad cœruleo-beryllinum inclinante; taniâ utrinque infra oculos, alterâ infra guttur transversâ nigrâ; rectricibus superne viridibus, lateralibus interiùs cinereo marginatis, binis intermediis longissimis, ultimâ medietate strictissimis & nigricantibus....
APIASTER MADAGASCARIENSIS TORQUATUS.

Merops, Mangeur d'Abeille des Indes. Edwards. Tom. IV. pag. CLXXXIII; avec une figure pas assez exacte Pl. 183.
Les Anglois l'appellent INDIAN BEE-EATER. Edwards.

Passerem crassitie non excedit; sed corpore donatur multò magis elongato. Ipsiùs longitudo ab apicerostris ad caudæ extremitatem octo pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues quinque pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices & decem

Il n'est pas plus gros qu'un *Moineau*; mais il est beaucoup plus allongé. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; sa queue quatre pouces dix lignes; son pied quatre lignes &

demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , six lignes , l'extérieur cinq lignes & demie , l'intérieur cinq lignes ; & celui de derriere trois lignes & demie. Il a dix pouces quatre lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont d'un verd tirant sur la couleur d'or. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur , mais elles tirent un peu sur le bleu d'Aigue-marine. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un verd d'Aigue-marine , tirant aussi sur la couleur d'or ; & de plus sous la gorge cette couleur tire sur le bleu d'Aigue-marine. De chaque côté de la tête est une bande noire , qui part de l'origine du bec , & passe par-dessous les yeux. Au-dessous de la gorge est une autre bande transversale de la même couleur , qui forme une espece de collier. Les couvertures du dessous des aîles sont fauves. L'aîle est composée de vingt-

lineas ; pes quatuor cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue sex lineas , extimus quinque cum semi lineas , intimus quinque lineas ; & posticus tres cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem pollicum & quatuor linearum ; alæ verò complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Partes capitis & colli superiores , dorsum , uropygium , pennæ scapulares & superiores alarum teñtrices ex viridi ad aureum colorem vergunt. Teñtrices caudæ superiores eodem imbuuntur colore ; sed nonnihil ad cœruleo - beryllinum inclinant. Guttur , partem colli inferiorem , pectus , ventrem , latera , crura , inferioresque caudæ teñtrices tingit color viridi-beryllinus , paululum similiter ad aureum colorem vergens , & insuper sub gutture ad cœruleo - beryllinum inclinans. In utroque capitis latere tænia extat nigra , ab exortu rostri orta , & infra oculos protensa. Sub gutturo altera adest tænia transversa concolor , torquem quodammodo efficiens. Pen-

nae alas subtus obtegentes fulvisunt coloris. Alarum componunt viginti duo remiges, quarum decem primores sunt superne virides, subtus cinereae, attamen in latere interiore maximâ parte fulvae: novem quae sequuntur, ab undecima scilicet ad decimam - nonam usque inclusivè, superne in latere exteriori virides, in interiore fulvae, infernè in utroque latere fulvo imbutae: tres tandem corpori finitimae superne virides, subtus cinereae. Pleraque insuper remiges, à secunda scilicet ad decimam - nonam usque inclusivè, sunt nigricante terminatae; & à quinta ad decimam - nonam usque similiter inclusivè, in apice quasi quadratim abscissae, & non nihil cordatim emarginatae. Remix prima brevissima: secunda & tertia reliquarum omnium longitudinem antecellunt. Duodecim restrictibus cauda constat: binae intermediae sunt superne eodem imbutae viridi ac dorsum ipsum tingitur, infernè cinereae, apice nigricante praeditae: laterales omnes similiter subtus cinereae, superne virides, interiùs cinereo marginatae. Duodecim

deux plumes: les dix premières sont vertes en-dessus, cendrées en-dessous, & ont une grande partie de leur côté intérieur fauve: les neuf suivantes, savoir depuis l'onzième jusqu'à la dix-neuvième inclusivement, sont en-dessus vertes du côté extérieur, fauves du côté intérieur; & en-dessous elles sont des deux côtés de cette dernière couleur: enfin les trois plus proches du corps sont vertes en-dessus, & cendrées en-dessous. De plus la plupart de ces plumes, savoir depuis la seconde jusqu'à la dix-neuvième inclusivement, sont terminées de noirâtre; & depuis la cinquième jusqu'à la dix-neuvième aussi inclusivement, elles sont comme coupées quarrément, & tant soit peu échancrées en cœur par le bout. La première des plumes de l'aile est extrêmement courte: la seconde & la troisième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont en-dessus du même verd que le dos, cendrées en-dessous, & terminées de noirâtre: toutes les latérales sont pareillement cendrées en-dessous, vertes en-dessus, & bordées intérieurement de cendré. Les tiges de ces douze plumes sont bru-

nes en-dessus & blanchâtres en-dessous. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues de deux pouces deux lignes que les latérales, presque toute la partie qui excède ces dernières, étant noirâtre & fort étroite; au lieu que les latérales sont comme coupées quarrément, & un peu échan-crées en cœur par le bout. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve à *Madagascar*. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry, & de celui de M. Mauduyt.

rectricum scapi sunt superne fusci, infernè candicantes. Binæ rectrices intermediae laterales duorum pollicum & totidem linearum longitudine superant; ipsarum autem pars ferè tota laterales excedens nigricans est & strictissima; è contrà verò laterales sunt in apice quasi quadratim abscissæ, & nonnihil cordatim emarginatæ. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque fusci. Habitat in *Madagascaria*. Ex museis D. Aubry, & D. Mauduyt.

9. LE GUESPIER A COLLIER DE BENGALE.

Apiaster superne viridis, infernè viridi-beryllinus, superne & infernè ad aureum colorem vergens; capite & collo superioribus obscurè viridi-flavicantibus; syncipite ad cœruleo-beryllinum inclinante; gutture cœruleo-beryllino; tænia utrinque per oculos, alterâ infra guttur transversâ nigrâ; rectricibus superne luteo-viridibus, lateralibus interiùs cinereo marginatis, binis intermediis longissimis, ultimâ medietate strictissimis & nigricantibus *APIASTER BENGALENSIS TORQUATUS*.

Guépier de Bengale. *Alb. Tom. III. pag. 12; avec une figure pas assez bien colorée Pl. 30.*

Il est à peu près de la grosseur du *Guépier de Madagascar*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ onze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des on-

Cum *Apiastro Madagascariensi* crassitie circiter convenit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & tres circiter lineas æquat, &

& ad extremos ungues sex pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & decem lineas longum est; cauda quinque pollices cum octo lineis; pes quinque lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue septem cum semi lineas, extimus sex cum semi lineas, intimus sex lineas: posticus autem adhuc anticorum intimo brevior. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & quinque circiter pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Synciput ex viridi paululum ad cœruleo - beryllinum inclinat. Partes capitis & colli superiores sunt obscurè virides, ad flavicantem colorem vergentes. Dorsum, uropygium, pennas scapulares, alas superne vestientes & superiores caudæ tectrices tingit color viridis ad aureum colorem vergens. Guttur cœruleo - beryllino imbitur. In utroque capitis latere tania extat nigra, ab exortu rostri orta, & per oculos ducta. Infra guttur altera adest tania transversa eodem nigro tincta, tor-

Tom. IV.

gles de six pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce dix lignes de long; sa queue cinq pouces huit lignes; son pied cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes & demie, l'extérieur six lignes & demie, l'intérieur six lignes; & celui de derriere est encore plus court que ce dernier. Il a environ un pied cinq pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le synciput est d'un verd tirant un peu sur le bleu d'Aigue-marine. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un verd obscur, tirant sur le jaunâtre. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un verd tirant sur la couleur d'or. La gorge est d'un bleu d'Aigue-marine. De chaque côté de la tête est une bande noire, qui part de l'origine du bec, & passe par les yeux. Au-dessous de la gorge est une autre bande transversale de la même couleur, qui forme une espece de collier. La partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont d'un verd d'Aigue-

A a a a

marine, tirant sur la couleur d'or. Le bas-ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un jaune pâle, mêlé d'un peu de verd. Les couvertures du dessous des aîles sont fauves. Les grandes plumes de l'aîle sont vertes en-dessus, cendrées en-dessous, & ont une grande partie de leur côté intérieur fauve : les moyennes sont en-dessus vertes du côté extérieur, fauves du côté intérieur ; & en-dessous elles sont des deux côtés de cette dernière couleur ; il faut cependant excepter les deux ou trois plus proches du corps, qui sont vertes en-dessus & cendrées en-dessous. De plus la plupart de ces plumes sont terminées de noirâtre, & plusieurs de celles-là sont un peu échancrées en cœur par le bout. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un verd-jaune en-dessus, cendrées en-dessous, & terminées de noirâtre : toutes les latérales sont pareillement cendrées en-dessous, d'un verd-jaune en-dessus, & bordées intérieurement de cendré. Les tiges de ces douze plumes sont brunes en-dessus & blanchâtres en-dessous. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues de deux pouces huit

quem quodammodo efficiens. Partem colli inferiorem, pectus, ventrem supremum & latera vestiunt pennæ viridi-beryllinæ ad aureum colorem vergentes. Venter imus, crura, inferioresque caudæ rectrices pallide lutei sunt coloris, cum pauco viridi admixto. Pennæ alas subtus obtegentes fulvæ. Remiges majores superne virides, subtus cinereæ, attamen in latere inferiore maximâ parte fulvæ : minores superne exterius virides, interiùs fulvæ, infernè in utroque latere fulvo imbutæ ; ex istis autem excipienda sunt duæ tresve corpori viciniore, superne virides, subtus cinereæ. Plexaque insuper remiges nigricante terminantur, ex istisque plures sunt in apice paululum cordatim emarginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediae superne viridiluteæ, infernè cinereæ, nigricante terminatæ : laterales omnes similiter subtus cinereæ, superne viridiluteæ, interiùs cinereo marginatæ. Duodecim rectricum scapi sunt superne fusci, infernè candicantes. Binæ rectrices intermediae laterales duorum

pollicum & octo linearum longitudine superant ; ipsarum autem pars ferè tota laterales excedens nigricans est & strictissima ; è contra verò laterales sunt in apice quasi quadratim abscissæ , & nonnihil cordatim emarginatæ. Oculorum irides rubræ. Rostrum nigrum. Pedes , unguisque fuscii. Habitat in *Bengalensi* Regno.

lignes que les latérales , pres- que toute la partie qui excède ces dernières , étant noirâtre & fort étroite ; au lieu que les latérales sont comme coupées quarrément , & un peu échan- crées en cœur par le bout. L'iris des yeux est rouge. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*.

** 10. LE PETIT GUESPIER DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XLIII. Fig. 2.

Apiaster superne viridis , infernè viridi-beryllinus , superne & infernè ad aureum colorem vergens ; syncipite ad cœruleo-beryllinum inclinante ; gutture cœruleo-beryllino , taniâ utrinque infra oculos obscurè viridi ; rectricibus binis inter- mediis strictissimis , nigricantibus , lateralibus superne viridibus , interiùs cinereo marginatis APIASTER PHILIPPENSIS MINOR.

Apiastrem Madagascariensem torquatum crassitie cir- citer æmulatur. Ipsiùs longi- tudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem sex pollices & totidem lineas explet , & ad extremos ungues quinque pollices cum linea una. Ro- strum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est ; cauda duos pol- lices & sex lineas , pes qua- tuor cum semi lineas ; trium

Il est à peu près de la gros- seur du *Guépier à collier de Madagascar*. Sa longueur de- puis le bout du bec jusqu'à ce- lui de la queue est de six pou- ces six lignes , & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces une ligne. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long ; sa queue deux pouces six lignes ; son pied quatre lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts

antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes & demie, l'extérieur cinq lignes & demie, l'intérieur quatre lignes & demie; & celui de derrière trois lignes seulement. Il a dix pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Le synciput est d'un verd tirant sur le bleu d'Aigue-marine. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un verd tirant un peu sur la couleur d'or. De chaque côté de la tête est une bande d'un verd très-obscur, qui part des coins de la bouche, & s'étend par-dessous les yeux. La gorge est d'un bleu d'Aigue-marine. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un verd d'Aigue-marine, tirant un peu sur la couleur d'or. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un bleu d'Aigue-marine très-clair. Celles du dessous des ailes sont fauves. L'aile est composée de vingt-quatre plumes: les onze premières sont vertes en-dessus, cendrées en-dessous, & ont une grande partie de leur côté

digitorum anticorum medius cum ungue sex cum semi lineas, extimus quinque cum semi lineas; intimus quatuor cum semi lineas; posticus autem tres tantum lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Synciput ex viridi ad cœruleo-beryllinum vergit. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superioresque caudæ tectrices sunt virides, paululum ad aureum colorem inclinantes. In utroque capitis latere tania extat obscurissimo viridi tinctæ, ab oris angulis orta, & infra oculos protensa. Guttur est cœruleo-beryllinum. Partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ viridi-beryllinæ, ad aureum colorem nonnihil vergentes. Inferiores caudæ tectrices sunt dilutissime cœruleo-beryllinæ. Pennæ alas subtus obtegentes fulvæ. Viginti quatuor remigibus ala conflatur: undecim primores sunt superne virides, infernè cinereæ, attamen in

latere interiore maximâ parte fulvæ : novem quæ sequuntur , à duodecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè , superne exterius virides , interius fulvæ , subtus in utroque latere fulvo imbutæ colore : quatuor tandem corpori finitimæ superne virides , infernè cineræ . Pleræque insuper remiges , à sexta scilicet ad vigesimam usque inclusivè , sunt nigricante terminatæ ; & à sexta ad decimam-nonam usque pariter inclusivè , paululum in apice cordatim emarginatæ . Remix prima valdè brevis est : secunda & tertia sunt omnium longissimæ . Caudam componunt duodecim rectrices , quarum binæ intermediæ nigricantes , strictissimæ , in apice quasi quadratim abscissæ & paululum cordatim emarginatæ : laterales omnes subtus cineræ , superne virides , interius cinereo marginatæ ; duarum intermediarum instar , in extremitate quoque quadratim abscissæ videntur , suntque nonnihil cordatim emarginatæ : ipsarum scapi sunt superne fusci , infernè candidantes . Binæ rectrices intermediæ lateralibus paululum longitudine cedunt ; verifi-

intérieur fauve : les neuf suivantes , sçavoir depuis la douzième jusqu'à la vingtième inclusivement , sont en-dessus vertes du côté extérieur , fauves du côté intérieur ; & en-dessous elles sont des deux côtés de cette dernière couleur : enfin les quatre plus proches du corps sont vertes en-dessus & cendrées en-dessous . De plus la plupart de ces plumes , sçavoir depuis la sixième jusqu'à la vingtième inclusivement , sont terminées de noirâtre ; & depuis la sixième jusqu'à la dix-neuvième aussi inclusivement , elles sont un peu échancrées en cœur par le bout . La première des plumes de l'aile est extrêmement courte : la seconde & la troisième sont les plus longues de toutes . La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noirâtres & fort étroites , comme coupées quarrément & un peu échancrées en cœur par le bout : toutes les latérales sont cendrées en-dessous , vertes en-dessus , & bordées intérieurement de cendré ; elles paroissent aussi , comme les deux du milieu , coupées quarrément , & sont un peu échancrées en cœur par le bout : leurs tiges sont brunes en-dessus & blanchâtres en-dessous . Les deux plumes du

milieu de la queue sont un peu plus courtes que les latérales; mais il y a apparence que dans les deux individus de cette espèce que j'ai vus, ces plumes n'étoient pas poussées autant qu'elles devoient l'être dans la suite, & qu'elles seroient devenues longues au point de passer de beaucoup les latérales. Le bec est noir. Les pieds sont d'un rouge obscur; & les ongles noirs. On le trouve aux Philippines. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry, & de celui de M. Mauduyt.

mile tamen mihi videtur in binis hujus speciei individuis à me observatis rectrices istas ab alveolo suo non fuisse penitus avulsas, & deinde longitudinem obtinuisse laterales multum excedentem. Rostrum nigrum. Pedes obscurè rubri, ungues verò nigricantes. Habitat in *Philippensibus Insulis*. Ex museis D. Aubry & D. Mauduyt.

II. LE GUESPIER D'ANGOLA.

Voyez Pl. XLIV. Fig. 1. A.

Apiaster superne viridis, infernè viridi-beryllinus, superne & infernè ad aureum colorem vergens; gutture luteo; collo inferiore castaneo; taniâ utrinque per oculos cinereâ, nigro punctulatâ; rectricibus superne viridibus, lateralibus interius cinereo marginatis *APIASTER ANGOLENSIS*.

Je n'ai jamais vu cette espèce de *Guespier*: je l'ai décrite & fait graver d'après un dessin fait sur l'Oiseau même par M. Poivre.

Il n'est pas si gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui

Hanc *Apiastri* speciem nunquam mihi videre contigit: ipsius descriptionem desumpti ex icone ad Avem ipsam depicta à D. Poivre; & sic eam æri insculptam esse curavi.

Præcedenti crassitie cedit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudam extremam quinque pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos

ungues quatuor pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda duos pollices cum linea unica; pes quatuor cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue sex cum semi lineas, extimus quinque cum semi lineas, intimus quatuor lineas; & posticus adhuc anticorum intimo brevior. Alæ complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem extenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudæ rectrices sunt virides, ad aureum colorem nonnihil vergentes. In utroque capitis latere rænia extat longitudinalis cinerea, nigro punctulata, ab exortu rostri orta, & per oculos ducta. Guttur luteum est. Collum inferius eleganter castaneum. Pectus, venter, latera & crura sunt viridi-beryllini coloris, ad aureum colorem nonnihil inclinantis. Inferiores caudæ rectrices sunt viridescentes, cum aliqua castanei mixtura. Alarum remiges superne virides, attamen in latere interiore maximâ parte

des ongles de quatre pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue deux pouces une ligne; son pied quatre lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes & demie, l'extérieur cinq lignes & demie, l'intérieur quatre lignes; & celui de derrière est encore plus court que ce dernier. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, & celles du dessus de la queue sont d'un verd tirant un peu sur la couleur d'or. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale cendrée & pointillée de noir, qui part de l'origine du bec, & passe par les yeux. La gorge est jaune. La partie inférieure du col est d'un beau marron. La poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un verd d'Aigue-marine tirant un peu sur la couleur d'or. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un verdâtre mêlé d'un peu de marron. Les plumes de l'aîle sont vertes en-dessus, ayant une grande partie de leur côté in-

térieur cendrée, & en-dessous elles sont de cette dernière couleur. La queue est composée de douze plumes, toutes cendrées en-dessous; mais en-dessus les deux du milieu sont vertes: toutes les latérales sont de la même couleur, & bordées intérieurement de cendré. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est rouge. Le bec est noir. Les pieds sont cendrés; & les ongles noirâtres. On le trouve dans le Royaume d'Angola en Afrique.

cinereæ, subtus verò in utroque latere cinereo imbutæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus, omnibus subtus cinereis; superne verò binis intermediis viridibus: lateralibus omnibus concoloribus, interiùs cinereo marginatis. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Oculorum irides rubræ. Rostrum nigrum. Pedes cinerei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Angolensi Regno in Africa.*

** 12. LE GRAND GUESPIER DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XLIII. Fig. 1.

Apiaster superne obscure viridis, cupri puri colore varians, infernè viridi-lutescens, fulvo varians; uropygio cœruleo-beryllino; taniâ utrinque per oculos nigrâ; gutture lutescente, ad viride & fulvum vergente; rectricibus superne cœruleo-beryllinis, lateralibus interiùs cinereo marginatis.

. . . . APIASTER PHILIPPENSIS MAJOR.

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces six

Apiastro nostrati nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem octo pollices & decem lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices

pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos, qui quidem ultra oculos multum protenduntur, duos pollices & unam cum semi lineam longum est; cauda tres pollices & octo lineas; pes quinque cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue octo cum semi lineas, extimus septem cum semi lineas, intimus sex cum semi lineas; posticus autem quatuor cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & decem linearum; alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, collum superius, dorsum, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices sunt obscurè virides, & pro vario quo lucis radii incidunt modo, cupri puri colore variantes. Uropygium & superiores caudæ tectrices cœruleo-beryllinæ. In utroque capitis latere tænia extat longitudinalis nigra, ab exortu mandibulæ superioris orta, per oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Guttur flavicans, modò ad viride, modò ad fulvum ver-

Tom. IV.

lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent bien au-delà des yeux, a deux pouces une ligne & demie de long; sa queue trois pouces huit lignes; son pied cinq lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes & demie, l'extérieur sept lignes & demie; l'intérieur six lignes & demie, & celui de derrière quatre lignes & demie. Il a quatorze pouces dix lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête; la partie supérieure du col, le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont d'un verd sombre; qui, vu dans un certain jour, change en couleur de cuivre de rosette. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un bleu d'Aigue-marine. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale noire, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, & s'étend jusque vers l'occiput, en passant par les yeux. La gorge est d'un jaunâtre tirant tantôt sur le verd, tantôt sur le fauve: la nuance de cette dernière couleur est assez forte vers le bas de la gorge. La partie inférieure

B b b b

du col , la poitrine , le ventre , les côtés & les jambes sont d'un verd-jaunâtre & changeant en fauve , selon les différens jours auxquels on l'expose. Les ouvertures du dessous de la queue sont d'un bleu d'Aigue-marine clair. Celles du dessous des aîles sont d'un fauve clair & jaunâtre. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes , toutes cendrées en-dessous ; mais en-dessus elles sont du même verd que celui du dos , & ont la plus grande partie de leur côté intérieur fauve dessus & dessous ; il faut cependant en excepter les deux ou trois plus proches du corps, dont une grande partie du côté intérieur est cendrée : la dix-neuvième & la vingtième sont marquées d'un peu de bleu sur leur côté extérieur : la vingt-deuxième & la vingt-quatrième sont marquées de même sur leur côté intérieur. De plus la plupart de ces plumes , sçavoir depuis la seconde jusqu'à la dix-neuvième inclusivement, sont terminées de noirâtre : & depuis la cinquième jusqu'à la dix-neuvième aussi inclusivement , elles sont un peu échancrées en cœur par le bout. La première des plumes de l'aîle est extrêmement courte , la seconde est la plus longue de toutes. La queue est

gens : guttur autem infimum intensiorem habet fulvi tincturam. Pars colli inferior, pectus, venter, latera & crura ex viridi flavicant, & secundum varios ad lucem objectus, fulvo colore variant. Inferiores caudæ tectrices sunt dilutè cœruleo-beryllinæ. Pennæ alas subtus obtegentes ex dilutè fulvo flavicantes. Alam componunt viginti quatuor remiges, omnes subtus cinereæ, superne verò eodem imbutæ viridi ac dorsum ipsum tingeritur, attamen in latere interiore superne & infernè maximâ parte fulvæ ; ex istis autem excipiendæ sunt binæ tresve corpori viciniore interius maximâ parte cinereæ : decima-nona & vigesima in latere exteriori paucò notantur cœruleo : vigesima-seconda & vigesima-quarta interius eodem colore insigniuntur. Plæque insuper remiges à secunda scilicet ad decimam - nonam usque inclusivè, sunt nigricante terminatæ ; & à quinta ad decimam - nonam usque similiter inclusivè, in extremitate nonnihil cordatim emarginatæ. Remix prima brevissima : secunda omnium longissima. Caudam componunt

duodecim rectrices æqualem circiter longitudinem obtinentes, omnes subtus cinereæ; superne verò binæ intermediae cœruleo-beryllinæ: laterales omnes concolores, interiùs cinereo marginatæ. Duodecim rectricum scapi superne nigricant, infernè albicant. Rostrum nigrum. Pedes, unguisque fuscii. Habitat in *Philippensibus Insulis. Ex museo D. de Bandeville.*

composée de douze plumes à peu près d'égale longueur, toutes cendrées en-dessous; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un bleu d'Aigue-marine: toutes les latérales sont de la même couleur, & bordées intérieurement de cendré. Les tiges de ces douze plumes sont noires en-dessus & blanches en-dessous. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve aux *Isles Philippines. Du cabinet de Madame de Bandeville.*

13. LE GUESPIER A TESTE ROUGE DES INDES.

Voyez Pl. XLIV. Fig. 3. A.

Apiaster superne viridis, infernè lutescens, rubro adumbratus; capite & collo superiore coccineis; gutture luteo; taniâ utrinque per oculos nigrâ; rectricibus superne viridibus, lateralibus interiùs cinereo marginatis. . . .
APIASTER INDICUS ERYTHROCEPHALOS.

Hanc *Apiastri* speciem nondum mihi videre contigit: ipsius descriptionem desumpsi ex icone ad Avem ipsam depicta à *D. Poivre*, & sic eam æri insculptam esse curavi.

Apiastrem Angolensem crafitie paululùm superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex circiter pollices explet, & ad extremos ungues quinque pol-

Je n'ai jamais vu cette es-
pece de *Guépier*: je l'ai décrite
& fait graver d'après un dessin
fait sur l'Oiseau même par *M. Poivre*.

Il est un peu plus gros que
le *Guépier d'Angola*. Sa lon-
gueur depuis le bout du bec
jusqu'à celui de la queue est
d'environ six pouces, & jusqu'à
celui des ongles de cinq pouces

fix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue un pouce neuf lignes; son pied cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes, l'extérieur sept lignes, l'intérieur cinq lignes & demie; & celui de derrière quatre lignes seulement. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont d'un rouge très-vif. De chaque côté de la tête est une bande noire, qui part de l'origine du bec, & passe par les yeux. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un beau verd. La gorge est jaune. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un jaunâtre nuancé d'un peu de rouge. Les couvertures du dessous de la queue sont jaunâtres, & bordées de verd clair. Celles du dessus des ailes sont d'un verd foncé. Les plumes de l'aile sont pareillement en - dessus d'un verd foncé, & bordées intérieurement de cendré; & en - dessous elles sont entièrement de cette dernière couleur. La queue est composée de

lices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ab oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda unum pollicem cum novem lineis; pes quinque lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas, extimus septem lineas, intimus quinque cum semi lineas; posticus autem quatuor tantum lineas. Alæ complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput & pars colli superior splendido imbuuntur coccineo. In utroque capitis latere tænia extat nigra, ab exortu rostri orta, & per oculos ducta. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt eleganter virides. Guttur luteum est. Pars colli inferior, pectus, venter, latera & crura lutescunt, & paucorubro adumbrantur. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt quoque lutescentes, sed dilutè viridi marginatæ. Superiores alarum tectrices saturatè virides. Remiges superne eodem viridi saturato imbutæ, interiùs cinereo marginatæ, subtus autem penitus cinereæ. Caudam componunt duodecim rec-



. Guêpier à Collier de Madagascar.





Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Guêpier de Madagascar.

2. Guêpier à Collier de Madagascar.



Fig. 1.



2. Petit Guêpier des Philippines.





Dessiné et Gravé par Maitnet.

1. Grand Guépier des Philippines.

2. Petit Guépier des Philippines.



de France. 5. Guépier à tête rouge des Indes.





Dessein et Gravé par Martinet.

1. Guêpier d'Angola. 2. Guêpier de l'Isle de France. 3. Guêpier à tête rouge des Indes.

trices æquali longitudine
pollentes, omnes subtus ci-
nereæ; superne verò binæ in-
termediæ virides: laterales
omnes concolores, interiùs
cinereo marginatæ. Oculo-
rum irides rubræ. Rostrum
nigrum. Pedes cinerei; un-
gues verò nigricantes. Ha-
bitat in *India Orientali*.

douze plumes, d'égale lon-
gueur, toutes cendrées en-des-
sous; mais en-dessus les deux du
milieu sont vertes: toutes les
latérales sont de la même cou-
leur, & bordées intérieurement
de cendré. L'iris des yeux est
rouge. Le bec est noir. Les pieds
sont cendrés; & les ongles noi-
râtres. On le trouve dans les
Indes Orientales.

SECTIO V.

SECTION V.

*Eæ quæ rostro donantur cras-
so & falciformi.*

*Ceux qui ont le bec gros & en
forme de faux.*

HÆc sectio unico conf-
tat genere, scilicet *Hy-
drocoracis*.

LE genre du *Calao* est le seul
qui compose cette section.

LXI.

LXI.

Genus Hydrocoracis. (1).

Le genre du Calao. (1).

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis
destituti; tres scilicet an-
tici, posticus unus; me-
dius trium anteriorum
cum extimo digito trium
articulorum spatio, cum
intimo primi tantum ar-
ticuli intervallo arctè co-
hærens:

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de mem-
branes; trois devant, un der-
rière; celui du milieu des
trois antérieurs étroitement
uni au doigt extérieur jus-
qu'à la troisième articula-
tion, & au doigt intérieur
jusqu'à la première:

(1) *Hydrocorax*, nomen à me huic
generi inditum ob habitationem circa
aquatica loca.

(1) *Calao*, nom que portent dans les
Indes les Oiseaux de ce genre.

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon : Crura ad calcaneum usque plumosa :
 Le bec gros , en forme de faux , & dentelé comme une scie. Rostrum crassum , falciforme , serræ instar denticulatum.

** 1. LE CALAO.

Voyez Pl. XLV.

Hydrocorax superne fuscus , infernè nigricans , griseo mixtus ; imo ventre dilutè fulvo ; capite superiùs nigricante ; genis & gutture nigris ; fasciâ arcuatâ sub gutture sordidè cinereo-albâ ; occipitio & collo dilutè castaneis ; remigibus nigris , minoribus exteriùs griseo marginatis , rectricibus sordidè cinereo-albis ; rostro gibbofo HYDROCORAX.

Corvus Indicus. Bont. Ind. Ori. pag. 62 , in qua hujus icon non satis accurata.

Corvus Indicus Bontii. Willugh. Ornith. pag. 86. hujus icon à Bontio mutuata Tab. XVII.

Raj. Syn. Avi. pag. 40. N°. 7.

An Corvus torquatus , pedibus cinereis , rostro arcuato ? Klein. Avi. pag. 58. N°. 2.

An Corbeau , ou Corvus torquatus , rostro arcuato , pedibus cinereis ? Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 14. (ed. 1725).

Caryocatactes. Moehr. Avi. Gen. 7.

Alcatraz Oviedi ; sive veriùs Corvi marini genus. Clus. Exot. Lib. V. Cap. XII. pag. 106 , in qua capitis icon non satis accurata.

Il est un peu plus gros qu'un Coq. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds quatre pouces , & jusqu'à celui des ongles de deux pieds un pouce. Son bec , qui a à son origine deux pouces six lignes d'épaisseur , a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche cinq

Gallum crassitie paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & quatuor pollices aëquat , & ad extremos ungues duos pedes & unum pollicem. Rostrum quod in exortu duos pollices & sex lineas crassum , ab ipsius apice ad oris

angulos quinque pollices longum est ; cauda octo pollices ; pes duos pollices cum totidem lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & quinque lineas , extimus duos pollices cum linea unica , intimus unum pollicem & decem lineas ; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Alis expansis , extremitates majorum remigum duorum pedum decem pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput superius nigricat. Genæ & guttur nigri sunt coloris. Guttur autem circumdat tænia sordidè cinereo - alba , novem circiter linearum latitudine pollens , arcum quodammodo referens , cujus arcus concavitas caput spectat. Caput posterius & collum sunt dilutè castanea. Dorsum , uropygium , scapulares pennæ , alarumque rectrices superiores fuscæ. Pennæ caudam superne cooperientes & inferiores alarum rectrices eodem imbutæ colore , sed aliquid fulvi admixtum habentes. Pectus , venter supremus & latera

pouces de long ; sa queue huit pouces ; son pied deux pouces deux lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , deux pouces cinq lignes , l'extérieur deux pouces une ligne , l'intérieur un pouce dix lignes ; & celui de derriere est le plus court de tous. Il a deux pieds dix pouces six lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est noirâtre. Les joues & la gorge sont noires. La gorge est entourée d'une bande d'un gris-blanc sale , d'environ neuf lignes de largeur , qui forme une espece d'arc , dont la concavité est tournée vers la tête. La partie postérieure de la tête & le col sont d'un marron clair. Le dos & le croupion sont bruns. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur. Les couvertures du dessus de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un brun mêlé d'une légère teinte de fauve. La poitrine , le haut du ventre & les côtés sont d'un noirâtre mêlé d'un peu de gris. Les jambes sont d'un brun-fauve. Le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un

fauve clair. Les grandes plumes de l'aile sont noires : les moyennes sont de la même couleur , & bordées extérieurement de gris. La queue est composée de douze plumes d'un gris-blanc sale , toutes à peu près d'égale longueur. Le bec est d'un cendré-noirâtre. Sur le dessus du demi-bec supérieur est une espece d'excroissance cornée , plate dans sa partie supérieure , & arrondie en-arrière : cette partie arrondie s'étend par-dessus la tête , & est blanchâtre ; le reste est de la même couleur que le bec. La dentelure du demi-bec inférieur est plus apparente que celle du demi-bec supérieur. Les pieds sont d'un gris-brun ; & les ongles noirs. On le trouve aux *Molouques* , d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry* , qui le conserve dans son cabinet.

nigricant cum paucis griseo admixto. Crura sunt fusco-fulva. Imum ventrem & inferiores caudæ rectrices tingit color dilutè fulvus. Alarum remiges majores sunt nigrae : minores concolores , exterius griseo marginatae. Cauda duodecim conflatur rectricibus sordidè cinereo-albis , omnibus æqualem circiter longitudinem obtinentibus. Rostrum ex cinereo nigricat. In mandibulae superioris parte suprema quoddam extat incrementum corneum , in parte superiore planum , in posteriore rotundatum : quæ rotundata pars supra caput protenditur , & candicat ; reliquum autem incrementum , rostri instar , ex cinereo nigricat. Denticulae in mandibula inferiore magis sunt quàm in superiore conspicuae. Pedes griseo-fusci ; ungues verò nigri. Habitat in *Moluccis Insulis* , unde in museum *D. Aubry* missus est.

* 2. LE CALAO DES PHILIPPINES.

Hydrocorax superne niger , internè albus ; remigibus nigris , albâ maculâ notatis ; rectricibus decem intermediis nigris , utrinque extimâ albâ ; rostro bicorni HYDROCORAX PHILIPPENSIS.

Rhinoceros

Rhinoceros Avis; prima varietas. *Willugh. Ornith. capitis & rostri icon accurata Tab. XVII.*

Calao Avis. *Petiv. Gaz. Nat. rostri icon satis accurata Tab. XXXI. fig. 1.*

Avis Philippensis galeâ planâ. *Petiv. Gaz. Nat. hujus icon minùs accurata Tab. XXVIII. fig. 6.*

Hujus Avis caput, rostrumque solummodo observavi. Corporis crassitie *Gallo-Pavonem* fœminam circiter æmulatur; sed capite, pro mole corporis, multò crassiori donatur. Rostrum, quod versùs exortum duos pollices & octo lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque novem pollices longum est. Caput, guttur, collum, dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigræ. Scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudæ tectrices colores. Pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores albicant. Alarum remiges sunt nigræ, albâ maculâ notatæ. Duodecim reëtricibus cauda conflatur: decem intermediæ nigræ: utrinque extrema alba. Rostrum rubescens, attamen in mandibulæ inferioris exortu nigrum. In suprema parte mandibulæ superioris extat incrementum corneum, valde crassum, eodem imbutum colore ac rostrum ipsum tingitur, in parte superiore non-

Tom. IV.

Je n'ai jamais vu que la tête & le bec de cet Oiseau. Son corps est à peu près de la grosseur de celui d'un *Dindon* femelle; mais il a proportionnellement la tête beaucoup plus grosse. Son bec, qui a vers son origine deux pouces huit lignes d'épaisseur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche neuf pouces de long. La tête, la gorge, le col, le dos & le croupion sont noirs. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. La poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les plumes de l'aile sont noires & marquées d'une tache blanche. La queue est composée de douze plumes: les dix du milieu sont noires: la plus extérieure de chaque côté est blanche. Le bec est rougeâtre, excepté l'origine du demi-bec inférieur, qui est noire. Sur le dessus du demi-bec supérieur s'élève une excroissance cornée, d'une grosseur considérable, de la même cou-

Cccc

leur que le bec, un peu concave dans sa partie supérieure, & dont les deux angles de la partie antérieure sont prolongés en-avant en forme de cornes. La partie postérieure est au contraire arrondie, & s'étend sur la partie supérieure de la tête jusque vers l'occiput. Cette excroissance cornée a six pouces de longueur sur trois pouces de largeur. Les narines sont placées vers l'origine du bec au-dessous de l'excroissance cornée. Les pieds sont verdâtres. On le trouve dans les *Isles Philippines*. *M. de Reaumur* n'en avoit que la tête & le bec dans son cabinet.

nihil concavum, cujusque bini partis anterioris anguli, cornuum in modum, antrorsum protenduntur. E contra illius posterior pars est rotundata, & supra caput superius versus occipitium usque protensa. Incrementum autem illud corneum sex pollicum longitudinem, & trium pollicum latitudinem obtinet. Nares ad exortum rostri, idque infra incrementum corneum, sitæ sunt. Pedes viridescunt. Habitat in *Philippensibus Insulis*. Hujus solummodo caput & rostrum in *musæo Realmuriano* servantur.

3. LE CALAO D'AFRIQUE.

Hydrocorax in toto corpore niger; rostro unicorni, cornu recto HYDROCORAX AFRICANUS.

Rhinoceros Avis. *Mus. Besl. pag. 37. N°. 7. capitis & rostri icon accurata Tab. IX. N°. 7.*

Rhinoceros Avis, secunda varietas. *Willugh. Ornith. capitis & rostri icon accurata Tab. XVII.*

Trompette de Brac, ou Oiseau Trompette. *Nouvelle Relation de l'Afrique Occidentale, &c. Par le P. Labat. A Paris 1728. in-12. Tom. IV. pag. 160, avec une mauvaise figure, pag. 161.*

Il est à peu près de la grosseur d'un *Dindon*. Sa tête & son bec ont ensemble dix-huit pouces de long. Tout son corps est couvert de plumes noires. Le bec est en partie rouge &

Cum *Gallo-Pavone* crassitie circiter convenit. Caput & rostrum, simul mensurata; octodecim pollices longa sunt. In universo corpore pennis vestitur nigris.

Rostrum est partim rubrum, en partie jaune, & les deux partim luteum, duarumque mandibules sont bordées de nigræ. Sur le dessus du demi-bec supérieur s'élève une excroissance cornée, d'une grosseur considérable, de la même couleur que le bec, & dont la partie antérieure est prolongée en-avant en forme de corne presque droite. La partie postérieure est au contraire arrondie, & s'étend sur la partie supérieure de la tête jusque vers l'occiput. Les narines sont placées vers l'origine du bec au-dessous de l'excroissance cornée. On le trouve en *Afrique*.
in *Africa*.

* 4. LE CALAO DES INDES.

Hydrocorax in toto corpore niger ; rostro unicorni , cornu recurvo HYDROCORAX INDICUS.

Corvus Indicus cornutus, seu Rhinoceros Avis. *Bont. Ind. Ori. pag. 63. capitis & rostri icon non satis accurata pag. 64.*

Corvus Indicus cornutus, seu Rhinoceros Avis Bontii. *Willugh. Ornith. pag. 86. capitis & rostri icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVII. Raj. Syn. Avi. pag. 40. N°. 8.*

Rhinoceros Avis. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 804. capitis & rostri icon non satis accurata pag. 805. Euf. Nieremb. pag. 230.*

Gaz. Rup. Best. rostri icon satis accurata Tab. 20.

Rhinoceros. *Jonst. Avi. pag. 29.*

Rhinoceros, Tragopanda Plinii. *Charlet. Exer. pag. 77. N°. 8.*

Nasutus Rhinoceros. *Klein. Avi. pag. 38. N°. 2.*

Tragopan. *Moehr. Avi. Gen. 4.*

Topau, Avis Indica. *Mus. Worm. pag. 293.*

Les Anglois l'appellent HORNED PIE OF ETHIOPIA. Charlet.

Hujus Avis caput & rostrum solummodo observavi. Je n'ai jamais vû que la tête & le bec de cet Oiseau. Son
Cccc ij

corps est beaucoup plus gros que celui de *notre Corbeau*. Son bec, qui a vers son origine deux pouces six lignes d'épaisseur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche dix pouces de long. Tout son corps est couvert de plumes noires. Le demi-bec supérieur est rouge à son origine, & d'un blanc-jaunâtre vers le bout : le demi-bec inférieur est de cette dernière couleur, excepté à son origine, où il est d'un noir brillant. Sur la base du demi-bec supérieur s'élève une excroissance cornée, dont la partie antérieure est prolongée en avant en forme de corne, & recourbée vers le haut. Cette espèce de corne a huit pouces de longueur, & quatre de largeur à sa base. Elle est variée de rouge & de jaune, & comme divisée en deux parties par une ligne noire, qui s'étend sur chacun de ses côtés selon sa longueur. Les narines sont situées vers l'origine du bec au-dessous de l'excroissance cornée. On le trouve dans les *Indes Orientales*. *M. de Reaumur* n'en avoit que la tête & le bec dans son *cabinet*.

Corporis crassitie *Corvum nostratem* multum antecellit. Rostrum, quod versum exortum duos pollices & sex lineas crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque decem pollices longum est. Per unum versus corpus pennis vestitur nigris. Mandibula superior in exortu rubra, versus apicem albo-flavicans; inferior verò per totam longitudinem ex albo flavicat, attamen in exortu nigro imbitur splendido. Supra mandibulae superioris basim extat incrementum corneum, cujus pars anterior, cornu in modum, antrorsum protenditur, & sursum reflectitur. Cornu autem illud octo pollices longum est, & quatuor in basi pollices latum. Rubro & luteo variegatur, illudque in duas quasi partes dividit linea nigra, in utroque latere secundum ipsius longitudinem extensa. Nares ad exortum rostri, idque infra incrementum corneum, sunt collocatae. Habitat in *India Orientali*. Hujus solummodo caput & rostrum in *museo Realmuriano* servabantur.

** 5. LE CALAO A BEC NOIR DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. XLVI. Fig. 1.

Hydrocorax superne sordidè griseus, marginibus pennarum albidis, infernè sordidè albus; taniâ utrinque supra oculos sordidè albâ; rectricibus lateralibus primâ medietate candidis, alterâ nigricantibus, apice albis; rostro levi, nigro.

. . . . HYDROCORAX SENEGALENSIS MELANORYNCHOS.

Crassitie Picam non multum excedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem octo pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem quinque pollices & lineas binas. Rostrum, quod in exortu unum pollicem crassum, ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & octo lineas longum est; cauda septem pollices cum tribus lineis; pes unum pollicem & octo lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & sex lineas, extimus quindecim lineas, intimus quatuordecim lineas: posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & pollicis unius; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, guttur, collum, dor-

Il. n'est guères plus gros qu'une Pie. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied cinq pouces deux lignes. Son bec, qui à son origine un pouce d'épaisseur, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche trois pouces huit lignes de long; sa queue sept pouces trois lignes; son pied un pouce huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce six lignes, l'extérieur quinze lignes, & l'intérieur quatorze lignes: celui de derrière est le plus court de tous. Il a deux pieds un pouce de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris sale, chaque plume étant

bordée de blanchâtre. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale d'un blanc sale, qui part d'auprès des narines, & s'étend jusque vers l'occiput, en passant par-dessus les yeux. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un blanc sale. Les couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur, & variées de taches noirâtres, qui occupent le milieu de chaque plume. Les plumes de l'aile sont noirâtres, & bordées tout autour d'un gris sale. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont d'un gris sale: toutes les latérales sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; le reste est noirâtre & terminé de blanc. Le bec est tout noir, excepté qu'il y a de chaque côté du demi-bec supérieur une tache longitudinale jaune, placée au-dessous des narines. La dentelure du bec est assez apparente. Les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

bitat in *Senegaliensi* regione, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Adanson*.

sum & uropygium vestiunt pennæ sordidè griseæ, albidò marginatæ. Scapulares & superiores caudæ rectrices concolores. In utroque capitis latere tania extat longitudinalis sordidè alba, prope nares orta, supra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus obtegentes sordidè albicant. Superiores alarum rectrices eodem imbuuntur colore, & maculis variegantur nigricantibus in uniuscujusque pennæ medio positis. Remiges sunt nigricantes, sordidè griseo in tota circumferentia marginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ sordidè griseæ: laterales omnes ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque candidæ, in reliqua longitudine nigricantes, attamen apice albæ. Rostrum in totum nigrum, exceptâ maculâ longitudinali luteâ, in utroque mandibulæ superioris latere infra nares positâ. Rostrum satis conspicuè denticulatum. Pedes, unguesque nigri. Ha-

** 6. LE CALAO A BEC ROUGE DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. XLVI. Fig. 2.

Hydrocorax superne sordidè griseus, infernè sordidè albus ; capite , gutture & collo sordidè albis , scapis pennarum in capite nigricantibus , collo superiore maculis nigricantibus vario ; fasciâ longitudinali nigricante in vertice ; rectricibus lateralibus nigricantibus , apice albis ; rostro levi , rubro

HYDROCORAX SENEGALENSIS ERYTHRORYNCHOS.

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & octo pollices explet , & ad extremos ungues sexdecim pollices & novem lineas. Rostrum , quod in exortu duodecim cum semi lineas crassum , ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & quinque lineas longum est ; cauda sex pollices cum decem lineis ; pes unum pollicem & sex lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim lineas , extimus quatuordecim lineas , intimus undecim lineas : posticus autem omnium brevissimus. Alis expansis , extremitates majorum remigum unius pedis & decem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad quartam circiter longitudinis caudæ partem usque protenduntur. Caput & gut-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied huit pouces , & jusqu'à celui des ongles de seize pouces neuf lignes. Son bec , qui a à son origine douze lignes & demie d'épaisseur , a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche trois pouces cinq lignes de long ; sa queue six pouces dix lignes ; son pied un pouce six lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , seize lignes , l'extérieur quatorze lignes , & l'intérieur onze lignes : celui de derrière est le plus court de tous. Il a un pied dix pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'au quart de la longueur de la queue. La tête & la gorge sont couvertes de plumes d'un blanc sale , dont la tige est noirâtre. Sur le sommet de la tête est une bande longitudinale noi-

râtre, qui s'étend jusque sur l'occiput. Le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un blanc sale; il y a cependant quelques taches longitudinales noirâtres à la partie supérieure du col la plus voisine du dos, ces taches occupant le milieu de chaque plume. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris sale. Les couvertures du dessus des ailes sont d'un blanc sale, varié de taches noirâtres, le blanc sale occupant le milieu de chaque plume, & le noirâtre en occupant les deux côtés. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres : les moyennes sont d'un gris sale. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris sale : toutes les latérales sont noirâtres, & terminées de blanc. Le bec & les pieds sont rouges; & les ongles noirâtres. La dentelure du bec est fort peu apparente. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

tur vestiunt pennæ sordidè albæ, scapis nigricantibus præditæ. In capitis vertice fascia extat longitudinalis nigricans, ad occipitium usque producta. Collum, pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtrus obtegentes sordidè albescent; attamen colli superioris pars dorso finitima quibusdam variegatur maculis longitudinalibus nigricantibus, cujuslibet pennæ medium occupantibus. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæque caudam superne cooperiunt, sunt sordidè griseæ. Superiores alarum rectrices sordidè albæ, maculis nigricantibus variæ, sordidè albo scilicet in medio cujusque pennæ, & nigricante in utroque latere posito. Remiges majores nigricantes : minores sordidè griseæ. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediae sordidè griseæ : laterales omnes nigricantes, apice albæ. Rostrum, pedesque rubri; ungues verò nigricantes. Rostrum minimè conspicuè denticulatum. Habitat in *Senegaliensi* regione, unde in museum *Reaumurianum* missus à *D. Adanson*.

Fin du Tome quatrième.



lao.



Dessiné et Gravé par M. B. B. B.

Calao.



Fig. 2.

2. Calao à bec rouge du Sénégal.

Fig. 1.

Fig. 2.



Desiné et Gravé par Martinet.

1. Calao à bec noir du Sénégal.

2. Calao à bec rouge du Sénégal.

INDEX

TABLE

*Avium in quarto volumine
contentarum, secundum
ordinem in quo dispo-
nuntur.*

*Des Oiseaux contenus dans
le quatri me volume, selon
l'ordre dans lequel ils
sont rang s.*

ORDO XIII.

SECTIO I.

XLVI. Genus *Torquilla*.

1. **T**orquilla.
A. *Torquilla striata*.

XLVII. Genus *Pici*.

1. *Picus viridis*.
2. *Picus viridis Bengalenfis*.
3. *Picus viridis Mexicanus*.
4. *Picus viridis Norvegicus*.
5. *Picus luteus Perficus*.
6. *Picus niger*.
7. *Picus niger Nov  Angli *.
8. *Picus niger Mexicanus*.
9. *Picus niger Carolinenfis cristatus*.
10. *Picus niger Virginianus cristatus*.
11. *Picus niger Cayanensis cristatus*.
12. *Picus varius Americanus cristatus*.
13. *Picus varius major*.
14. *Picus varius*.
15. *Picus varius minor*.
16. *Picus varius Canadensis*.

ORDRE XIII.

SECTION I.

XLVI. Genre du *Torcol*.

1. **L**e Torcol.
A. *Le Torcol ray *.

XLVII. Genre du *Pic*.

1. Le Pic verd.
2. Le Pic verd de Bengale.
3. Le Pic verd du Mexique.
4. Le Pic verd de Norvege.
5. Le Pic jaune de Perse.
6. Le Pic noir.
7. Le Pic noir de la nouvelle Angleterre.
8. Le Pic noir du Mexique.
9. Le Pic noir hup  de la Caroline.
10. Le Pic noir hup  de Virginie.
11. Le Pic noir hup  de Cayenne.
12. Le Pic vari  hup  d'Am rique.
13. Le grand Pic vari .
14. Le Pic vari .
15. Le petit Pic vari .
16. Le Pic vari  de Canada.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 17. Le Pic varié de Virginie. | 17. <i>Picus varius Virginianus.</i> |
| 18. Le petit Pic varié de Virginie. | 18. <i>Picus varius Virginianus minor.</i> |
| 19. Le Pic à tête rouge de Virginie. | 19. <i>Picus Virginianus erythrocephalus.</i> |
| 20. Le Pic varié de Cayenne. | 20. <i>Picus varius Cayanensis.</i> |
| 21. Le grand Pic varié du Mexique. | 21. <i>Picus varius Mexicanus major.</i> |
| 22. Le petit Pic varié du Mexique. | 22. <i>Picus varius Mexicanus minor.</i> |
| 23. Le Pic varié de la Jamaïque. | 23. <i>Picus varius Jamaicensis.</i> |
| 24. Le Pic varié de la Caroline. | 24. <i>Picus varius Carolinensis.</i> |
| 25. Le Pic rayé de S. Domingue. | 25. <i>Picus Dominicanensis striatus.</i> |
| 26. Le petit Pic rayé de S. Domingue. | 26. <i>Picus Dominicanensis striatus minor.</i> |
| 27. Le Pic rayé de Cayenne. | 27. <i>Picus Cayanensis striatus.</i> |
| 28. Le Pic rayé de Canada. | 28. <i>Picus Canadensis striatus.</i> |
| 29. Le petit Pic de S. Domingue. | 29. <i>Picus Dominicanensis minor.</i> |
| 30. Le Pic du Cap de Bonne Espérance. | 30. <i>Picus Capitis Bonæ Spei.</i> |
| 31. Le Pic blanc de Cayenne. | 31. <i>Picus Cayanensis albus.</i> |
| 32. Le petit Pic de Cayenne. | 32. <i>Picus Cayanensis minor.</i> |

SECTION II.

XLVIII. *Genre du Jacamar.*

1. Le Jacamar.
2. Le Jacamar à longue queue.

SECTION III.

XLIX. *Genre du Barbu.*

1. Le Barbu.
2. Le Barbu de Cayenne.
3. Le Barbu tacheté de Cayenne.
4. Le Barbu des Philippines.
5. Le Barbu des Maynas.

L. *Genre du Coucou.*

1. Le Coucou.
- A. Le Coucou roux.

SECTIO II.

XLVIII. *Genus Galbula.*

1. Galbula.
2. Galbula longicauda.

SECTIO III.

XLIX. *Genus Bucconis.*

1. Bucco.
2. Bucco Cayanensis.
3. Bucco Cayanensis nævius.
4. Bucco Philippenfis.
5. Bucco Maynanensis.

L. *Genus Cuculi.*

1. Cuculus.
- A. Cuculus rufus.

- | | |
|---|---|
| 2. Cuculus Dominicanensis. | 2. Le Coucou de S. Dominique. |
| 3. Cuculus Carolinensis. | 3. Le Coucou de la Caroline. |
| 4. Cuculus Jamaicensis. | 4. Le Coucou de la Jamaïque. |
| 5. Cuculus Jamaicensis longiroster. | 5. Le Coucou à long bec de la Jamaïque. |
| 6. Cuculus Mexicanus. | 6. Le Coucou du Mexique. |
| 7. Cuculus Senegalensis. | 7. Le Coucou du Sénégal. |
| 8. Cuculus Cayanensis. | 8. Le Coucou de Cayenne. |
| 9. Cuculus Cayanensis minor. | 9. Le petit Coucou de Cayenne. |
| 10. Cuculus Andalusæ. | 10. Le Coucou d'Andalousie. |
| 11. Cuculus Cayanensis nævius. | 11. Le Coucou tacheté de Cayenne. |
| 12. Cuculus Mindanensis nævius. | 12. Le Coucou tacheté de Mindanao. |
| 13. Cuculus Bengalensis nævius. | 13. Le Coucou tacheté de Bengale. |
| 14. Cuculus Indicus nævius. | 14. Le Coucou tacheté des Indes. |
| 15. Cuculus Malabaricus nævius. | 15. Le Coucou tacheté de Malabar. |
| 16. Cuculus Madagascariensis. | 16. Le Coucou de Madagascar. |
| 17. Cuculus Bengalensis niger. | 17. Le Coucou noir de Bengale. |
| 18. Cuculus Indicus niger. | 18. Le Coucou noir des Indes. |
| 19. Cuculus Brasiliensis cristatus. | 19. Le Coucou hupé du Brésil. |
| 20. Cuculus Brasiliensis cornutus. | 20. Le Coucou cornu du Brésil. |
| 21. Cuculus Coromandelanensis cristatus. | 21. Le Coucou hupé de Coromandel. |
| 22. Cuculus Madagascariensis cristatus. | 22. Le Coucou hupé de Madagascar. |
| 23. Cuculus Siamensis cristatus viridis. | 23. Le Coucou verd hupé de Siam. |
| 24. Cuculus Guineensis cristatus viridis. | 24. Le Coucou verd hupé de Guinée. |
| 25. Cuculus Brasiliensis cristatus ruber. | 25. Le Coucou rouge hupé du Brésil. |
| 26. Cuculus Madagascariensis cœruleus. | 26. Le Coucou bleu de Madagascar. |
| 27. Cuculus Sinensis cœruleus. | 27. Le Coucou bleu de la Chine. |
| 28. Cuculus Madagascariensis major. | 28. Le grand Coucou de Madagascar. |

SECTION IV.

SECTIO IV.

LI. *Le Genre du Couroucou.*

1. Le Couroucou cendré de Cayenne.
2. Le Couroucou verd de Cayenne.
3. Le Couroucou verd à ventre blanc de Cayenne.
4. Le Couroucou verd du Brésil.
5. Le Couroucou du Mexique.
6. Le Couroucou varié du Mexique.

LII. *Genre du Bout-de-petun.*

1. Le Bout-de-Petun.
2. Le grand Bout-de-petun.

LIII. *Genre du Perroquet.*

1. L'Ara du Brésil.
2. L'Ara de la Jamaïque.
3. L'Ara bleu & jaune de la Jamaïque.
4. L'Ara bleu & jaune du Brésil.
5. L'Ara varié des Moluques.
6. L'Ara verd du Brésil.
7. L'Ara verd & rouge du Brésil.
8. Le Kakatoes.
9. Le Kakatoes à hupe jaune.
10. Le Kakatoes à hupe rouge.
11. Le petit Kakatoes.
12. Le Kakatoes à aîles & queue rouges.
13. Le Lory de Ceram.
14. Le Lory des Moluques.
15. Le Lory des Indes Orientales.

LI. *Genus Trogonis.*

1. Trogon Cayanensis cinereus.
2. Trogon Cayanensis viridis.
3. Trogon Cayanensis viridis ventre candido.
4. Trogon Brasiliensis viridis.
5. Trogon Mexicanus.
6. Trogon Mexicanus varius.

LII. *Genus Crotophagi.*

1. Crotophagus.
2. Crotophagus major.

LIII. *Genus Psittaci.*

1. Ara Brasiliensis.
2. Ara Jamaicensis.
3. Ara Jamaicensis cyaneocrocea.
4. Ara Brasiliensis cyaneocrocea.
5. Ara Moluccensis varia.
6. Ara Brasiliensis viridis.
7. Ara Brasiliensis Erythrochlora.
8. Cacatua.
9. Cacatua luteo cristata.
10. Cacatua rubro cristata.
11. Cacatua minor.
12. Cacatua alis & caudâ rubris.
13. Lorius Ceramensis.
14. Lorius Moluccensis.
15. Lorius Orientalis Indicus.

- | | |
|---|--|
| 16. Lorius Philippensis. | 16. Le Lory des Philippines. |
| 17. Lorius Brasiliensis. | 17. Le Lory du Brésil. |
| 18. Lorius torquatus Indicus. | 18. Le Lory à collier des Indes. |
| 19. Lorius Amboinensis. | 19. Le Lory d'Amboine. |
| 20. Psittacus Jamaicensis icterocephalos. | 20. Le Perroquet à tête jaune de la Jamaïque. |
| 21. Psittacus Brasiliensis cyanocephalos. | 21. Le Perroquet à tête bleue du Brésil. |
| 22. Psittacus Barbadosensis. | 22. Le Perroquet des Barbades. |
| 23. Psittacus Cayanensis. | 23. Le Perroquet de Cayenne. |
| 24. Psittacus Brasiliensis erythrocephalos. | 24. Le Perroquet à tête rouge du Brésil. |
| 25. Psittacus Jamaicensis gutture rubro. | 25. Le Perroquet à gorge rouge de la Jamaïque. |
| 26. Psittacus Martinicanus. | 26. Le Perroquet de la Martinique. |
| 27. Psittacus Martinicanus gutture rubro. | 27. Le Perroquet à gorge rouge de la Martinique. |
| 28. Psittacus Guianensis cyanocephalos. | 28. Le Perroquet à tête bleue de la Guiane. |
| 29. Psittacus Martinicanus cyanocephalos. | 29. Le Perroquet à tête bleue de la Martinique. |
| 30. Psittacus Brasiliensis fronte rubra. | 30. Le Perroquet à front rouge du Brésil. |
| 31. Psittacus Amazonicus. | 31. Le Perroquet Amazone. |
| 32. Psittacus Amazonicus fronte lutea. | 32. Le Perroquet Amazone à front jaune. |
| 33. Psittacus Amazonicus gutture coerules. | 33. Le Perroquet Amazone à gorge bleue. |
| 34. Psittacus Amazonicus poikilorynchos. | 34. Le Perroquet Amazone à bec varié. |
| 35. Psittacus Amazonicus Brasiliensis. | 35. Le Perroquet Amazone du Brésil. |
| 36. Psittacus Amazonicus Jamaicensis. | 36. Le Perroquet Amazone de la Jamaïque. |
| 37. Psittacus Amazonicus varius. | 37. Le Perroquet Amazone varié. |
| 38. Psittacus Amazonicus gutture luteo. | 38. Le Perroquet Amazone à gorge jaune. |
| 39. Psittacus Sinensis. | 39. Le Perroquet de la Chine. |
| 40. Psittacus Americanus. | 40. Le Perroquet d'Amérique. |
| 41. Psittacus Lucionensis. | 41. Le Perroquet de l'Isle de Luçon. |

T A B L E

42. Le Perroquet à poitrine blanche du Mexique.
43. Le Perroquet varié des Indes.
44. Le Perroquet de la Guadeloupe.
45. Le Perroquet de la Nouvelle Espagne.
46. Le Perroquet bleu de la Guiane.
47. Le Perroquet jaune.
48. Le Perroquet jaune de Cuba.
49. Le Perroquet cendré de Guinée.
A. *Le Perroquet de Guinée à ailes rouges.*
B. *Le Perroquet de Guinée varié de rouge.*
50. Le Perroquet cendré du Brésil.
51. Le Perroquet brun.
52. Le Perroquet Mascarin.
53. Le Perroquet noir de Madagascar.
54. La Perruche.
55. La Perruche à collier.
56. La Perruche à collier des Indes.
57. La Perruche à collier de l'Île de Bourbon.
58. La Perruche de la Guadeloupe.
59. La Perruche de la Guiane.
60. La Perruche de Cayenne.
61. La Perruche du Brésil.
62. La Perruche à front rouge du Brésil.
63. La Perruche des Indes.
64. La Perruche de Gingi.
65. La Perruche à tête rouge de Gingi.
66. La Perruche de Bengale.
67. La Perruche de la Caroline.
42. *Psittacus Mexicanus pectore albo.*
43. *Psittacus varius Indicus.*
44. *Psittacus Aquarum Lupiarum Insulæ.*
45. *Psittacus Novæ Hispaniæ.*
46. *Psittacus Guianensis cœruleus.*
47. *Psittacus luteus.*
48. *Psittacus luteus Insulæ Cubæ.*
49. *Psittacus Guineensis cinereus.*
A. *Psittacus Guineensis alis rubris.*
B. *Psittacus Guineensis rubro varius.*
50. *Psittacus Brasiliensis cinereus.*
51. *Psittacus fuscus.*
52. *Psittacus Mascarinus.*
53. *Psittacus Madagascariensis niger.*
54. *Psittaca.*
55. *Psittaca torquata.*
56. *Psittaca Indica torquata.*
57. *Psittaca Borbonica torquata.*
58. *Psittaca Aquarum Lupiarum Insulæ.*
59. *Psittaca Guianensis.*
60. *Psittaca Cayanensis.*
61. *Psittaca Brasiliensis.*
62. *Psittaca Brasiliensis fronte rubrà.*
63. *Psittaca Indica.*
64. *Psittaca Ginginiana.*
65. *Psittaca Ginginiana erythrocephalos.*
66. *Psittaca Bengalenfis.*
67. *Psittaca Carolinenfis.*

- | | |
|---|--|
| 68. <i>Psittaca Illiniaca.</i> | 68. La Perruche Illinoise. |
| 69. <i>Psittaca Martinicana.</i> | 69. La Perruche de la Martinique. |
| 70. <i>Psittaca cyanocephalos.</i> | 70. La Perruche à tête bleue. |
| 71. <i>Psittaca Japonensis.</i> | 71. La Perruche du Japon. |
| 72. <i>Psittaca Amboinensis varia.</i> | 72. La Perruche variée d'Amboine. |
| 73. <i>Psittaca Indica varia.</i> | 73. La Perruche variée des Indes. |
| 74. <i>Psittaca Brasiliensis lutea.</i> | 74. La Perruche jaune du Brésil. |
| 75. <i>Psittaca Mexicana lutea.</i> | 75. La Perruche jaune du Mexique. |
| 76. <i>Psittaca Angolensis lutea.</i> | 76. La Perruche jaune d'Angola. |
| 77. <i>Psittaca coccinea Bonarum Fortunarum Insulæ.</i> | 77. La Perruche rouge de Bornéo. |
| 78. <i>Psittaca Indica coccinea.</i> | 78. La Perruche rouge des Indes. |
| 79. <i>Psittaca Amboinensis coccinea.</i> | 79. La Perruche rouge d'Amboine. |
| 80. <i>Psittaca Javensis cristata coccinea.</i> | 80. La Perruche rouge hupée de Java. |
| 81. <i>Psittacula Brasiliensis.</i> | 81. La petite Perruche du Brésil. |
| 82. <i>Psittacula Brasiliensis erythrocephalos.</i> | 82. La petite Perruche à tête rouge du Brésil. |
| 83. <i>Psittacula Brasiliensis uropygio cyaneo.</i> | 83. La petite Perruche à cul bleu du Brésil. |
| 84. <i>Psittacula Malaccensis.</i> | 84. La petite Perruche de Malacca. |
| 85. <i>Psittacula Guineensis.</i> | 85. La petite Perruche de Guinée. |
| 86. <i>Psittacula Indica.</i> | 86. La petite Perruche des Indes. |
| 87. <i>Psittacula Philippensis.</i> | 87. La petite Perruche des Philippines. |
| 88. <i>Psittacula Madagascariensis.</i> | 88. La petite Perruche de Madagascar. |
| 89. <i>Psittacula gutture luteo.</i> | 89. La petite Perruche à gorge jaune. |
| 90. <i>Psittacula Brasiliensis icterocephalos.</i> | 90. La petite Perruche à tête jaune du Brésil. |
| 91. <i>Psittacula Brasiliensis lutea.</i> | 91. La petite Perruche jaune du Brésil. |

92. La petite Perruche du Sénégal.
 93. La petite Perruche brune du Brésil.
 94. La petite Perruche hupée.
 95. La petite Perruche hupée du Mexique.

92. *Psittacula Senegalensis*.
 93. *Psittacula Brasiliensis fusca*.
 94. *Psittacula cristata*.
 95. *Psittacula Mexicana cristata*.

SECTION V.

SECTIO V.

LIV. *Genre du Toucan.*LIV. *Genus Tucanæ.*

1. Le Toucan.
 2. Le Toucan à gorge jaune de Cayenne.
 3. Le Toucan à gorge blanche du Brésil.
 4. Le Toucan à gorge blanche de Cayenne.
 5. Le Toucan à gorge jaune du Brésil.
 6. Le Toucan à collier du Mexique.
 7. Le Toucan verd du Mexique.
 8. Le Toucan verd de Cayenne.
 9. Le Toucan verd du Brésil.
 10. Le Toucan à collier de Cayenne.
 11. Le Toucan jaune.
 12. Le Toucan bleu.

1. *Tucana*.
 2. *Tucana Cayanensis gutturaluteo*.
 3. *Tucana Brasiliensis gutturalbo*.
 4. *Tucana Cayanensis gutturalbo*.
 5. *Tucana Brasiliensis gutturaluteo*.
 6. *Tucana Mexicana torquata*.
 7. *Tucana Mexicana viridis*.
 8. *Tucana Cayanensis viridis*.
 9. *Tucana Brasiliensis viridis*.
 10. *Tucana Cayanensis torquata*.
 11. *Tucana lutea*.
 12. *Tucana coerulea*.

ORDRE XIV.

ORDO XIV.

SECTION I.

SECTIO I.

LV. *Genre du Coq-de-Roche.*LV. *Genus Rupicolæ.*

1. Le Coq-de-Roche,

1. *Rupicola*.

LVI. *Genre du Manakin.*LVI. *Genus Manaci.*

1. Le Manakin.

1. *Manacus*.

2. *Manacus*

2. *Manacus gutture albo.*3. *Manacus albo-capillus.*4. *Manacus auro-capillus.*5. *Manacus rubro-capillus.*6. *Manacus ruber.*7. *Manacus aurantius.*8. *Manacus torquatus.*9. *Manacus albâ fronte.*10. *Manacus cristatus niger.*11. *Manacus cristatus rufus.*12. *Manacus cristatus ruber.*13. *Manacus cristatus griseus.*

2. Le Manakin à gorge blanche.

3. Le Manakin à tête blanche.

4. Le Manakin à tête d'or.

5. Le Manakin à tête rouge.

6. Le Manakin rouge.

7. Le Manakin orangé.

8. Le Manakin à collier.

9. Le Manakin à front blanc.

10. Le Manakin noir hupé.

11. Le Manakin roux hupé.

12. Le Manakin rouge hupé.

13. Le Manakin gris hupé.

SECTION II.

SECTION II.

LVII. *Genus Momoti.*LVII. *Genre du Momot.*1. *Momotus.*

1. Le Momot.

2. *Momotus variegatus.*

2. Le Momot varié.

SECTION III.

SECTION III.

LVIII. *Genus Ispidæ.*LVIII. *Genre du Martin-pêcheur.*1. *Ispida.*

1. Le Martin-pêcheur.

2. *Ispida Bengalenfis.*

2. Le Martin-pêcheur de Bengale.

3. *Ispida Bengalenfis minor.*

3. Le petit Martin-pêcheur de Bengale.

4. *Ispida Indica.*

4. Le Martin-pêcheur des Indes.

5. *Ispida Indica torquata.*

5. Le Martin-pêcheur à collier des Indes.

6. *Ispida Philippenfis cristata.*

6. Le Martin-pêcheur hupé des Philippines.

7. *Ispida Senegalenfis.*

7. Le Martin - pêcheur du Sénégal.

8. *Ispida Capitis Bonæ Spei.*

8. Le Martin-pêcheur du Cap de Bonne Espérance.

9. *Ispida Americana viridis.*

9. Le Martin - pêcheur verd d'Amérique.

10. *Ispida Cayanensis.*

10. Le Martin - pêcheur de Cayenne.

- | | |
|---|--|
| 11. Le grand Martin-pêcheur du Sénégal. | 11. <i>Ispida Senegalensis major.</i> |
| 12. Le Martin-pêcheur bleu de Madagascar. | 12. <i>Ispida Madagascariensis cœrulea.</i> |
| 13. Le Martin-pêcheur de Smyrne. | 13. <i>Ispida Smyrnenfis.</i> |
| 14. Le grand Martin-pêcheur de Bengale. | 14. <i>Ispida Bengalensis major.</i> |
| 15. Le Martin-pêcheur à collier de Bengale. | 15. <i>Ispida Bengalensis torquata.</i> |
| 16. Le Martin-pêcheur bleu d'Amérique. | 16. <i>Ispida Americana cœrulea.</i> |
| 17. Le Martin-pêcheur hupé des Indes. | 17. <i>Ispida Indica cristata.</i> |
| 18. Le Martin-pêcheur de Madagascar. | 18. <i>Ispida Madagascariensis.</i> |
| 19. Le Martin-pêcheur du Brésil. | 19. <i>Ispida Brasiliensis.</i> |
| 20. Le Martin-pêcheur hupé du Brésil. | 20. <i>Ispida Brasiliensis cristata.</i> |
| 21. Le Martin-pêcheur hupé de la Caroline. | 21. <i>Ispida Carolinensis cristata.</i> |
| 22. Le Martin-pêcheur hupé de S. Domingue. | 22. <i>Ispida Dominicensis cristata.</i> |
| 23. Le Martin-pêcheur hupé du Mexique. | 23. <i>Ispida Mexicana cristata.</i> |
| 24. Le Martin-pêcheur blanc & noir. | 24. <i>Ispida ex albo & nigro varia.</i> |
| 25. Le Martin-pêcheur tacheté du Brésil. | 25. <i>Ispida Brasiliensis nævia.</i> |
| 26. Le Martin-pêcheur de Ternate. | 26. <i>Ispida Ternatana.</i> |

LIX. *Genre du Todier.*

1. Le Todier.
2. Le Todier varié.

SECTION IV.

LX. *Genre du Guépier.*

1. Le Guépier.
2. Le Guépier à tête jaune.
3. Le Guépier jaune.

LIX. *Genus Todi.*

1. *Todus.*
2. *Todus varius.*

SECTIO IV.

LX. *Genus Apiaſtri.*

1. *Apiaſter.*
2. *Apiaſter icterocephalos.*
3. *Apiaſter flavicans.*

- | | |
|---|--|
| 4. Apiaſter Braſilienſis. | 4. Le Guêpier du Bréſil. |
| 5. Apiaſter Mexicanus. | 5. Le Guêpier du Mexique. |
| 6. Apiaſter ex Franciæ Inſula. | 6. Le Guêpier de l'Île de France. |
| 7. Apiaſter Madagaſcarienſis. | 7. Le Guêpier de Madagaſcar. |
| 8. Apiaſter Madagaſcarienſis torquatus. | 8. Le Guêpier à collier de Madagaſcar. |
| 9. Apiaſter Bengaleniſis torquatus. | 9. Le Guêpier à collier de Bengale. |
| 10. Apiaſter Philippenſis minor. | 10. Le petit Guêpier des Philippines. |
| 11. Apiaſter Angolenſis. | 11. Le Guêpier d'Angola. |
| 12. Apiaſter Philippenſis major. | 12. Le grand Guêpier des Philippines. |
| 13. Apiaſter Indicus erythrocephalus. | 13. Le Guêpier à tête rouge des Indes. |

SECTION V.


SECTION V.

LXI. Genus *Hydrocorax*.

LXI. Genre du Calao.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Hydrocorax. | 1. Le Calao. |
| 2. Hydrocorax Philippenſis. | 2. Le Calao des Philippines. |
| 3. Hydrocorax Africanus. | 3. Le Calao d'Afrique. |
| 4. Hydrocorax Indicus. | 4. Le Calao des Indes. |
| 5. Hydrocorax Senegaleniſis melanorhynchus. | 5. Le Calao à bec noir du Sénégal. |
| 6. Hydrocorax Senegaleniſis erythrorhynchus. | 6. Le Calao à bec rouge du Sénégal. |





T A B L E I N D E X

Des Genres.

Generum.

XLVI	Genre	. . .	page	3	XLVI	Genus	. . .	pagina	3
XLVII	Genre	. . .		8	XLVII	Genus	. . .		8
XLVIII	Genre	. . .		86	XLVIII	Genus	. . .		86
XLIX	Genre	. . .		91	XLIX	Genus	. . .		91
L	Genre	. . .		104	L	Genus	. . .		104
LI	Genre	. . .		164	LI	Genus	. . .		164
LII	Genre	. . .		177	LII	Genus	. . .		177
LIII	Genre	. . .		182	LIII	Genus	. . .		182
LIV	Genre	. . .		407	LIV	Genus	. . .		407
LV	Genre	. . .		437	LV	Genus	. . .		437
LVI	Genre	. . .		442	LVI	Genus	. . .		442
LVII	Genre	. . .		465	LVII	Genus	. . .		465
LVIII	Genre	. . .		471	LVIII	Genus	. . .		471
LIX	Genre	. . .		528	LIX	Genus	. . .		528
LX	Genre	. . .		532	LX	Genus	. . .		532
LXI	Genre	. . .		565	LXI	Genus	. . .		565



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS FRANÇOIS.

La lettre G indique le genre : la lettre V, la variété ;
& la lettre E, l'espece.

A.

	G.	E.		G.	E.
A Ra,	53		Calao,	61	1
— bleu & jaune de			— à bec noir du Sénégal,	61	5
la Jamaïque,	53	3	— à bec rouge du Séné-		
— bleu & jaune du Bré-			gal,	61	6
fil,	53	4	— d'Afrique,	61	3
— de la Jamaïque,	53	2	— des Indes,	61	4
— du Brésil,	53	1	— des Philippines,	61	2
— varié des Moluques,	53	5	Charpentier,	47	10
— verd du Brésil,	53	6	Coc des Roches,	55	1
— verd & rouge du Bré-			Cockatoo,	53	9
fil,	53	7	Cocou,	50	1
Aras,	53	1	Coq-de-Roche,	55	
— bleu & jaune,	53	4	—	55	1
— vert du Brésil,	53	6	Coqu,	50	1
Arra bleu,	53	4	Corbeau,	61	1
— (Perriche-),	53	7	Coucou,	50	
— rouge,	53	2	—	50	1
Artre,	58	1	—	50	5

B.

	G.	E.		G.	E.
B Arbu,	49		— à long bec de la Ja-		
—	49	1	maïque,	50	5
— de Cayenne,	49	2	— bleu de la Chine,	50	27
— des Maynas,	49	5	— bleu de Madagascar,	50	26
— des Philippines,	49	4	— brun & tacheté des		
— tacheté de Cayenne,	49	3	Indes,	50	13
Bout-de-petun,	52		— cornu du Brésil,	50	20
—	52	1	— d'Andalousie,	50	10
— de-petun, (Grand)	52	2	— de Cayenne,	50	8
			— de Cayenne, (Petit)	50	9
			— de la Caroline,	50	3
			— de la Jamaïque,	50	4
			— de Madagascar,	50	16
			— de Madagascar,		
			(Grand)	50	28

C.

	G.	E.
C Acatua, (Grand)	53	10
Calao,	61	

b iij

	G. V. E.		G.	E.
Coucou de S. Domingue,	50 2	Grand Cacatua ,	53	10
— du Mexique ,	50 6	— Coucou de Mada-		
— du Sénégal ,	50 7	gascar ,	50	28
— hupé de Coromandel,	50 21	— Coucou tacheré ,	50	10
— hupé de Madagascar,	50 22	— Grimpereau bigarré ,	47	13
— hupé du Brésil ,	50 19	— Guépier des Philip-		
— noir de Bengale ,	50 17	pinés ,	60	12
— noir des Indes ,	50 17	— Martin -pêcheur de		
—	50 18	Bengale ,	58	14
— rouge hupé du Brésil,	50 25	— Martin-pêcheur de la		
— roux ,	50 A. 1	Riviere de Gambia,	58	12
— tacheré de Bengale ,	50 13	— Martin-pêcheur du Sé-		
— tacheré de Cayenne ,	50 11	négal ,	58	11
— tacheré de Malabar ,	50 15	— Papegaut ,	53	49
— tacheré de Mindanao,	50 12	— (Papegay)	53	49
— tacheré des Indes ,	50 14	— (Perroquet)	53	49
— tacheré , (Grand)	50 10	— Perroquet de Macao,	53	1
— verd hupé de Guinée,	50 24	— Perroquet verd des		
— verd hupé de Siam ,	50	Indes Occidentales,	53	37
Couroucou ,	51 23	— Pic varié ,	47	13
— cendré de Cayenne ,	51 1	— Pic varié du Mexique,	47	21
— du Mexique ,	51 5	— Piverd à tête rouge ,	47	10
— varié du Mexique ,	51 6	— Piverd aux ailes d'or ,	47	21
— verd à ventre blanc		— Piverd bigarré ,	47	13
de Cayenne ,	51 3	Grimpereau bigarré ,		
— verd de Cayenne ,	51 2	(Grand)	47	13
— verd du Brésil ,	51 4	— bigarré , (Petit)	47	15
Cul rouge ,	47 14	— de Bengale ,	47	2
E.		— noir ,	47	6
	G. E.	— noir , (Petit)	47	7
E	47 14	Gros-bec ,	54	1
Peiche ,		—	54	10
— (Pic verd rouge		Guépier ,	60	
nommé en Fran-			60	1
çois)	47 14	— à collier de Bengale ,	60	9
Epeifche ,	47 14	— à collier de Madagaf-		
F.		car ,	60	8
	G. E.	— à tête jaune ,	60	2
F		— à tête rouge des Indes,	60	13
Emelle du Perroquet		— d'Angola ,	60	11
de Macao ,	53 3	— de Bengale ,	60	9
G.	G. E.	— de l'Isle de France ,	60	6
		— de Madagascar ,	60	7
G				
Rand Bout-de-pe-				
tun ,	52 2			

DES NOMS FRANÇOIS.

	G.	E.		G.	E.
Guêpier des Philippines,			Lory des Philippines,	53	16
(Grand)	60	12	— du Brésil,	53	17
— des Philippines, (Pe-			— écarlate,	53	14
tit)	60	10	— écarlate à longue		
— du Brésil,	60	4	queue,	53	77
— du Mexique,	60	5	— Perruche,	53	73
— jaune,	60	3			
— nommé Merops,	60	1			

M.

	G.	E.		G.	E.
H.			M Anakin,	56	
H Irondelle, (Martin-			—	56	1
pêcheur à queue			— à collier,	56	8
d')	48	2	— à front blanc,	56	9
I.			— à gorge blanche,	56	2
			— à tête blanche,	56	3
J Acamar,	48		— à tête d'or,	56	4
—	48	1	— à tête rouge,	56	5
— à longue queue,	48	2	— gris hupé,	56	13
			— noir & jaune,	56	7
			— noir hupé,	56	10
K.			— orangé,	56	7
			— rouge,	56	6
K Akatoes,	53		— rouge hupé,	56	12
—	53	8	— roux hupé,	56	11
— à ailes & queue rouges,	53	12	Manaquin chaperonné de		
— à hupe jaune,	53	9	blanc,	56	3
— à hupe rouge,	53	10	— chaperonné de noir,	56	1
— (Petit)	53	11	Mangeur d'Abeille des,		
L.			(Merops)	60	8
			Martin-pêcheur,	58	
L Aurey, Perroquet du			—	58	1
Brésil appelé par			— -pêcheur à collier de		
les Anglois)	53	18	Bengale,	58	15
Lory,	53		— -pêcheur à collier des		
— à calotte noir, (Pre-			Indes,	58	15
mier)	53	16	— -pêcheur à queue		
— à calotte noir, (Se-			d'Hirondelle,	48	2
cond)	53	15	— -pêcheur blanc &		
— à collier des Indes,	53	18	noir,	58	24
— d'Amboine,	53	19	— -pêcheur bleu d'Amé-		
— de Ceram,	53	13	rique,	58	16
— des Indes Orientales,	53	15	— -pêcheur bleu de Ma-		
— des Moluques,	53	14	dagascar,	58	12

	G.	E.		G.	E.
Martin-pêcheur de Bengale,	58	2	Martin-pêcheur vert & orange, (Petit)	58	9
— -pêcheur de Bengale, (Grand)	58	14	Martinet pêcheur,	58	1
— -pêcheur de Bengale (Petit)	58	3	Merle d'eau,	58	1
—	58	15	Merops, (Guépier nommé)	60	1
— -pêcheur de Cayenne,	58	10	— Mangeur d'Abeille des Indes,	60	8
— -pêcheur de l'Amérique,	58	22	Mésange noire à la tête dorée,	56	4
— -pêcheur de la Rivière de Gambia, (Grand)	58	12	Moineau de Guinée,	53	85
— -pêcheur de Madagascar,	58	18	— verd,	59	1
— -pêcheur de Smyrne,	58	13	Momot,	57	1
— -pêcheur de Ternate,	58	26	—	57	1
— -pêcheur des Indes,	58	4	— varié,	57	2
— -pêcheur des Indes, (Petit)	58	2	Monnier,	58	1
—	58	3			
— -pêcheur du Brésil,	58	19	O.		
— -pêcheur du Cap de Bonne Espérance,	58	8	Oiseau appelé Tocan,	54	4
— -pêcheur du Sénégal,	58	7	— aquatique apporté des terres neuves,	54	9
— -pêcheur du Sénégal, (Grand)	58	11	— couronné du Mexique,	50	24
— -pêcheur hupé de la Caroline,	58	21	— des terres neuves,	54	9
— -pêcheur hupé de S. Domingue,	58	22	— hupé du Mexique,	50	24
— -pêcheur hupé des Indes,	58	17	— Trompette,	61	3
— -pêcheur hupé des Philippines,	58	6	P.		
— -pêcheur hupé du Brésil,	58	20			
— -pêcheur hupé du Mexique,	58	23	Papegaut, (Grand)	53	49
— -pêcheur tacheté du Brésil,	58	25	Papegay grand,	53	49
— -pêcheur verd d'Amérique,	58	9	Pêcheur,	58	1
			Perriche à collier noir,	53	55
			— -Arra,	53	7
			— commune,	53	93
			— des Amazones,	53	67
			Perrique,	53	54
			— de la Guadeloupe,	53	58
			— du Brésil,	53	54
			Perroquet,	51	4
			—	53	
			— à collier des Indes Orientales,	53	56
			Perroquet		

DES NOMS FRANÇOIS.

xvij

	G.	E.		G. V. E.
Perroquet à crête blan-			Perroquet d'Angola ,	
che ,	53	9	(Petit)	53 76
— à front rouge du Bré-			— d'Orenock ,	53 27
fil ,	53	30	— de Bengale, (Petit)	53 66
— à gorge rouge de la			— de Cayenne ,	53 23
Jamaïque ,	53	25	— de Guinée ,	53 A. 49
— à gorge rouge de la			— de Guinée à aîles rou-	
Martinique ,	53	27	ges ,	53 A. 49
— à la longue queue ,	53	54	— de Guinée varié de	
— à poitrine blanche ,	53	42	rouge ,	53 B. 49
— à poitrine blanche du			— de l'Isle de Luçon ,	53 41
Mexique ,	53	42	— de la Caroline ,	53 67
— à tête blanche ,	53	26	— de la Chine ,	53 39
— à tête bleue de la Guia-			— de la Dominique ,	53 30
ne ,	53	28	— de la Guadeloupe ,	53 44
— à tête bleue de la Mar-			— de la Guadeloupe ,	53 44
tinique ,	53	29	— de la Jamaïque ,	53 2
— à tête bleue du Brésil ,	53	21	— de la Martinique ,	53 26
— à tête de Faucon ,	53	43	—	53 27
— à tête jaune de la Ja-			— de la Nouvelle Ef-	
maïque ,	53	20	pagne ,	53 45
— à tête rouge du Bré-			— de la Riviere des	
fil ,	53	24	Amazones ,	53 36
— Amazone ,	53	31	— de Macao , (Femelle	
— Amazone à bec varié ,	53	34	du)	53 3
— Amazone à front jau-			— de Macao , (Grand)	53 1
ne ,	53	32	— des Barbades ,	53 22
— Amazone à gorge			— du Brésil , appelé par	
bleue ,	53	33	les Anglois Lau-	
— Amazone à gorge jau-			rey ,	53 18
ne ,	53	38	— du Paradis de Cuba ,	53 48
— Amazone de la Jamaï-			— grand ,	53 49
que ,	53	36	— jaune ,	53 47
— Amazone du Brésil ,	53	35	—	53 74
— Amazone varié ,	53	37	— jaune de Cuba ,	53 48
— Amazonne ,	53	36	— Indien verd & rouge	
— bleu de la Guiane ,	53	46	de la plus petite	
— brun ,	53	51	espece ,	53 86
— brunâtre ,	53	45	— Mascarin ,	53 52
— cendré de Guinée ,	53	49	— noir de Madagascar ,	53 53
— cendré du Brésil ,	53	50	— rouge & cendré ,	53 B. 49
— couleur de Frefne ,	53	49	— rouge & vert de la	
— d'Amérique ,	53	40	Chine ,	53 39

	G.	E.		G.	E.
Perroquet varié des In-			Perruche de Bengale ,	53	66
des ,	53	43	— de Cayenne ,	53	60
— verd ,	53	54	— de Gingi ,	53	64
— verd à la queue lon-			— de Guinée , (Petite)	53	85
gue , (Petit)	53	54	— de la Caroline ,	53	67
— verd des Indes Occi-			— de la Guadeloupe ,	53	58
dentales , (Grand)	53	37	— de la Guiane ,	53	59
— verd des Indes Orien-			— de la Martinique ,	53	69
tales , (Petit)	53	85	— de Madagascar , (Pe-		
— verd du Brésil ,	53	30	tite)	53	83
— verd facé de bleu ,	53	28	— de Malaca , (Petite)	53	84
— verd , (Petit)	53	23	— des Indes ,	53	63
— verd , (Plus petit)	53	40	— des Indes , (Petite)	53	86
— violet ,	53	46	— des Philippines , (Pe-		
Perruche ,	53		tite)	53	87
—	53	54	— du Brésil ,	53	61
— à collier ,	53	55	— du Brésil , (Petite)	53	81
— à collier à tête cou-			— du Japon ,	53	71
leur de rose ,	53	66	— du Sénégal , (Petite)	53	92
— à collier de l'Isle de			— facée de jaune ,	53	68
Bourbon ,	53	57	— hupée du Mexique ,		
— à collier des Indes ,	53	56	(Petite)	53	95
— à cul bleu du Brésil ,			— hupée , (Petite)	53	94
(Petite)	53	83	— jaune d'Angola ,	53	76
— à estomach rouge ,	53	72	— jaune du Brésil ,	53	74
— à front rouge du Bré-			— jaune du Brésil , (Pe-		
fil ,	53	62	tite)	53	91
— à gorge brune ,	53	69	— jaune du Mexique ,	53	75
— à gorge jaune , (Pe-			— Illinoise ,	53	68
tite)	53	89	— (Lory)	53	73
— à l'aile rouge , (Pe-			— (Petite)	53	
tite)	53	63	— rouge d'Amboine ,	53	79
— à tête bleue ,	53	70	— rouge de Borneo ,	53	77
— à tête jaune du Bré-			— rouge des Indes ,	53	78
fil , (Petite)	53	90	— rouge hupée de Java ,	53	80
— à tête rouge de Gingi ,	53	65	— variée d'Amboine ,	53	72
— à tête rouge du Brésil ,			— variée des Indes ,	53	73
(Petite ,	53	82	— verte à longue queue ,	53	54
— à tête rouge & bleue ,	53	62	Perruches , verte & bleue ,		
— à tête rouge , (Petite)	53	85	(Plus petite des)	53	83
— brune du Brésil , (Pe-			Petit Coucou de Cayen-		
tite)	53	93	ne ,	50	9
— couronnée d'or ,	53	61	— Grimpereau bigarré ,	47	15

DES NOMS FRANÇOIS.

xix

	G.	E.		G.	E.
Petit Grimpereau noir, 47		7	Petite Perruche brune du		
— Guêpier des Philippi-			Brésil, 53		93
nes, 60	10		— Perruche de Guinée, 53		85
— Kakatoes, 53	11		— Perruche de Mada-		
— Martin - pêcheur de			gascar, 53		88
Bengale, 58	3		— Perruche de Malaca, 53		84
— 58	15		— Perruche des Indes, 53		86
— Martin - pêcheur des			— Perruche des Philip-		
Indes, 58	2		pines, 53		87
— 58	3		— Perruche du Brésil, 53		81
— Martin - pêcheur vert			— Perruche du Sénégal, 53		92
& orange, 58	9		— Perruche hupée, 53		94
— Perroquet d'Angola, 53	76		— Perruche hupée du		
— Perroquet de Benga-			Mexique, 53		95
le, 53	66		— Perruche jaune du		
— Perroquet verd, 53	23		Brésil, 53		91
— Perroquet verd à la			Pic, 47		
queue longue, 53	54		— 47		1
— Perroquet verd des			— à tête rouge de Vir-		
Indes Orientales, 53	85		ginie, 47		19
— Perroquet verd, (Plus) 53	40		— blanc de Cayenne, 47		31
— Pic de Cayenne, 47	32		— de Cayenne, (Petit) 47		32
— Pic de S. Domingue, 47	29		— de la premiere gran-		
— Pic rayé de S. Do-			deur au bec blanc, 47		9
mingue, 47	26		— de S. Domingue, (Pe-		
— Pic varié, 47	15		tit) 47		29
— Pic varié de Virginie, 47	18		— du Cap de Bonne Ef-		
— Pic varié du Mexique, 47	22		pérance, 47		30
— Piverd bigarré, 47	15		— jaulne, 47		1
— Piverd tacheté, 47	18		— jaune de Perse, 47		5
Petite Perruche, 53			— mart, 47		1
— Perruche à cul bleu			— noir, 47		6
du Brésil, 53	83		— noir de la Nouvelle		
— Perruche à gorge jau-			Angleterre, 47		7
ne, 53	89		— noir du Mexique, 47		8
— Perruche à l'aîle rou-			— noir hupé de Cayen-		
ge, 53	63		ne, 47		11
— Perruche à tête jaune			— noir hupé de la Ca-		
du Brésil, 53	90		roline, 47		9
— Perruche à tête rou-			— noir hupé de Virgi-		
ge, 53	85		nie, 47		10
— Perruche à tête rouge			— rayé de Canada, 47		28
du Brésil, 53	82		— rayé de Cayenne, 47		27

TABLE ALPHABETIQUE

	G.	E.		G.	E.
Pic rayé de S. Domingue,	47	25	Piverd racheré, (Petit)	47	18
— rayé de S. Domingue,			— velu,	47	17
(Petit)	47	26	Piverd de la Jamaïque,	47	23
— rouge,	47	14	Plus petit Perroquet		
— varié,	47	14	verd,	53	40
— varié de Canada,	47	16	— petite des Perruches,		
— varié de Cayenne,	47	20	verte & bleue,	53	83
— varié de la Caroline,	47	24	Premier Lory à calotte		
— varié de la Jamaïque,	47	23	noir,	53	16
— varié de Virginie,	47	17	Q.		
— varié de Virginie, (Pe-			G.	E.	
tit)	47	18	Q		
— varié du Mexique,			Ueue de Rat,	54	10
(Grand)	47	21	R.		
— varié du Mexique,			R.	G.	E.
(Petit)	47	22	R		
— varié hupé d'Améri-			At, (Queue de)	54	10
que,	47	12	S.		
— varié, (Grand)	47	13	S.	G.	E.
— varié, (Petit)	47	15	S		
— verd,	47	1	Second Lory à calotte		
— verd de Bengale,	47	2	noir,	53	15
— verd de Norvege,	47	4	T.		
— verd du Mexique,	47	3	T	G. V. E.	
— verd jaune,	47	1	Artarin,	58	1
— verd rouge nommé en			Tercot,	46	1
françois Epeiche,	47	14	Tercou,	46	1
— vert racheré des In-			Tocan, (Oiseau appelé)	54	4
des,	47	2	Todier,	59	
— vert tête grise,	47	4	—	59	1
Picumart,	47	1	— varié,	59	2
Pie,	50	4	Torcol,	46	
— du Brésil,	54	1	—	46	1
—	54	3	— rayé,	46	A. 1
Piverd,	47	1	Torcot,	46	1
— à tête rouge,	47	19	Torcou,	46	1
— à tête rouge, (Grand)	47	10	Toucan,	54	
— à trois ongllets,	47	20	—	54	1
— à ventre rouge,	47	23	— à bec rouge,	54	4
— au ventre jaune,	47	24	— à collier de Cayen-		
— aux ailes d'or, (Grand)	47	23	ne,	54	10
— bigarré, (Grand)	47	13	— à collier du Mexique,	54	6
— bigarré, (Petit)	47	15			

DES NOMS FRANÇOIS.

	G.	E.		G.	xxj E.
Toucan à gorge blanche			Toucan du Brésil,	54	3
de Cayenne,	54	4	— jaune,	54	11
— à gorge blanche du			— verd de Cayenne,	54	8
Bresil,	54	3	— verd du Brésil,	54	9
— à gorge jaune de			— verd du Mexique,	54	7
Cayenne,	54	2	Touraco,	50	24
— à gorge jaune du Bré-			Trompette de Brac,	61	3
sil,	54	5	— (Oiseau)	61	3
— bleu,	54	12	Turcot,	46	1



INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum , Latinorum , Hebraicorum ,
Græcorum , &c.

*Littera G Genus designat ; Littera V , varietatem ; &
Littera S , Speciem.*

A.		G.	S.		G.	S.
A	Bellerola ,	60	1	Alcedo cristata , Orien-		
	Acangatarâ Brasili-			talis , elegantissimè		
	liensibus , (Guirâ)	50	19	picta ,	58	17
—	Brasilienfibus Marc-			— fluviatilis ,	58	1
	gravii , (Guirâ)	50	19	— muta , &c.	58	1
—	Brasilienfium Marc-			— muta , cirrata , subvi-		
	gravii , (Guirâ)	50	19	ridis ,	58	20
—	(Guirâ)	50	19	— Plombina ,	58	1
	Achalactli ,	58	23	Alcyon ,	58	1
•	Adfinis , (Ardeæ)	60	4	—	58	21
—	(Columbæ)	50	25	— fluviatilis ,	58	1
—	(Cuculo)	50	24	— riparia ,	58	1
	Aegerft-Specht ,	47	14	Alia Xochitenacatl ,	54	11
	Aegerften-Specht ,	47	14	Aliud Ispidæ genus quod		
	Affinis , (Ispidæ)	57	1	ex India adfertur ,	59	2
—		58	20	Αλκυον ,	58	1
—	(Meropi)	57	1	Αλκυών αφανος ,	58	1
	Ajuru ,	53		Altera Xochitenacatl ,	54	3
—	-Apara ,	53	58	—	54	12
—	-Apara Brasilienfibus ,	53	58	Americam King's-Fisher ,	53	22
—	-Catinga ,	53	58	Anaca ,	53	93
—	-Catinga Brasilienfi-			— Brasilienfibus ,	53	93
	bus ,	53	58	Ανδροπεργλωτος ,	53	
—	-Couri ,	53	31	Ani ,	52	1
—	-Curau ,	53	31	— Brasilienfibus ,	52	1
—	-Curuca ,	53	21	— Brasilienfibus Marc-		
	Alcatraz Oviedi ,	61	1	gravii ,	52	1
	Alcedo ,	58	1	— Brasilienfium Marc-		
—	Amboinensis cristata ,	58	6	gravii ,	52	1
—	Americana ,	58	16	Apara , (Ajuru-)	53	58
—	Americana , cirrata ,			— Brasilienfibus , (Aju-		
	subviridis ,	58	20	ru-)	53	58

	G.	S.		G. V.	S.
Apiaster,	60		Ara verd du Brésil,	53	6
—	60	I	— verd & rouge du Bré-		
— Angolenfis,	60	II	fil,	53	7
— Bengâlenfis torquatus,	60	9	Aracari,	54	9
— Brasiliensis,	60	4	— Brasiliensibus,	54	9
— Charletonis,	60	I	— Brasiliensibus Marc-		
— ex Franciæ Insula,	60	6	gravii,	54	9
— flavicans,	60	3	— Marcgravii, (Cucu-		
— Gazæ,	60	I	lus Brasiliensis,)	54	9
— icterocephalos,	60	2	Arara,	53	7
— Indicus erythrocephalos,	60	13	Araracanga,	53	2
— Madagascariensis,	60	7	— Brasiliensibus,	53	2
— Madagascariensis tor-			— Marcgravii,	53	2
quatus,	60	8	Araræ species minor,		
— Mexicanus,	60	5	(Maracana)	53	7
— Philippensis major,	60	12	Ararauna,	53	4
— Philippensis minor,	60	10	— Brasiliensibus,	53	4
Apiastra,	58	16	— Brasiliensibus Marc-		
— Servio,	60	I	gravii,	53	4
Apute Juba Marcgravii,			Aras,	53	I
(Tui)	53	68	— bleu & jaune,	53	4
— Juba, secunda species,			— vert du Brésil,	53	6
(Tui)	53	68	Arborum cavator,	47	I
— Juba, (Tui)	53	68	Ardea Mexicana, altera,	47	3
Ara,	53		Ardeæ adfinis,	60	4
— bleu & jaune de la			— Mexicanæ Species fin-		
Jamaïque,	53	3	gularis,	47	8
— bleu & jaune du Bré-			— Mexicanæ Species fin-		
fil,	53	4	gularis, (Jacula-		
— Brasiliensis,	53	I	tor;)	47	8
— Brasiliensis cyaneo-			Arné,	58	I
crocea,	53	4	Arra bleu,	53	4
— Brasiliensis erythro-			— (Perriche-)	53	7
chlora,	53	7	— rouge,	53	2
— Brasiliensis viridis,	53	6	Artre,	58	I
— de la Jamaïque,	53	2	Arvela,	58	I
— du Brésil,	53	I	Ash-colour'd and Red		
— Jamaicensis,	53	2	Parrot,	53	B. 49
— Jamaicensis cyaneo-			— coloured Parrot,	53	49
crocea,	53	3	Atinga guacu mucu Bra-		
— Moluccensis varia,	53	5	siliensibus Marc-		
— varié des Moluques,	53	5	gravii,	50	20
			Atingacu Camucu,	50	20

	G.	S.		G.	S.
Atingacu Camucu Brasiliensibus,	50	20	Avis germinis Maizy de Maicatototl, Brasiliensis,	56	8
Aveivruco,	60	1	— Indica,	61	4
Avicula anonyma,	56	3	— Kakatoeha Orientalis, &c.	53	9
— cristata, formâ Passeris,	56	13	— (Meropi cognata)	60	2
— de Cacatototl, &c.	56	3	— (Monstrofa)	54	1
— de Quauhcuilui dicta, &c.	60	5	— Paradisi Orientalis,	53	73
— ex Malaca Insula,	53	84	— Paradisiaca Orientalis, &c.	53	73
— fortè Surinamensis, &c.	56	6	— Paradisiaca, Ternatana,	58	26
— ligna excavans,	47	22	— Philippenfis, galeâ planâ,	61	2
— Mexicana de Chichiltototl,	56	4	— Picicicli Brasiliensis, minima, cristata,	56	12
— Mexicana de Chichiltototl, altera,	56	5	— Piperivora nonnullis,	54	1
— nigra, &c.	56	4	— Piscium vibratrix,	58	23
Avis alia canescens, Senex dicta, &c. (Pluvie)	50	5	— (Pluviæ)	50	4
— Americana, cristata, Rubetra dicta,	56	11	— prima varietas, (Rhynoceros)	61	2
— anonyma prima,	58	19	— quædam Americæ,	47	12
— anonyma secunda,	56	1	— (Regia)	50	24
— anonyma tertia,	51	4	— (Rhynoceros)	61	3
— Bontii, (Rhynoceros)	61	4	—	61	4
— (Calao)	61	2	— ridibunda,	50	6
— caudata,	57	2	— S. Mariæ,	58	1
— Cocho, Psittaci Mexicani species,	53	75	— secunda varietas, (Rhynoceros)	61	3
— congener Tzanatl,	51	5	— similis Tzanatl,	51	5
— Corvina,	52	1	— torquata,	58	23
— de Cocho, Psittaci species, Mexicana, vario colore,	53	95	B.		
— dictus, (Picus major canescens; Pluviæ)	50	4	B Arbara,	54	1
— dictus, (Picus major leucophæus; Pluviæ)	50	4	B Barbu,	49	
			—	49	1
			— de Cayenne,	49	2
			— des Maynas,	49	5
			— des Philippines,	49	4
			— tacheré de Cayenne,	49	3
			Baum-hecker,	47	
			Bee-Eater,	60	1

ALPHABETICUS.

xxv

	G.	S.		G.	S.
Bee-Eater, (Indian)	60	8	Bundter-Specht	47	14
Bengall King-Fisher	58	15	— Specht, (Klein)	47	15
Bequebó,	47		— Specht, (Kleiner)	47	15
—	47	6	Bunt-Specht	47	13
Bienen-Wolf,	60	1	— Specht, (Kleinere)	47	15
— Wolf, (Gelber)	60	1	Bunter-Specht	47	14
Bird from Mexico			Burynchos	54	1
(Crown)	50	24	Buteo	53	73
— (Great Black-)	52	1			
— (Green Humming)	59	1		G.	S.
— (Rain-)	50	4	Cacaſſou,	53	9
—	50	5	Cacalotototl	52	1
— (Savanna Black-)	52	1	Cacatorotl, &c. (Avi-		
— was Brought from			cula de)	56	3
Bengal,	53	66	Cacatua,	53	
Black-Bird, (Great)	52	1	—	53	8
— Bird, (Savanna)	52	1	— alis & caudâ rubris,	53	12
— capped Lory, (First)	53	16	(Grand)	53	10
— capped Lory, (Second)	53	15	— luteo cristata,	53	9
— capped Manakin,	56	1	— minor,	53	11
— Wood-pecker, Great	47	6	— rubro cristata,	53	10
— Wood-pecker, (Left)	47	7	Calao,	61	
Blue and yellow Maccaw	53	4	—	61	1
— -faced Green Parrot	53	28	— à bec noir du Sénégal,	61	5
Blew Maccaw,	53	3	— à bec rouge du Séné-		
Boughtfallick,	50	13	gal,	61	6
Bout-de-petun,	52		— Avis,	61	2
—	52	1	— d'Afrique,	61	3
— -de-petun, (Grand)	52	2	— des Indes,	61	4
Bracelet Parrakeet from			— des Philippines,	61	2
East India,	53	56	Camucu, (Atingacu)	50	20
Brasilian Green Maccaw	53	6	— Brasiliensibus, (Atin-		
— Green Parrot,	53	30	gacu)	50	20
Brown-throated Parra-			Canide Lerii,	53	4
keet,	53	69	Capotorto,	46	1
Bucco,	49		Carpenteros,	47	9
—	49	1	Carpintero,	54	1
—	54	1	Caryocatactes,	61	1
— Cayanensis,	49	2	Catcher, (Crab-)	58	24
— Cayanensis nævius,	49	3	Catinga, (Ajuru-)	53	58
— Maynanensis,	49	5	— Brasiliensibus, (Aju-		
— Philippensis,	49	4	ru-)	53	58
			Cavator, (Arborum)	47	1

	G.	V.	S.		G.	S.
Charpentier ,	47	10		Coqu ,	50	1
Cheren ,	58	1		Coquantototl ,	56	13
Chichiltototl , altera ,				Corbeau ,	61	1
(Avicula Mexica-				Cornix ,	47	3
na de)	56	5		—	47	21
— (Avicula Mexicana				— garrula major ,	52	1
de)	56	4		Corta pao ,	47	9
Χλορεας ,	47	1		Corvi marini genus ,	61	1
Cinclida ,	46	1		Corvus Indicus ,	61	1
Coc des Roches ,	55	1		— Indicus Bontii ,	61	1
Coccix ,	50	1		— Indicus cornutus ,	61	4
Cochitenacatl ,	54	6		— Indicus cornutus Bon-		
Cocho , (Avis)	53	75		rii ,	61	4
Cockatoo ,	53			— torquatus , &c.	61	1
—	53	9		Coia ,	50	22
— (Greater)	53	10		Coucou ,	50	
Cockatooon ,	53	1		—	50	1
Cockatoons ,	53			—	50	5
Coco ,	50	1		— à long bec de la Ja-		
Cocou ,	50	1		maïque ,	50	5
Cocut ,	50	1		— bleu de la Chine ,	50	27
Collitorques ,	46	1		— bleu de Madagascar ,	50	26
Collotorto ,	46	1		— brun & tacheré des		
Coloured Wood-pecker ,				Indes ,	50	13
(Middle - Sized				— cornu du Brésil ,	50	20
parti-) ,	47	23		— d'Andalousie ,	50	10
Columbæ adiniis ,	50	25		— de Cayenne ,	50	8
Common Parrot ,	53	36		— de Cayenne , (Petit)	50	9
— Parrot of Jamaica ,	53	25		— de la Caroline ,	50	3
Cognata Avis , (Meropi)	60	2		— de la Jamaïque ,	50	4
Congener Aldrovandi ,				— de Madagascar ,	50	16
(Meropi)	60	2		— de Madagascar ,		
— Curucui Brasiliensibus				(Grand)	50	28
dictus Marcgravii ,				— de S. Domingue ,	50	2
(Picis)	51	2		— du Mexique ,	50	6
— (Iyngi)	46	A. 1		— du Sénégal ,	50	7
— (Merops)	60	2		— hupé de Coromandel ,	50	21
— (Picis)	51	4		— hupé de Madagascar ,	50	22
— (Psittaco)	52	1		— hupé du Brésil ,	50	19
— Tzanatl , (Avis)	51	5		— noir de Bengale ,	50	17
Connoro ,	53	2		— noir des Indes ,	50	17
Coq-de-Roche ,	55			—	50	18
—	55	1		— rouge hupé du Brésil ,	50	25

ALPHABETICUS.

xxvij

	G. V. S.			G. V. S.	
Coucou roux,	50	A. 1	Cuculo,	50	1
— tacheré de Bengale,	50	13	— adfinis,	50	24
— tacheré de Cayenne,	50	11	Cuculus,	50	
— tacheré de Malabar,	50	15	—	50	1
— tacheré de Mindanao,	50	12	—	50	A. 1
— tacheré des Indes,	50	14	— Aldrovandi secunda,	50	1
— tacheré, (Grand)	50	10	— alis deauratis,	47	28
— verd hupé de Guinée,	50	24	— alter,	50	1
— verd hupé de Siam,	50	23	— Americanus totus ci-		
Coulacissi,	53	87	nereus,	50	2
Couri, (Ajuru-)	53	31	— Andalusæ,	50	10
Couroucou,	51		— Bengalensis, &c.	50	13
— cendré de Cayenne,	51	1	— Bengalensis nævius,	50	13
— du Mexique,	51	5	— Bengalensis niger,	50	17
— varié du Mexique,	51	6	— Brasiliensis, Araeari		
— verd à ventre blanc			Marcgravii,	54	9
de Cayenne,	51	3	— Brasiliensis cornutus,	50	20
— verd de Cayenne,	51	2	— Brasiliensis cristatus,	50	19
— verd du Brésil,	51	4	— Brasiliensis cristatus		
Crab-Catcher,	58	24	ruber,	50	25
Crested Parrot,	53	9	— Brasiliensis, venustissi-		
— Parrot, (White-)	53	8	mè pictus,	50	25
— Wood-pecker, (Lar-			— Carolinensis,	50	3
ger red-)	47	10	— Caroliniensis,	50	3
Cromb,	50	28	— Cayanensis,	50	8
Crotophagus,	52		— Cayanensis minor,	50	9
—	52	1	— Cayanensis nævius,	50	1
— ater, &c.	52	1	— cinereus, &c.	50	1
— major,	52	2	—	50	5
Crown Bird from Mexi-			— Coromandelanensis		
co,	50	24	cristatus,	50	21
Crown'd Parrat, (Great			— Dominicanensis,	50	2
Flat-)	53	1	— ex cœrulescente niger,		
Crowned Parrakeet,			&c.	50	17
(Golden-)	53	61	— Guineensis cristatus		
Cuba Parrot,	53	48	viridis,	50	24
Cucco,	50	1	— Jamaicensis,	50	4
Cucculo,	50	1	— Jamaicensis longirof-		
Cucho,	50	1	ter,	50	5
Cuckow,	50	1	— Jamaicensis major,	50	4
— of Carolina,	50	3	—	50	5
Cucillo,	50	1	— Indicus nævius,	50	14
Cuco,	50	1	— Indicus niger,	50	18

d ij

	G. V. S.			G.	S.
Cuculus junior ,	50	1	Curucui Marcgravii ;	51	4
— Madagascariensis ,	50	16	— Willughbeji ,	51	4
— Madagascariensis cœruleus ,	50	26		D.	
— Madagascariensis cristatus ,	50	22		G.	S.
— Madagascariensis major ,	50	28	D Ardo ,	60	1
— major ,	50	4	Dardano ;	60	1
— major , &c.	50	5	Δεικοκτο ,	50	1
— major olivaceus ,	50	4	Δενδροκολάπτης ,	47	
— Malabaricus nævius ,	50	15	Δενδροκολαπτης ,	47	1
— Mexicanus ,	50	6	Diomedæa ,	47	8
— Mindanensis nævius ,	50	12	Dreh-hals ,	46	1
— nigricans , &c.	50	1	Dryocolaptæ, Aristoteli ,		
— nostras ,	50	1	(Tertia Species)	47	6
— prima Aldrovandi ,	50	1	Δρύκοπος ,	47	
— prior ,	50	1	Δρυκολάπτης ,	47	
— rectricibus nigricantibus , &c.	50	1	—	47	1
— rufus ,	50	A. 1	Δρυκολαπτης ,	47	
— Senegalensis ,	50	7	Δρυκολαψ ,	47	
— Siamenfis cristatus viridis ,	50	23	Δρυκολαψ ,	47	
— Sinensis cœruleus ,	50	27	Δρυκόπος ,	47	
— subgrisea maculata ,			Δρυτοτομης ,	47	
— vulgaris nostras ,	46	1	Driou , (Vouroug-)	50	28
Cugul ,	50	1	Dudi ,	53	
Cuil ,	50	15	Dusky Parrot ,	53	45
Cukeel ,	50	17	Dzieciol ,	47	
Cul rosso ,	47	13	—	47	1
—	47	14	— naywiekszy ,	47	6
Cul rouge ;	47	14	— pstry mniejszy ,	47	15
Curau , (Ajuru-)	53	31	— pstry wiekszy ,	47	14
Curruca ,	60	5	— zielony ,	47	1
Curuca , (Ajuru-)	53	21	Dzieziol ,	47	
Curucui ,	51	4		E.	
— Brasiliensibus ,	51	4		G.	S.
— Brasiliensibus dictus Marcgravii , (Picis congener)	51	4	E Ater , (Bee-)	60	1
— Brasiliensibus Marcgravii ,	51	4	— (Indian Bee-)	60	8
			Eifs-Vogel ,	58	1
			Elster-Specht ,	47	14
			Emmet-hunter ,	46	1
			Epeiche ,	47	14
			— (Pic verd rouge nommé en François)	47	14
			Epeische ,	47	14
			Erythrocyaneus ,	53	2

		G.	S.			G.	S.
Erythrocyanus Ornitho-				Gaulo ,		60	I
logi , (Psittacus)	53	2		Gaza di Bressilia ,		54	I
— (Psittacus)	53	2		Geecka ,		50	I
Eys-Vogel ,	58	I		Geelber Papagey, (Rol-)	53		4
Eysengartt ,	58	I		— Sittich ,	53		I
Eysz-Vogel ,	58	I		Geeler Papagey, (Greun-)	53	55	
F.				Gelber Bienen-Wolf ,	60		I
		G.	S.	— Papegey , (Lang			
FAlcinellus Rubetra ,	56	II		Schwantziger)	53	76	
Femelle du Perro-				— Sittich , (Rot-)	53		I
quet de Macao ,	53	3		Gespregleter-Specht ,	47	14	
First Black-capped Lory,	53	16		Gioek-tida ,	46		I
Fisher , (American				Gjoek ,	50		I
King's-)	58	22		— -tyta ,	46		I
— (Bengall King-)	58	15		Gjoeling , (Groen-)	47		I
— (King-)	58	I		Gold-Winged Wood-pec-			
—	58	2I		ker ,	47	28	
— (Kings-)	58	I		Golden-crowned Parra-			
— } Little Green and				keet ,	53	6E	
orange - coloured				Grallo ,	60		I
King-)	58	9		Grand Bout-de-petun ,	52		2
— (Little Indian King-)	58	2		— Cacarua ,	53	10	
—	58	3		— Coucou de Mada-			
— (Smyrna King-)	58	13		gascar ,	50	28	
Flat - crown'd Parrat ,				— Coucou tacheté ,	50	10	
(Great)	53	I		— Grimpereau bigarré ,	47	13	
Florus Gesnero ,	60	I		— Guêpier des Philip-			
Formicula ,	46	I		pines ,	60	12	
Formigué ,	60	2		— Martin-pêcheur de			
Fowl , (Rain)	47	I		Bengale ,	58	14	
Fracz , (Pfeffer-)	54	I		— Martin-pêcheur de la			
Frafz , (Imben-)	60	I		Riviere de Gambia ,	58	12	
— (Pfeffer-)	54	I		— Martin-pêcheur du Sé-			
French-Pie ,	47	14		négal ,	58	1I	
Fridytutah ,	53	66		— Papegaut ,	53	49	
G.				— (Papegay)	53	49	
		G.	S.	— (Perroquet)	53	49	
GAlbula ,	48			— Perroquet de Macao ,	53		I
—	48	I		— Perroquet verd des			
— longicauda ,	48	2		Indes Occidenta-			
Galgulus ,	47	I		les ,	53	37	
Gallus ferus , faxatilis ,				— Pic varié ,	47	13	
croceus , &c.	55	I		— Pic varié du Mexique ,	47	2I	

	G.	S.		G.	S.
Grand Piverd à tête rou-			Greun-geeler Papagey,	53	55
ge,	47	10	— Specht,	47	1
— Piverd aux ailes d'or,	47	21	Greuner Papegey,	53	54
— Piverd bigarré,	47	13	Grimpereau bigarré,		
Grafe-Specht,	47	1	(Grand)	47	13
Grafs-Specht,	47	15	— bigarré, (Petit)	47	15
Great beakt Pie of Bra-			— de Bengale,	47	2
fil,	54	1	— noir,	47	6
— Black-Bird,	52	1	— noir, (Petit)	47	7
— Black Wood-pecker,	47	6	Groen-gjoeling,	47	1
— Flat-crown'd Parrat,	53	1	— Spik,	47	1
— Green Parrot from			Gros-bec,	54	1
the West-Indies,	53	37	—	54	10
— Spotted Wood-pec-			Grosse weisse Papagey,	53	9
ker,	47	13	Großer Specht,	47	6
Greater Cockatoo,	53	10	Grun-Specht,	47	1
— Spotted Wood-pec-			Guacu Brasiliensibus,(Ja-		
ker,	47	13	guacati)	58	20
Green and Blue Parra-			— Brasiliensibus Marc-		
keet, (Least)	53	83	gravii, (Jaguacati)	58	20
— and orange-coloured			— Brasiliensibus Marc-		
King-Fisher, (Lit-			gravii, (Tije-)	56	10
tle)	58	9	— Brasiliensibus Marc-		
— and Red Parrot from			gravio, (Jaguaca-		
China,	53	39	ti)	58	20
— and yellow Parrot			— Brasiliensibus, (Tije-)	56	10
from Barbadoes,	53	22	— (Jaguacati)	58	20
— Humming Bird,	59	1	— Marcgravii, (Jagua-		
— Long-tailed Parrot,			cati)	58	20
(Small)	53	54	— mucu Brasiliensibus		
— Maccauw, (Brasilian)	53	6	Marcgravii, (Atin-		
— Parrakeet, (Long-			ga)	50	20
tailed)	53	54	— (Tije-)	56	10
— Parroket,	53	81	Guainumbi Brasiliensibus		
— Parrot, (Blue-faced)	53	28	Tupinambis, (Gui-		
— Parrot, (Brasilian)	53	30	ra-)	57	1
— Parrot from the West-			— Brasiliensibus Tupi-		
Indies, (Great)	53	37	nambis Marcgra-		
— Parrot, (Lesser)	53	40	vio, (Guira-)	57	1
— Parrot, (Little)	53	23	— (Guira-)	57	1
— Sparrow,	59	1	Guckauch,	50	1
— Wood-pecker,	47	1	Gucker,	50	1
— Wood-Spite,	47	1	Guckguck,	50	1

ALPHABETICUS.

xxxj

	G.	S.		G.	S.
Guêpier ,	60		Halcedo muta ,	58	I
—	60	I	Halcyon ,	58	I
— à collier de Bengale ,	60	9	Hals , (Dreh-)	46	I
— à collier de Madagaf-			— (Tray-)	46	I
car ,	60	8	— (Wende-)	46	I
— à tête jaune ,	60	2	— (Wind-)	46	I
— à tête rouge des Indes ,	60	13	Hals , (Traee-)	46	I
— d'Angola ,	60	11	Halfz , (Nater-)	46	I
— de Bengale ,	60	9	— (Wind-)	46	I
— de l'Isle de France ,	60	6	Hawk-Headed Parrot ,	53	43
— de Madagafcar ,	60	7	Hecker , (Baum-)	47	
— des Philippines ,			Heunlin , (Waffer)	53	I
(Grand)	60	12	Hew-hole ,	47	I
— des Philippines , (Pe-			Heyhoe ,	47	I
tit)	60	10	Hia , (San-)	50	27
— du Bréfil ,	60	4	Hickwall ,	47	15
— du Mexique ,	60	5	High-hoo ,	47	I
— jaune ,	60	3	Hipporinchos ,	54	I
— nommé Merops ,	60	I	Hipporynchos ,	54	I
Gugckufer ,	50	I	Hirondelle , (Martin-pê-		
Guggauch ,	50	I	cheur à queue d')	43	2
Guaruba ,	53	74	Hito ,	58	6
Guinea Parrot ,	53	49	Hol-kraee ,	47	6
Guiney Sparrow ,	53	85	— krahe ,	47	6
Guira Acangatara ,	50	19	Hole , (Hew-)	47	I
— Acangatara Brasiliën-			Holtz-hun ,	47	6
fibus ,	50	19	— kraee ,	47	6
— Acangatara Brasiliën-			— krahe ,	47	6
fibus Marcgravii ,	50	19	Hoo , (High-)	47	I
— Acangatara Brasiliën-			Horned Pie of Ethio-		
fiun Marcgravii ,	50	19	pia ,	61	4
— -Guainumbi ,	57	I	Humming Bird , (Green)	59	I
— -Guainumbi Brasiliën-			Hun , (Holtz-)	47	6
fibus Tupinambis ,	57	I	Hunter , (Emmet-)	46	I
— -Guainumbi Brasi-			Hydrocorax ,	61	
lienfibusTubinam-			—	61	I
bis Marcgravio ,	57	I	— Africanus ,	61	3
Gyllenrenna ,	47	13	— Indicus ,	61	4
Gzegzolka ,	50	I	— Philippensis ,	61	2
H.			— Senegalensis erythro-		
	G.	S.	rynchos ,	61	6
Hairy Wood-pecker ,	47	17	— Senegalensis melano-		
Halcedo major ,	58	I	rynchos ,	61	5

	I.	G.	S.	Ispida,	G.	S.
J Acamaciri,		48	1	—	58	1
— Brasiliensibus,		48	1	—	58	12
— Brasiliensium Marc-				—	60	1
gravii,		48	1	— Americana cœrulea,	58	16
— Marcgravii, Willugh-				— Americana viridis,	58	9
beji, (Picus Bra-				— apud Recentiores,	58	1
siliensis)		48	1	— Bengalensis,	58	2
Jacamar,		48		—	58	3
—		48	1	— Bengalensis major,	58	14
— à longue queue,		48	2	— Bengalensis minor,	58	3
Jaculator; Ardea Mexi-				— Bengalensis torquata,	58	15
canæ Species sin-				— Brasiliensis,	58	19
gularis,		47	8	— Brasiliensis cristata,	58	20
— cinereus,		47	21	— Brasiliensis nævia,	58	25
— micellâ rubrâ,		47	3	— Capitis Bonæ Spei,	58	8
Jaguacari guacu,		58	20	— Carolinensis cristata,	58	21
— guacu Brasiliensibus,		58	20	— Cayanensis,	58	10
— guacu Brasiliensibus				— cristata,	58	17
Marcgravii,		58	20	— Dominicanensis cristata,	58	22
— guacu Brasiliensibus				— ex albo & nigro varia,	58	24
Marcgravio,		58	20	— ex atro & albo varia,	58	24
— guacu Marcgravii,		58	20	— ex India allata,	59	2
Jajauquitototl,		57	2	— Indica,	58	4
Jamaica Parrot,		53	20	—	59	2
Jendaya,		53	91	— Indica cristata,	58	17
— quinta species,		53	91	— Indica torquata,	58	5
Jevolo,		60	1	— Madagascariensis,	58	18
Imben-Frafz,		60	1	— Madagascariensis cœ-		
— Wolff,		60	1	rulea,	58	12
Indian Bee-Eater,		60	8	— Mexicana cristata,	58	23
Indian King-Fisher,				— nostras,	58	1
(Little)		58	2	— Philippensis cristata,	58	6
—		58	3	— rostro albo,	58	16
— Wood-pecker, (Spot-				— rostro luteo,	58	6
red)		47	2	— Senegalensis,	58	7
Indianischer Vogel,		54	1	— Senegalensis major,	58	11
Ipecu,		47	9	— Sinyrnenfis,	58	13
— Brasiliensibus,		47	9	— Surinamensis, &c.	48	2
— dictus Marcgravii,				— Ternatana,	58	26
(Picus varius Bra-				Ispidæ affinis,	57	1
siliensis)		47	9	—	58	20

Ispidæ

xxxiii

	G. V. S.				G.	S.
Spidae genus quod ex India				King's-Fisher , (Ameri-		
adfertur , (Aliud)	59	2		can)	58	22
Juba Marcevii , (Tui				Klein Bundter-Specht ,	47	15
Apute)	53	68		Kleiner Bundter-Specht ,	47	15
— secunda species , (Tui				Kleinere Bunt-Specht ,	47	15
Apute)	53	68		Kockeueut ,	50	F
— (Tui Apute)	53	68		Kockock ,	50	F
— Tui , (Qui)	53	74		Kockuunt ,	50	F
Junger Kuckuck ,	50	I		Κόκυξ ,	50	F
Juruco ,	60	I		Κολαφος ,	47	
Ίουξ ,	46	I		Κολίος ,	47	F
Iyngi congener ,	46	A. I		Kouckouk ,	50	F
Iynx ,	46	I		Κερκενισης ,	47	
— Mortoni ,	46	I		Krae-Specht ,	47	6
Iuξ ,	46	I		Kraee , (Hol-)	47	6
	K.			— (Holtz-)	47	6
		G. S.		Krah-Specht ,	47	6
K Aath ,	50	I		Krahe , (Hol-)	47	6
Kakatoeha alba ,	53	9		— (Holtz-)	47	6
— Orientalis , &c. (Avis)	53	9		Kraoka , (Spill-)	47	6
— tota alba ,	53	8		— (Till-)	47	6
Kakatoes ,	53			Kretoglow ,	46	F
—	53	8		Kruriholowa ,	46	F
— à ailes & queue rouges ,	53	12		Kuckuck ,	50	F
— à hupe jaune ,	53	9		Kuckuck ,	50	F
— à hupe rouge ,	53	10		— (Junger)	50	F
— (Petit)	53	11		Kuckuk ,	50	F
Kararaoua ,	53	4		Kukawka ,	50	F
Κερίς ,	58	I		Kukkuck ,	50	F
Κυρύλος ,	58	I		Kukulká ,	50	F
Κένυξ ,	58	I				
Kiankia ,	53	46		L.		
Kilakil ,	53	41			G.	S.
King-Fisher ,	58	I		L Ang Schwantziger		
—	58	21		gelber Papegey ,	53	76
— Fisher , (Bengall)	58	15		Larger red - crested		
— Fisher , (Little Green				Wood-pecker ,	47	10
and orange-coloured)	58	9		Largest White - Bill		
— Fisher , (Little Indian)	58	2		Wood-pecker ,	47	9
—	58	3		Laurey ,	53	18
— Fisher , (Smyrna)	58	13		— (Perroquet du Brésil		
Kings-Fisher ,	58	I		appellé par les An-		
				glois)	53	18

	G.	S.		G.	S.
Least Green and Blue Parrakeet,	53	83	Lory à calotte noir, (Se-		
Lesser Green Parrot,	53	40	cond)	53	15
— Spotted Wood - pec-			— à collier des Indes,	53	18
ker,	47	15	— d'Amboine,	53	19
— Spotted Wood-Spice,	47	15	— de Ceram,	53	13
— Wood-pecker,	47	15	— des Indes Orientales,	53	15
Lloro,	53	23	— des Moluques,	53	14
Linaria Mexicana,	56	4	— des Philippines,	53	16
—	56	5	— du Brésil,	53	17
Little Green and orange-			— écarlate,	53	14
coloured King-			— écarlate à longue		
Fisher,	58	9	queue,	53	77
— Green Parrot,	53	23	— (First Black-capped)	53	16
— Indian King-Fisher,	58	2	— (Long-tailed Scarlet)	53	77
—	58	3	— Parrakeet,	53	73
— Red-headed Parra-			— Perruche,	53	73
keet,	53	85	— (Scarlet)	53	14
— Red-Winged Parra-			— (Second Black - cap-		
keet,	53	63	ped)	53	15
Loeri,	53	5	Lupo del l'Api,	60	1
— dictus, (Psittacus ca-					
pite nigro, &c.)	53	5			
— dictus, (Psittacus Ori-					
entalis exquisitus)	53	5			
Long Tail'd Parrakeet,	53				
— -tailed Green Parra-					
keet,	53	54			
— -tailed Parrot, (Small					
Green)	53	54			
— -tailed Scarlet Lory,	53	77			
Lorius,	53				
— Amboinensis,	53	19			
— Brasiliensis,	53	17			
— Ceramensis,	53	13			
— Moluccensis,	53	14			
— Orientalis Indicus,	53	15			
— Philippenfis,	53	16			
— torquatus Indicus,	53	18			
Lory,	53				
—	53	13			
— à calotte noir, (Pre-					
mier)	53	16			

M.

	G.	S.
M Acai species minor,		
(Maracana)	53	7
Macao,	53	1
—	53	2
—	53	4
—	53	7
— dictus, (Psittacus ma-		
jor diversicolor)	53	2
Macaos,	53	
Macaw from Jamaica,	53	2
Maccaw,	53	
—	53	1
—	53	2
— (Blew),	53	3
— (Blue and yellow)	53	4
— (Brazilian Green)	53	6
— dictus, (Psittacus ma-		
jor diversicolor)	53	2
— (Great)	53	3

	G.	S.		G.	S.
Maccaw, (Red and blue)	53	1	Mangeur d'Abeille des		
— (Small)	53	7	Indes, (Merops)	60	8
Main-Parrot,	53	36	Manucodiata altera spe-		
Maizi de Miacatorotl,	56	8	cies,	60	3
Maizy de Miacatorotl,			— capite albo, &c.	60	3
Brasilienſis, (Avis			— ſecunda Aldrovandi,	60	3
germinis)	56	8	Manucodiata ſecunda		
Man, (Old-)	50	4	ſpecies,	60	3
—	50	5	Maracana,	53	7
Manacus,	56	—	—	53	50
—	56	1	— altera Brasilienſibus		
— albâ fronte,	56	9	Marcgravii,	53	7
— albo-capillus,	56	3	— Araræ ſpecies minor,	53	7
— aurantius,	56	7	— Brasilienſibus (prima)	53	50
— auro-capillus,	56	4	— Brasilienſibus (prima)		
— criſtatus griſeus,	56	13	Marcgravii,	53	50
— criſtatus niger,	56	10	— Brasilienſibus (ſecun-		
— criſtatus ruber,	56	12	da)	53	7
— criſtatus rufus,	56	11	— Brasilienſibus (ſecun-		
— gutture albo,	56	2	da) Marcgravii,	53	7
— ruber,	56	6	— Macai ſpecies minor,	53	7
— rubro-capillus,	56	5	Martin-pêcheur,	58	
— torquatus,	56	8	—	58	1
Manakin,	56		— -pêcheur à collier de		
—	56	1	Bengale,	58	15
— à collier,	56	8	— -pêcheur à collier des		
— à front blanc,	56	9	Indes,	58	5
— à gorge blanche,	56	2	— -pêcheur à queue		
— à tête blanche,	56	3	d'Hirondelle,	48	2
— à tête d'or,	56	4	— -pêcheur blanc &		
— à tête rouge,	56	5	noir,	58	24
— (Black-capped)	56	1	— -pêcheur bleu d'Amé-		
— gris hupé,	56	13	rique,	58	16
— noir & jaune,	56	7	— -pêcheur bleu de Ma-		
— noir hupé,	56	10	dagaſcar,	58	12
— orangé,	56	7	— -pêcheur de Ben-		
— rouge,	56	6	gale,	58	2
— rouge hupé,	56	12	— -pêcheur de Bengale,		
— roux hupé,	56	11	(Grand)	58	14
— (White-capped)	56	3	— -pêcheur de Bengale		
(Petit)			(Petit)	58	3
Manaquin chaperonné de			—	58	15
blanc,	56	3	—	58	10
— chaperonné de noir,	56	1	— -pêcheur de Cayenne,	58	

	G.	S.		G.	S.
Martin-pêcheur de l'A-			Matuitui Brasiliensibus		
mérique, 58	22		Marcgravi, 58	25	
— -pêcheur de la Ri-			Melissophago Junii, 60	2	
viere de Gambia,			— Junio, 60	1	
(Grand) 58	12		Μελισσοφάγος, 60	1	
— -pêcheur de Mada-			Μελισσοφάγος, 60	1	
gascar, 58	13		Merle d'eau, 58	1	
— -pêcheur de Smyrne, 58	13		Merlo acquarolo, 58	1	
— -pêcheur de Terna-			Meropi affinis, 57	1	
te, 58	26		— cognata Avis, 60	2	
— -pêcheur des Indes, 58	4		— congener Aldrovandi, 60	2	
— -pêcheur des Indes,			Merops, 60	1	
(Petit) 58	2		— 60	2	
— 58	3		— alius, 60	2	
— -pêcheur du Brésil, 58	19		— alter, 60	2	
— -pêcheur du Cap de			— Aristoteli, 60	1	
Bonne Espérance, 58	8		— Brasiliensis, 60	4	
— -pêcheur du Sénégal, 58	7		— Charletonis, 60	1	
— -pêcheur du Sénégal,			— cinereus, 60	5	
(Grand) 58	11		— cinereus, &c. 60	2	
— -pêcheur hupé de la			— congener, 60	3	
Caroline, 58	21		— flavescens, 60	1	
— -pêcheur hupé de S.			— griseus, 60	3	
Domingue, 58	22		— (Guépier nommé) 60	1	
— -pêcheur hupé des In-			— Mangeur d'Abeille		
des, 58	17		des Indes, 60	8	
— -pêcheur hupé des			— pectore albicante, 60	1	
Philippines, 58	6		— pectore & alis coeru-		
— -pêcheur hupé du Bré-			lescentibus, &c. 60	1	
sil, 58	20		— ravus, 60	2	
— -pêcheur hupé du Me-			— simpliciter, 60	1	
xique, 58	23		Μέροψ, 60	1	
— -pêcheur tacheté du			Merula, 57	1	
Brésil, 58	25		Méfange noire à la tête		
— -pêcheur verd d'Amé-			dorée, 56	4	
rique, 58	9		Miacarototl, Brasiliensis,		
— -pêcheur vert & oran-			(Avis germinis		
ge, (Petit) 58	9		Maizy de) 56	8	
Martiner pêcheur, 58	1		— (Maizi de) 56	8	
Martino. pescatore, 58	1		Michalalactli, 58	23	
Martinus Piscator, 58	1		Middle - Sized parti-co-		
Matuitui, 58	25		loured Wood-pec-		
— Brasiliensibus, 58	25		ker, 47	23	

ALPHABETICUS.

xxxvij

	G.	S.		G.	S.
Mnieyfzy, (Dzieciol pstry)	47	15	Papa piexe Lusitanis,	58	20
Moineau de Guinée,	53	85	Papagão,	53	
— verd,	59	1	Papagall,	53	23
Momot,	57		Papagallo,	53	
—	57	1	—	53	49
— varié,	57	2	παπαγας,	53	
Momotus,	57		Papagay,	53	23
—	57	1	Papagayos verdes, &c.		
— varius,	57	2	de Oviedo,	53	27
Monedula tota nigra,	52	1	Papagey, (Greun-geeler)	53	55
— tota nigra, &c.	52	1	— (Grosse Weisse)	53	9
Monnier,	58	1	— (Rol-geelber.)	53	4
Monstrosa Avis,	54	1	— (Rott-Blaver)	53	2
Motmot,	57	1	Papegaut, (Grand)	53	49
Mucu Brasiliensibus			Papegay Grand,	53	49
Marcgravii, (A-			Papegey,	53	
tinga guacu)	50	20	— (Greuner)	53	54
N.			— (Lang Schwantziger		
Asutus Rhinoceros,	61	4	gelber)	53	76
— simpliciter,	54	1	Papegoya,	53	13
Nater halfz,	46	1	Papengey,	53	
— Wendel,	46	1	Pappagallo,	53	27
— Zwang,	46	1	Pappaulfek,	53	
Naywiekízy, (Dzieciol)	47	6	Pappengey,	53	
Noyra,	53	13	Papuga,	53	
O			Para, (Tui)	53	82
Ifeau appelléTocan,	54	4	— Tupinambis, septima		
— aquatique appor-			species, (Tui)	53	82
té des terres neuf-			— Tupinambis, (Tui)	53	82
ves,	54	9	Paradisiaca Orientalis,		
— couronné du Mexi-			&c. (Avis)	53	73
que,	50	24	— Ternatana, (Avis)	58	26
— des terres neufves,	54	9	Paragua,	53	17
— hupé du Mexique,	50	24	Parochino,	53	54
— Trompette,	61	3	Parrakeet,	53	
Old-Man,	50	4	— (Brown-throated)	53	62
—	50	5	— from East India, (Bra-		
P.			celet)	53	56
Ao, (Corta)	47	9	— (Golden-crowned)	53	61
Papa piexe,	58	20	— (Least Green and		
			Blue)	53	83
			— (Little Red-headed)	53	85
			— (Little Red-winged)	53	63

e ij

	G.	V.	S.		G.	S.
Parrakeet, (Long Tail'd)	53			Parrot, (Small Green		
— (Long-tailed Green)	53	54		Long-tailed)	53	54
— (Lory-)	53	73		— (White-Breasted)	53	42
— (Red and Blue-Hea-				— (White-crested)	53	8
ded)	53	62		— (White-Headed)	53	26
— (Red-breasted)	53	72		Parrots ,	53	
— (Rose-headed Ring)	53	66		Parti - coloured Wood-		
— (Yellow-faced)	53	68		pecker, (Middle-		
Parrat , (Great Flat-				Sized)	47	23
crown'd)	53	1		Parus auro-capillus ,	56	4
— (Red and yellow)	53	1		Paller cristatus, rostro ru-		
Parroket , (Green)	53	81		bro ,	56	12
Parroquet from Angola,	53	76		— in occipite cristatus ,		
Parrot,	53			&c.	56	13
— (Ash - colour'd and				— longirostrus Xochite-		
Red)	53	B. 49		nacatl dictus ,	54	3
— (Ash-coloured)	53	49		— toto corpore niger ,		
— (Blue-faced Green)	53	28		&c.	56	3
— (Brazilian Green)	53	30		Patirich Tirich ,	60	7
— (Common)	53	36		Paxaritos totos verdes de		
— (Cuba)	53	48		Oviedo ,	53	54
— (Dusky)	53	45		Pêcheur ,	58	1
— from Barbadoes ,				Pecker from Bengall ,		
(Green and yellow)	53	22		(Wood-)	47	2
— from China , (Green				— (Gold - Winged		
and Red)	53	39		Wood-)	47	28
— from the West-Indies,				— (Great Black Wood-)	47	6
(Great Green)	53	37		— (Great Spotted Wood-)	47	13
— (Guinea)	53	49		— (Greater Spotted		
— (Hawk-Headed)	53	43		Wood-)	47	13
— (Jamaica)	53	20		— (Green Wood-)	47	1
— (Lesser Green)	53	40		— (Hairy Wood-)	47	17
— (Little Green)	53	23		— (Larger red-crested		
— (Main-)	53	36		Wood-)	47	10
— of Carolina ,	53	67		— (Largest White-Bill		
— of Jamaica , (Com-				Wood-)	47	9
mon)	53	25		— (Lesser Black Wood-)	47	7
— of Paradise of Cu-				— (Lesser Spotted		
ba ,	53	48		Wood-)	47	15
— (Purple)	53	13		— (Lesser Wood-)	47	15
— (Rain-bow)	53	2		— (Middle-Sized parti-		
— (Red and blew)	53	2		coloured Wood-)	47	23
— (Red and White)	53	12		— of Jamaica, (Wood-)	47	23

ALPHABETICUS.

xxxix

	G.	S.		G. V. S.
Pecker , (Persian			Perroquet à tête bleue de	
Wood-) 47	5		la Guiane , 53.	28
— (Red-bellied Wood-) 47	23		— à tête bleue de la Mar-	
— (Red-headed Wood-) 47	19		tinique , 53	29
— (Smallest Spotted			— à tête bleue du Brésil, 53	21
Wood-) 47	18		— à tête de Faucon , 53	43
— (Spotted Indian			— à tête jaune de la Ja-	
Wood-) 47	2		maïque , 53	20
— (Three Toed Wood-) 47	20		— à tête rouge du Bré-	
— (Wood-) 47			sil , 53	24
— 47	23		— Amazone , 53	31
— (Yellow belly'd			— Amazone à bec varié, 53	34
Wood-) 47	24		— Amazone à front jau-	
πελέκας , 47			ne , 53	32.
Pepper-Pie , 54	1		— Amazone à gorge	
Perocheeto , 53	55		bleue , 53.	33
Perokeets , 53			— Amazone à gorge jau-	
Peroqueto , 53.			ne , 53	38
Perriche à collier noir , 53	55		— Amazone de la Jamaï-	
— -Arra , 53	7		que , 53	36
— commune , 53	93		— Amazone du Brésil , 53	35
— des Amazones , 53	67		— Amazone varié , 53	37
Perrique , 53	54		— Amazonne , 53	36
— de la Guadeloupe , 53	58		— bleu de la Guiane , 53	46
— du Brésil , 53	54		— brun , 53	51
Perrocchetto , 53	55		— brunâtre , 53	45
Perrochetto , 53	55		— cendré de Guinée , 53	49
Perroquet , 51	4		— cendré du Brésil , 53	50
— 53.			— couleur de Frefne , 53	9
— à collier des Indes			— d'Amérique , 53	40
Orientales , 53	56		— d'Angola , (Petit) 53	76
— à crête blanche , 53	9		— d'Orenock , 53	27
— à front rouge du Bré-			— de Bengale , (Petit) 53	66
sil , 53	30		— de Cayenne , 53	23
— à gorge rouge de la			— de Guinée , 53	A. 49.
Jamaïque , 53	25		— de Guinée à ailes rou-	
— à gorge rouge de la			ges , 53	A. 49.
Martinique , 53	27		— de Guinée varié de	
— à la longue queue , 53	54		rouge , 53	B. 49
— à poitrine blanche , 53	42		— de l'île de Luçon , 53	41
— à poitrine blanche du			— de la Caroline , 53	67
Mexique , 53	42		— de la Chine , 53	39
— à tête blanche , 53	26		— de la Dominique , 53	30

	G. V. S.			G.	S.
Perroquet de la Guadeloupe ,	53	44	Perruche ,	53	
— de la Guadeloupe ,	53	44	— à collier ,	53	54
— de la Jamaïque ,	53	2	— à collier à tête cou-	53	55
— de la Martinique ,	53	26	leur de rose ,	53	66
—	53	27	— à collier de l'Isle de		
— de la Nouvelle Es-			Bourbon ,	53	57
pagne ,	53	45	— à collier des Indes ,	53	56
— de la Riviere des			— à cul bleu du Brésil ,		
Amazones ,	53	36	(Petite)	53	83
— de Macao , (Femelle			— à estomach rouge ,	53	72
du)	53	3	— à front rouge du Bré-		
— de Macao , (Grand)	53	1	fil ,	53	62
— des Barbades ,	53	22	— à gorge brune ,	53	69
— du Brésil , appelé par			— à gorge jaune , (Pe-		
les Anglois Lau-			tite)	53	89
rey ,	53	18	— à l'aile rouge , (Pe-		
— du Paradis de Cuba ,	53	48	tite)	53	63
— grand ,	53	49	— à tête bleue ,	53	70
— jaune ,	53	47	— à tête jaune du Bré-		
—	53	74	fil , (Petite)	53	90
— jaune de Cuba ,	53	48	— à tête rouge de Gin-		
— Indien verd & rouge ,			gi ,	53	65
de la plus petite			— à tête rouge du Brésil ,		
espece ,	53	86	(Petite)	53	82
— Mascarin ,	53	52	— à tête rouge & bleue ,	53	62
— noir de Madagascar ,	53	53	— à tête rouge , (Petite)	53	85
— rouge & cendré ,	53	B. 49	— brune du Brésil , (Pe-		
— rouge & vert de la			tite)	53	93
Chine ,	53	39	— couronnée d'or ,	53	61
— varié des Indes ,	53	43	— de Bengale ,	53	66
— verd ,	53	54	— de Cayenne ,	53	60
— verd à la queue lon-			— de Gingi ,	53	64
gue , (Petit)	53	54	— de Guinée , (Petite)	53	85
— verd des Indes Occi-			— de la Caroline ,	53	67
dentales , (Grand)	53	37	— de la Guadeloupe ,	53	58
— verd des Indes Orien-			— de la Guiane ,	53	59
tales , (Petit)	53	85	— de la Martinique ,	53	69
— verd du Brésil ,	53	30	— de Madagascar , (Pe-		
— verd facé de bleu ,	53	28	tite)	53	88
— verd , (Petit)	53	23	— de Malaca , (Petite)	53	84
— verd , (Plus petit)	53	40	— des Indes ,	53	63
— violet ,	53	46	— des Indes , (Petite)	53	86

ALPHABETICUS.

G. S.

xlj

	G.	S.		G.	S.
Perruche des Philippines,			Petit Martin - pêcheur		
(Petite)	53	87	vert & orange,	58	9
— du Brésil,	53	61	— Perroquet d'Angola,	53	76
— du Brésil, (Petite)	53	81	— Perroquet de Benga-		
— du Japon,	53	71	le,	53	66
— du Sénégal, (Petite)	53	92	— Perroquet verd,	53	23
— facée de jaune,	53	68	— Perroquet verd à la		
— hupée du Mexique,			queue longue,	53	54
(Petite)	53	95	— Perroquet verd des		
— hupée, (Petite)	53	94	Indes Orientales,	53	85
— jaune d'Angola,	53	76	— Perroquet verd, (Plus)	53	40
— jaune du Brésil,	53	74	— Pic de Cayenne,	47	32
— jaune du Brésil, (Pe-			— Pic de S. Domingue,	47	29
tite)	53	91	— Pic rayé de S. Do-		
— jaune du Mexique,	53	75	mingue,	47	26
— Illinoise,	53	68	— Pic varié,	47	15
— (Lory)	53	73	— Pic varié de Virginie,	47	18
— (Petite)	53		— Pic varié du Mexique,	47	22
— rouge d'Amboine,	53	79	— Piverd bigarré,	47	15
— rouge de Borneo,	53	77	— Piverd tacheté,	47	18
— rouge des Indes,	53	78	Petite Perruche,	53	
— rouge hupée de Java,	53	80	— Perruche à cul bleu		
— variée d'Amboine,	53	72	du Brésil,	53	83
— variée des Indes,	53	73	— Perruche à gorge jau-		
— verte à longue queue,	53	54	ne,	53	89
Perruches, verte & bleue,			— Perruche à l'aîle rou-		
(Plus petite des)	53	83	ge,	53	63
Persian Wood-pecker,	47	5	— Perruche à tête jaune		
Pescatore,	58	1	du Brésil,	53	90
— del Re,	58	1	— Perruche à tête rou-		
Petit Coucou de Cayen-			ge,	53	85
ne,	50	9	— Perruche à tête rouge		
— Grimpereau bigarré,	47	15	du Brésil,	53	82
— Grimpereau noir,	47	7	— Perruche brune du		
— Guépier des Philippi-			Brésil,	53	93
nes,	60	10	— Perruche de Guinée,	53	85
— Kakatoes,	53	11	— Perruche de Mada-		
— Martin - pêcheur de			gascar,	53	88
Bengale,	58	3	— Perruche de Malaca,	53	84
—	58	15	— Perruche des Indes,	53	86
— Martin - pêcheur des			— Perruche des Philip-		
Indes,	58	2	pines,	53	87
—	58	3	— Perruche du Brésil,	53	81

f

	G.	S.		G.	S.
Petite Perruche du Séné-			Pic rouge ,	47	14
gal ,	53	92	— varié ,	47	14
— Perruche hupée ,	53	94	— varié de Canada ,	47	16
— Perruche hupée du			— varié de Cayenne ,	47	20
Mexique ,	53	95	— varié de la Caroline ,	47	24
— Perruche jaune du			— varié de la Jamaïque ,	47	23
Brésil ,	53	91	— varié de Virginie ,	47	17
Pfeffer-Fraciz ,	54	1	— varié de Virginie , (Pe-		
— Fraciz ,	54	1	tit)	47	18
— Vogel ,	54	1	— varié du Mexique ,		
— <i>maculatus</i> ,	58	1	(Grand)	47	21
— <i>curtaxis</i> ,	53		— varié du Mexique ,		
Piannet ,	47	15	(Petit)	47	22
Pic ,	47		— varié , (Grand)	47	13
—	47	1	— varié hupé d'Améri-		
— à tête rouge de Vir-			que ,	47	12
ginie ,	47	19	— varié , (Petit)	47	15
— blanc de Cayenne ,	47	31	— verd ,	47	1
— de Cayenne , (Petit)	47	32	— verd de Bengale ,	47	2
— de la première gran-			— verd de Norvege ,	47	4
deur au bec blanc ,	47	9	— verd du Mexique ,	47	3
— de S. Domingue , (Pe-			— verd jaulne ,	47	1
tit)	47	29	— verd rouge nommé en		
— du Cap de Bonne Es-			françois Epeiche ,	47	14
pérance ,	47	30	— vert racheté des In-		
— jaulne ,	47	1	des ,	47	2
— jaune de Perse ,	47	5	— -vert tête grise ,	47	4
— mart ,	47	1	Pica Antillana ,	50	4
— noir ,	47	6	— Brasilica ,	54	1
— noir de la Nouvelle			— Brasilica Aldrovandi ,	54	1
Angleterre ,	47	7	— Brasilica alia ,	54	12
— noir du Mexique ,	47	8	— Brasilica Gesneri ,	54	1
— noir hupé de Cayen-			— Brasiliensis ,	54	1
ne ,	47	11	—	60	4
— noir hupé de la Ca-			— Brasiliensis , uropygio		
roline ,	47	9	coccineo ,	54	1
— noir hupé de Virgi-			— Brasilica ,	54	1
nie ,	47	10	— Brasilica secunda ,	54	12
— rayé de Canada ,	47	28	— Mexicana ,	47	21
— rayé de Cayenne ,	47	27	— Mexicana alia ,	47	21
— rayé de S. Domingue ,	47	25	— minor , &c.	54	10
— rayé de S. Domingue ,			— nigra Jamaicensis ,		
(Petit)	47	26	&c.	52	1

ALPHABETICUS.

	G.	S.		G.	S.
Pica Ternatana,	58	26	Picus capite, colloque		
— Xochitenacatl dic-			rubris,	47	19
ta,	54	12	— Capitis Bonæ Spei,	47	30
Picæ Brasiliæ species,	54	11	— Cayanensis albus,	47	31
Picchio,	47		— Cayanensis minor,	47	32
—	47	1	— Cayanensis striatus,	47	27
—	47	6	— discolor,	47	13
Picciaferro,	60	1	— discolor minor,	47	15
Pichio,	47	1	— Dominicanensis minor,	47	29
Piciciti,	56	12	— Dominicanensis striatus,	47	25
— Brasiliensis, minima,			— Dominicanensis striatus		
cristata, (Avis)	56	12	minor,	47	26
Picis congener,	51	4	— formicarius,	47	6
— congener, Curucui			— formicarius Schwenck-		
Brasiliensibus dic-			feldii,	47	6
tus Marcgravii,	51	4	— Graminis,	47	15
Pico,	47		— Imbricatus,	47	9
—	47	1	— Imbricatus Nierem-		
—	47	6	bergii,	47	9
— verde,	47	1	— luteus cyanopus Per-		
Picot vermell,	47	13	sicus,	47	5
— vert,	47	1	— luteus cyanopus,	47	5
Picumart,	47	1	— luteus cyanopus Per-		
Picupio,	58	1	sicus Aldrovandi,	47	5
Picus,	47		— luteus Persicus,	47	5
—	47	1	— major,	47	14
— albo nigroque varie-			— major canescens, Plu-		
gatus, &c.	47	13	viæ Avis dictus,	50	4
— albo nigroque varius,			— major canescens, Se-		
&c.	47	14	nex dictus,	50	4
—	47	15	— major leucophæus,		
— alius canescens, Senex			Pluviæ Avis dic-		
dictus, &c.	50	5	tus,	50	4
— alius minor,	47	15	— major leucophæus,		
— Americanus,	54	3	Senex dictus,	50	4
— Americanus niger,			— Marinus,	58	1
cristâ coccineâ,	47	10	— Martius,	47	1
— arborarius,	47	1	— Martius Festo,	47	1
— arborarius, Plinio,	47	1	— Martius major Bello-		
— Brasiliensis, Jacama-			nio,	47	1
ciri Marcgravii,			— maximus,	47	6
Willughbeji,	48	1	— maximus Gesneri,	47	6
— Canadensis striatus,	47	28	— maximus niger,	47	6

	G.	S.		G.	S.
Picus maximus niger Al-			Picus varius major ;	47	14
drovandi ,	47	6	— varius major Sch-		
— medius Eberi ,	47	1	wenckfeldii ,	47	14
— medius Peuceri ,	47	1	— varius medius ,	47	23
— niger ,	47	6	— varius medius Jamai-		
— niger , &c.	47	9	censis ,	47	23
—	47	10	— varius Mexicanus ma-		
—	47	13	jor ,	47	21
— niger Carolinensis			— varius Mexicanus mi-		
cristatus ,	47	9	nor ,	47	22
— niger Cayanensis cris-			— varius minimus ,	47	15
tatus ,	47	11	—	47	18
— niger cristâ coccineâ ,	47	10	— varius minor ,	47	15
— niger maximus ,	47	6	— varius minor Sch-		
— niger , maximus nos-			wenckfeldii ,	47	15
tras ,	47	6	— varius minor , ventre		
— niger Mexicanus ,	47	8	luteo ,	47	24
— niger minimus ,	47	7	— varius tertius ,	47	15
— niger Novæ Angliæ ,	47	7	— varius Virginianus ,	47	17
— niger Schwenckfeldii ,	47	6	— varius Virginianus mi-		
— niger , vertice cocci-			nor ,	47	18
neo ,	47	6	— ventre rubro ,	47	23
— niger Virginianus cris-			— villosus medius ,	47	17
tatus ,	47	10	— Virginianus Erythro-		
— pedibus tridactylis ,	47	20	cephalos ,	47	19
— pullus , &c.	47	23	— viridis ,	47	1
— Torquilla ,	46	1	— viridis , &c.	47	4
— totus niger ,	47	6	— viridis Bengalensis ,	47	2
— varius ,	47	14	— viridis Jonstoni ,	47	1
— varius , albo nigroque			— viridis major ,	47	1
distinctus ,	47	14	— viridis Mexicanus ,	47	3
— varius Americanus			— viridis Norvegicus ,	47	4
cristatus ,	47	12	— viridis nostras ,	47	1
— varius Benghalensis ,	47	2	— viridis vertice cocci-		
— varius Brasiliensis			neo ,	47	1
Ipecu dictus			Pie ,	50	4
Marcgravii ,	47	9	— du Brésil ,	54	1
— varius Canadensis ,	47	16	—	54	3
— varius Carolinensis ,	47	24	— (French-)	47	14
— varius Cayanensis ,	47	20	— of Brasilia , (Great		
— varius ex albo & nigro ,	47	14	beakt)	54	1
— varius Jamaicensis ,	47	23	— of Ethiopia , (Hor-		
— varius major ,	47	13	ned)	61	4

	G.	S.		G.	S.
Pie, (Pepper)	54	1	Pluviæ Avis dictus, (Pi-		
Piexe, Lusitanis, (Papa)	58	20	cus major leuco-		
— (Papa)	58	20	phæus;)	50	4
Pigot,	47	13	Poppingey,	53	
Pigozo,	47	1	Poppinjay,	53	
—	47	14	Poppinjays,	53	
Piombino,	58	1	Premier Lory à calotte		
Piperivora,	54	1	noir,	53	16
— nigra, uropygio lu-			Psittaca,	53	
teo,	54	5	—	53	54
— nonnullis, (Avis)	54	1	— Amboinenfis cocci-		
Pipo,	47	14	nea,	53	79
—	47	15	— Amboinenfis varia,	53	72
Pipra,	47	14	— Angolenfis lutea,	53	76
—	47	15	— Aquarum Lupiarum		
πίπρῶς,	47	14	Insulæ,	53	58
— Aristotelis;	47	13	— Bengalensis,	53	66
Piscator Regis,	58	1	— Borbonica torquata,	53	57
— (Regis).	58	1	— Brasiliensis,	53	61
Piscium vibratrix, (Avis)	58	23	— Brasiliensis fronte ru-		
— voratrix,	58	23	brâ,	53	62
Piverd,	47	1	— Brasiliensis lutea,	53	74
— à tête rouge,	47	19	— Carolinenfis,	53	67
— à tête rouge, (Grand)	47	10	— Cayanensis,	53	60
— à trois onglers,	47	20	— coccinea Bonarum		
— à ventre rouge,	47	23	Fortunarum Insu-		
— au ventre jaune,	47	24	læ,	53	77
— aux ailes d'or, (Grand)	47	28	— cyanocephalos,	53	70
— bigarré, (Grand)	47	13	— Ginginiana,	53	64
— bigarré, (Petit)	47	15	— Ginginiana erythro-		
— tacheté, (Petit)	47	18	cephalos,	53	65
— velu,	47	17	— Guianensis,	53	59
Pivert de la Jamaïque,	47	23	— Japonensis,	53	71
Plumbino,	58	1	— Javensis cristata coc-		
Plus petit Perroquet			cinea,	53	80
verd,	53	40	— Illiniaca,	53	68
— petite des Perruches,			— Indica,	53	63
verte & bleue,	53	83	— Indica coccinea,	53	78
Pluviæ Avis,	50	4	— Indica torquata,	53	56
— Avis alia canescens,			— Indica varia,	53	73
Senex dicta, &c.	50	5	— Martinicana,	53	69
— Avis dictus, (Picus			— Mexicana lutea,	53	75
major canescens;)	50	4	— torquata,	53	55

	G.	S.		G.	S.
<i>Psittaci majoris Marc-</i>			<i>Psittacula Brasiliensis fus-</i>		
<i>gravi prima spe-</i>			<i>ca,</i>	53	93
<i>cies,</i>	53	31	— <i>Brasiliensis Icteroce-</i>		
— <i>majoris Marcgravii</i>			<i>phalos,</i>	53	90
<i>secunda species,</i>	53	37	— <i>Brasiliensis lutea,</i>	53	91
— <i>majoris Marcgravii</i>			— <i>Brasiliensis uropygio</i>		
<i>tertia species,</i>	53	21	<i>cyaneo,</i>	53	83
— <i>mediæ magnitudinis</i>			— <i>cristata,</i>	53	94
<i>Marcgravii prima</i>			— <i>Guineensis,</i>	53	85
<i>species,</i>	53	31	— <i>guttur luteo,</i>	53	89
— <i>mediæ magnitudinis</i>			— <i>Indica,</i>	53	86
<i>Marcgravii secun-</i>			— <i>Madagascariensis,</i>	53	88
<i>da species,</i>	53	37	— <i>Malaccensis,</i>	53	84
— <i>mediæ magnitudinis</i>			— <i>Mexicana cristata,</i>	53	95
<i>Marcgravii tertia</i>			— <i>Philippensis,</i>	53	87
<i>species,</i>	53	21	— <i>Senegalensis,</i>	53	92
— <i>Mexicani species, (A-</i>			<i>Psittacus,</i>	53	
<i>vis cocho,)</i>	53	75	— <i>albus cristatus,</i>	53	8
— <i>minoris Marcgravii</i>			— <i>albus cristatus Aldro-</i>		
<i>prima species,</i>	53	54	<i>vandi,</i>	53	8
— <i>minoris Marcgravii</i>			— <i>albus Galeritus,</i>	53	9
<i>quarta species,</i>	53	90	— <i>alter Aldrovandi,</i>	53	1
— <i>minoris Marcgravii</i>			— <i>Amazonicus,</i>	53	31
<i>quinta species,</i>	53	91	— <i>Amazonicus Brasi-</i>		
— <i>minoris Marcgravii</i>			<i>liensis,</i>	53	35
<i>secunda species,</i>	53	68	— <i>Amazonicus fronte</i>		
— <i>minoris Marcgravii</i>			<i>luteâ,</i>	53	32
<i>septima species,</i>	53	82	— <i>Amazonicus gutture</i>		
— <i>minoris Marcgravii</i>			<i>cœruleo,</i>	53	33
<i>sexta species,</i>	53	83	— <i>Amazonicus gutture</i>		
— <i>minoris Marcgravii</i>			<i>luteo,</i>	53	38
<i>tertia species,</i>	53	81	— <i>Amazonicus Jamai-</i>		
— <i>prima species,</i>	53	31	<i>censis,</i>	53	36
— <i>secunda species,</i>	53	37	— <i>Amazonicus poikilo-</i>		
— <i>species, Mexicana,</i>			<i>rynchos,</i>	53	34
<i>vario colore, (A-</i>			— <i>Amazonicus varius,</i>	53	37
<i>vis de cocho,)</i>	53	95	— <i>Americanus,</i>	53	40
— <i>tertia species,</i>	53	21	— <i>Aquarum Lupiarum</i>		
<i>Psittaco congener,</i>	52	1	<i>Insulæ,</i>	53	44
<i>Psittacula,</i>	53		— <i>Barbadensis,</i>	53	22
— <i>Brasiliensis,</i>	53	81	— <i>Brasiliensis cinereus,</i>	53	50
— <i>Brasiliensis erythroce-</i>			— <i>Brasiliensis cyanoce-</i>		
<i>phalos,</i>	53	82	<i>phalos,</i>	53	21

ALPHABETICUS.

xlvij

G. S.		G. V. S.	
Pſittacus Braſilienſis erythrocephalus,	53 24	Pſittacus Erythrochlorus macrourus,	53 71
— Braſilienſis fronte rubra,	53 30	— Erythrochlorus torquatus criſtatus,	53 94
— capite cœruleo,	53 2	— Erythrocyanos,	53 46
— capite cyaneo, &c.	53 18	— Erythrocyanus,	53 2
— capite luteo, &c.	53 67	— Erythrocyanus Aldrovandi,	53 46
— capite nigro, &c.			
Loeri dictus,	53 5		
— Caroliniſis,	53 67	— Erythrocyanus Ornithologi,	53 2
— caudâ cuneiformi, &c.	53 2	— Erythroleucos,	53 12
— Cayanenſis,	53 23	— Erythroleucos Aldrovandi,	53 12
— cinereus,	53 49	— Erythroleucus,	53 12
— cinereus Aldrovandi,	53 49	— Erythroxanthus,	53 1
— cinereus caudâ rubra,	53 49	— Erythroxantus,	53 1
— cinereus cum cauda rubra,	53 49	— Erythroxantus Ornithologi,	53 1
— cinereus Jonſtoni,	53 49	— ex nigro cœruleus, &c.	53 53
— coccineus, &c.	53 13	— flammeus, &c.	51 4
— coccineus Orientalis, &c.	53 13	— fufcus,	53 51
— cœruleo luteus,	53 3	— Guianenſis cœruleus,	53 46
— collo rubro, &c.	53 95	— Guianenſis cyanocephalus,	53 28
— croceus, &c.	53 76	— Guineenſis alis rubris,	53 A. 49
— cyanocroceus,	53 4	— Guineenſis cinereus,	53 49
— elegans,	53 43	— Guineenſis rubro varius,	53 B. 49
— elegans Cluſii,	53 43	— Jamaicenſis gutture rubro,	53 25
— Erythrochloros criſtatus,	53 94	— Jamaicenſis icterocephalus,	53 20
— Erythrochloros criſtatus Aldrovandi,	53 94	— leucocephalus,	53 27
— Erythrochlorus macrourus,	53 71	— leucocephalus Aldrovandi,	53 27
— Erythrochlorus macrourus Aldrovandi,	53 71	— Lucionenſis,	53 41
— Erythrochlorus macrourus Japonicus Aldrovandi,	53 71	— luteus,	53 47
		— luteus, caudâ longâ,	53 76
		— luteus Inſulæ Cubæ,	53 48

	G.	S.		G.	S.
<i>Psittacus Madagascariensis niger</i> ,	53	53	<i>Psittacus Mexicanus pectorato albo</i> ,	53	42
— <i>major</i> ,	53	27	— <i>minimus</i> ,	53	85
— <i>major albicans</i> , &c.	53	27	— <i>minimus totus viridis</i> ,	53	81
— <i>major diversicolor</i> ,			— <i>minimus viridis</i> , &c.	53	85
— <i>Macao dictus</i> ,	53	2	— <i>minor</i> ,	53	55
— <i>major diversicolor</i> ,			— <i>minor</i> , &c.	53	7
— <i>Maccaw dictus</i> ,	53	2	—	53	25
— <i>major violaceus</i> ,	53	46	—	53	67
— <i>major</i> , <i>viridis</i> , &c.	53	36	— <i>minor Americanus</i>		
—	53	37	— <i>versicolor</i> ,	53	85
— <i>major vulgaris prasinus</i> ,	53	23	— <i>minor macrourus</i> ,	53	55
— <i>marinus</i> ,	53	84	— <i>minor macrourus</i> , &c.	53	54
— <i>Martinicanus</i> ,	53	26	— <i>minor macrourus</i> ,		
— <i>Martinicanus cyanocephalus</i> ,	53	29	— &c.	53	54
— <i>Martinicanus gutturerubro</i> ,	53	27	— <i>minor viridis</i> , &c.	53	54
— <i>Mascarinus</i> ,	53	52	—	53	68
— <i>maximus</i> ,	53	4	— <i>minor vulgaris</i> ,	53	93
— <i>maximus</i> , &c.	53	2	— <i>Novæ Hispaniæ</i> ,	53	45
—	53	3	— <i>Orientalis exquisitus</i> ,		
— <i>maximus alter</i> ,	53	1	— <i>Loeri dictus</i> ,	53	5
— <i>maximus alter</i> , &c.	53	1	— <i>Paradisi ex Cuba</i> ,	53	48
— <i>maximus alter Aldrovandi</i> ,	53	1	— <i>parvus</i> ,	53	80
— <i>maximus alter Jonstoni</i> ,	53	4	— <i>parvus Bontii</i> ,	53	80
— <i>maximus cyanocroceus</i> ,	53	4	— <i>poikilorhynchus Aldrovandi</i> ,	53	34
— <i>maximus cyanocroceus Aldrovandi</i> ,	53	4	— <i>poikilorhynchus</i> ,	53	34
— <i>maximus cyanocroceus Jonstoni</i> ,	53	4	— <i>pumilio</i> , &c.	53	54
— <i>maximus Marcgravii</i> ,	53	2	— <i>pumilio</i> , <i>viridis</i> , &c.	53	67
— <i>mediæ magnitudinis</i> ,	53	36	— <i>puniceus</i> ,	53	1
— <i>medio minor</i> , &c.	53	48	— <i>purpureus</i> ,	53	13
— <i>medius</i> , &c.	53	49	— <i>puffillus viridis Æthiopicus Clusii</i> ,	53	85
— <i>medius viridis</i> , &c.	53	20	— <i>ruber</i> , &c.	53	13
—	53	36	— <i>rufus</i> , &c.	53	13
— <i>melanorinchus</i> ,	53	20	—	53	15
— <i>melanorinchus</i> ,	53	20	— <i>Sinenfis</i> ,	53	39
			— <i>sub mento niger</i> , &c.	53	66
			— <i>subcæruleus</i> ,	53	49
			— <i>subcæruleus Aldrovandi</i> ,	53	49
			— <i>subtus flavescens</i> , &c.	53	23
			— <i>torquatus</i> , &c.	53	54

Psittacus

ALPHABETICUS.

		G. S.				G. S.	
Pittacus torquatus macrouros Antiquorum,	53	55		Pyrrhocorax,	58	26	
— torquatus macrouros Antiquorum Aldrovandi,	53	55		— Agricolæ,	47	6	
— torquatus macrouros,	53	55			Q.		
— torquatus minor, macrourus Jonstoni,	53	55		Q Uapachtototl,	50	6	
— varius Indicus,	53	43		Q Quatotomomi,	47	9	
— versicolor,	53	46		Q Quauhchochopitli,	47	22	
— versicolor Aldrovandi,	53	46		Q Quauhcului,	60	5	
— vertice viridi, &c.	53	4		— dicta, &c. (Avicula de)	60	5	
— violaceus,	53	46		Q Quaxoxotototl,	51	6	
— viridis,	53	36		Q Queue de Rat,	54	10	
— viridis, &c.	53	27		Q Qui Juba Tui,	53	74	
—	53	31			R.		
—	53	36		R Ain-Bird,	50	4	
—	53	38		—	50	5	
—	53	55		— bow Parrot,	53	2	
—	53	68		— Fowl,	47	1	
—	53	38		Ramphastos,	54	1	
— viridis alius, &c.	53	38		Rat, (Queue de)	54	10	
— viridis, capite fulvo, &c.	53	67		Red and Blue-Headed Parrakeet,	53	62	
— viridis, capite luteo, &c.	53	67		— and blue Maccaw,	53	1	
— viridis & luteus, &c.	53	22		— and blew Parrot,	53	2	
— viridis major, &c.	53	37		— and white Parrot,	53	12	
— viridis melanorhynchus Aldrovandi,	53	20		— and yellow Parrat,	53	1	
— viridismelanorinchos,	53	20		— -beaked Toucan,	54	4	
— viridis melanorinchos Jonstoni,	53	20		— -bellied Wood-pec-	47	23	
— viridis minimus, &c.	53	85		ker,	53	72	
— viridis minor,	53	54		— -breasted Parrakeet,	47	10	
ῥιττακη,	53			— -crested Wood-pec-	53	85	
ῥιττακος,	53			ker, (Larger)	47		
ῥιττακος Ποικίλος,	53	2		— -headed Parrakeet,	53		
Pstry mnieyszy, (Dzieciol)	47	15		(Little)	47		
— wiekszy, (Dzieciol)	47	14		— -headed Wood-pec-	47	19	
Purple Parrot,	53	13		ker,	53	63	
				— -Winged Parrakeet,	50	24	
				(Little)	58	1	
				Regia Avis,	61	4	
				Regis Piscator,			
				Rhinoceros,			
					G		

	G.	S.			
Specht, (Elfter-)	47	14		T.	
— (Gefpregleter-)	47	14			G. S.
— (Grafe-)	47	1	T Acataca;	54	1
— (Grafs-)	47	15	Tait-Sou;	50	26
— (Greun-)	47	1	Tangara,	56	5
— (Groffer)	47	6	—	56	10
— (Grun-)	47	1	— Brasiliensibus secunda		
— (Klein Bundter-)	47	15	species Marcgra-		
— (Kleiner Bundter-)	47	15	vii,	56	5
— (Kleinere Bunt-)	47	15	Tangaræ alia species,	56	5
— (Krae-)	47	6	— secunda species Brafi-		
— (Krah-)	47	6	liensibus,	56	5
— (Schwartz)	47	6	Tarabe,	53	24
— (Schwartz)	47	6	— Brasiliensibus,	53	24
— (Weis-)	47	14	Tartarin,	58	1
— (Wyfs-)	47	14	Tauha,	53	23
Spechtle,	47	15	Tercot,	46	1
Species Dryocolaptæ,			Tercou,	46	1
Aristoteli, (Ter-			Tertia species Dryocolap-		
ria)	47	6	tæ, Aristoteli,	47	6
— singularis, (Ardeæ			Three Toed Wood-pec-		
Mexicanæ)	47	8	ker,	47	20
— singularis, (Jacula-			Tida, (Gioek-)	46	1
tor; Ardeæ Mexi-			Tije-guacu,	56	10
canæ)	47	8	— guacu Brasiliensibus,	56	10
Spicht,	47		— guacu Brasiliensibus		
Spik, (Groen-)	47	1	Marcgravii,	56	10
Spill-kraoka,	47	6	Till-kraoka,	47	6
Spite, (Green-Wood-)	47	1	Tirica tertia species,		
— (Lefser Spotted			(Tui)	53	81
Wood-)	47	15	— (Tui)	53	81
Spotted Indian Wood-			Tirich, (Patirich)	60	7
pecker,	47	2	Tit, (Tom-)	59	1
— Wood-pecker, (Great)	47	13	Tocan, (Oiseau appellé)	54	4
— Wood-pecker, (Grea-			Todier,	59	
ter)	47	13	—	59	1
— Wood-pecker, (Lef-			— varié,	59	2
ser)	47	15	Todus,	59	
— Wood-pecker, (Smal-			—	59	1
lest)	47	18	— varius,	59	2
— Wood-Spite, (Lefser)	47	15	— viridis, &c.	59	1
Stortocollo,	46	1	Tohorkey,	58	6
Sylvia gulâ phœniceâ,	59	1	Tom-tit,	59	

	G.	V.	S.		G.	S.
Topau,	61	4		Touraco,	50	24
Torcol,	46			Traee-halſs,	46	1
—	46	1		Tragopan,	61	4
— rayé,	46	A. 1		Tragopanda Plinii,	61	4
Torcot,	46	1		Tray-halſs,	46	1
Torcou,	46	1		Trogon,	50	19
Torquilla,	46			—	51	
—	46	1		—	51	4
— Gazæ;	46	1		— Braſilienſis viridis,	51	4
— Gefneri,	46	1		— Cayanenſis cinereus,	51	1
— (Picus)	46	1		— Cayanenſis viridis,	51	2
— ſtriata,	46	A. 1		— Cayanenſis viridis		
Tortocollo,	46	1		ventre candido,	51	3
Torxicuello,	46	1		— Mexicanus,	51	5
Torzicuello,	46	1		— Mexicanus varius,	51	6
Toucan,	54			Trompette de Brac,	61	3
—	54	1		— (Oifeau)	61	3
—	54	5		Tucana,	54	
— à bec rouge,	54	4		—	54	1
— à collier de Cayen-				—	54	5
ne,	54	10		— Braſilienſibus,	54	5
— à collier du Mexique,	54	6		— Braſilienſis gutture al-		
— à gorge blanche de				bo,	54	3
Cayenne,	54	4		— Braſilienſis gutture lu-		
— à gorge blanche du				teo,	54	5
Bréſil,	54	3		— Braſilienſis viridis,	54	9
— à gorge jaune de				— Cayanenſis gutture		
Cayenne,	54	2		albo,	54	4
— à gorge jaune du Bré-				— Cayanenſis gutture lu-		
ſil,	54	5		teo,	54	2
— bleu,	54	12		— Cayanenſis torquata,	54	10
— Braſilienſibus,	54	5		— Cayanenſis viridis,	54	8
— du Bréſil,	54	3		— cœrulea,	54	12
— jaune,	54	1		— lutea,	54	11
— (Red-beaked)	54	4		— Mexicana torquata,	54	6
— (Tucana quam Le-				— Mexicana viridis,	54	7
rius & Thevetus				— quam Leriſ & The-		
vocant)	54	5		vetus vocant Tou-		
— verd de Cayenne,	54	8		can,	54	5
— verd du Bréſil,	54	9		Tucanæ ſpecies,	54	11
— verd du Mexique,	54	7		Tui,	53	
Toukan,	54	1		—	53	54
Toulou,	50	16		— Apute Juba,	53	68

ALPHABETICUS.

	G. S.			G. S.	
Tui Aputē Juba Marc-			Virio,	47	I
gravii,	53	68	Vitriolo,	58	I
— Apute Juba secunda			Vogel, (Eifs-)	58	I
species,	53	68	— (Eys-)	58	I
— Brasiliensibus prima			— (Eysz-)	58	I
species,	53	54	— (Indianischer)	54	I
— para,	53	82	— (Pfeffer-)	54	I
— para Tupinambis,	53	82	— (Yfs-)	58	I
— para Tupinambis sep-			Voratrix, (Piscium)	58	23
tima species,	53	82	Vouroug-driou,	50	28
— prima species,	53	54	Upupa Americana, cro-		
— quarta species,	53	90	cea, saxatilis,	55	I
— (Qui Juba)	53	74	— crocea,	55	I
— species secunda,	53	68	Waffer Heunlin,	58	I
— tirica,	53	81	Wedknarr,	47	I
— tirica tertia species,	53	81	Weis-Specht,	47	14
Tuiete,	53	83	Weisse Papagey, (Grof-		
— sexta species,	53	83	se)	53	9
Tuin,	53	81	Wende-hals,	46	I
Turbo,	46	I	Wendel, (Nater-)	46	I
Turcot,	46	I	White - Bill Wood - pec-		
Tyta, (Gjoek-)	46	I	ker, (Largest)	47	9
Tzanatl, (Avis conge-			— Breasted Parrot,	53	42
ner)	51	5	— capped Manakin,	56	3
— (Avis similis)	51	5	— crested Parrot,	53	8
Tzanatl tototl,	51	5	— Headed Parrot,	53	26
— Hernandezii,	51	5	Wiekfzy, (Dzieciol pstry)	47	14
Tzinitzcan,	51	4	Wind-hals,	46	I
Tzinitzian,	51	4	— halfz,	46	I
V.			Witwal,	47	13
	G.	S.	Wolf, (Bienen-)	60	I
Uccello del Paradiso,	58	I	— (Gelber Bienen-)	60	I
— della Madonna,	58	I	Wolff, (Imben-)	60	I
— di fanta Maria,	58	I	Wood-pecker,	47	
— pescatore,	58	I	—	47	23
Ventou,	47	10	— pecker from Bengall,	47	2
Verticella,	46	I	— pecker, (Gold-Win-		
Verticilla,	46	I	ged)	47	28
Verticolla Scaligeri,	46	I	— pecker, (Great Black)	47	6
Verticollia, Scaligeri,	46	I	— pecker, (Great Spot-		
Vibratrix, (Avis Pif-			ted)	47	13
cium)	58	23	— pecker, (Greater Spot-		
Vintfi,	58	6	ted)	47	13

liv INDEX ALPHABETICUS.

	G.	S.		G.	S.
Wood-pecker, (Green)	47	1	Xochitenacatl,	54	3
— pecker, (Hairy)	47	17	—	54	7
— pecker, (Larger red-crested)	47	10	—	54	11
— pecker, (Largest White-Bill)	47	9	— (Alia)	54	12
— pecker, (Lesser)	47	15	— (Altera)	54	11
— pecker, (Lesser Black)	47	7	—	54	3
— pecker, (Lesser Spotted)	47	15	— dicta, (Pica)	54	12
— pecker, (Middle-Sized parti-coloured)	47	23	— dictus, (Passer longirostris,)	54	3
— pecker of Jamaica,	47	23	— tertia,	54	3
— pecker, (Persian)	47	5	Ευλικόπος,	47	
— pecker, (Red - bel- lied)	47	23	Y.		
— pecker, (Red - headed)	47	19	Y Ayauhquitotl,	57	2
— pecker, (Smallest Spotted)	47	18	Y Yellow belly'-d Wood-pecker,	47	24
— pecker, (Spotted Indian)	47	2	— -faced Parrakeet,	53	68
— pecker, (Three Toed)	47	20	Yfengart,	58	1
— pecker, (Yellow belly'-d)	47	24	Ys-Vogel,	58	1
— Spite, (Green-)	47	1	Z.		
— Spite, (Lesser Spotted)	47	15	Z Ezula,	50	1
Wryneck,	46	1	Z Zielony, (Dzieciol)	47	1
Wyls-Specht,	47	14	Ziezgule,	50	1
X.			Zimorodek rzeczny,	58	1
X Axabes de Oviedo,	53	25	Zolná,	60	1
X Xochitenacatl,	54	1	— szara,	60	2
			— zoltawa,	60	1
			Zotna,	47	1
			Zwang, (Nater-)	46	1



A V I S A U R E L I E U R .

Les Planches doivent être placées de manière qu'en s'ouvrant, elles puissent sortir du livre, & se voir à droite dans l'ordre qui suit.

Page	84. Planches I, II, III & IV.
90.	V.
104.	VI & VII.
164.	VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV & XV.
176.	XVI & XVII.
182.	XVIII.
406.	XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIII, XXIX & XXX.
434.	XXXI, XXXII & XXXIII.
470.	XXXIV & XXXV.
530.	XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL & XLI.
564.	XLII, XLIII & XLIV.
576.	XLV & XLVI.

E R R A T A .

Pagina	1 linea	15. lumbrici formi <i>lege</i> lumbriciformi
2	32.	amula <i>lege</i> amulâ
13	23.	s'engrenne <i>lisez</i> s'engrene
	34.	d'ouble <i>lisez</i> double.
43	26.	ad oris <i>lege</i> ab oris
57	12.	rut <i>lege</i> tur
107	38.	brunes variées des deux côtés, <i>lisez</i> brunes, variées des deux côtés
114	24.	leucophæus <i>lege</i> leucophæus
148	7.	tumr potenduntur. <i>lege</i> tum protenduntur.
153	37.	infra, quam <i>lege</i> infra quam
159	26.	linges <i>lisez</i> lignes
160	24.	bouce <i>lisez</i> bouche
161	20.	cupi <i>lege</i> cupri
169	38.	s'engrenne <i>lisez</i> s'engrene
170	8.	s'engrennent <i>lisez</i> s'engrenent
348	31.	<i>effacez</i> BIRD WAS BROUGHT FROM BENGAL. <i>Alb.</i>
371	3.	le jambes <i>lisez</i> les jambes
395	37.	rectrices <i>lege</i> rectrices
416	1.	plus, foncé <i>lisez</i> plus foncé,
422	13.	lier, <i>lisez</i> lier :
555	22.	<i>Apiastrem</i> <i>lege</i> <i>Apiastrum</i>
563	30.	<i>Apiastrem</i> <i>lege</i> <i>Apiastrum</i>
xxv	14.	<i>effacez</i> — was Brought from Bengal, 53 66



